





215. 392

35-8-24

31/21
BIBLIOTECA PROVINCIALE

Armadio
25



Palchetto
30

Num ° d' ordine 20 31/21

40-8-24

NAZIONALE
B. Prov.



919

NAPOLI

B. P. C.
II
213

610102



ANALISE

DES

INFINIMENT PETITS,

COMPRENANT

LE CALCUL INTEGRAL

dans toute son étendue;

AVEC SON APPLICATION AUX QUADRATURES,
RECTIFICATIONS, CUBATURES, CENTRES DE GRAVITE,
DE PERCUSSION, &c. DE TOUTES SORTES DE COURBES.

Par M. STONE, de la Société Royale de Londres:

SERVANT DE SUITE AUX INFINIMENT PETITS
DE M. LE MARQUIS DE L'HÔPITAL:

Traduit en François par M. RONDET, Maître de Mathématiques.

Joseph



Maurin



A PARIS,

Chez { JULIEN-MICHEL GANDOUIN, Quai de
Conti, aux trois Vertus:
ET
PIERRE-FRANÇOIS GIFFART, rue Saint
Jacques, à Sainte Thérèse.


M. DCC. XXXV.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI.



Ami Pierre Rondet





DISCOURS PRÉLIMINAIRE,

SERVANT

DE SUPPLEMENT

*A la Préface qui est à la tête de l'Analyse des Infiniment
Petits de M. le Marquis DE L'HÔPITAL.*



L y a bien des années que l'*Analyse des Infiniment Petits* de M. le Marquis DE L'HÔPITAL, attendoit une seconde Partie pour remplir son titre, & former un Ouvrage complet. Cet illustre Auteur dans l'ingénieuse *Préface* de cette *Analyse*, nous apprend qu'il avoit eû dessein de composer cette seconde Partie qui concerne le *Calcul integral* ; mais qu'il avoit cessé d'y penser, depuis que le célèbre *M. Leibnis* lui avoit fait sçavoir qu'il comptoit don-

a ij



ner ce morceau dans un Ouvrage qu'il méditoit sur
la science de l'Infini.

M. Leibnis promettoit volontiers des Ouvrages. Il avoit assez de facilité de génie pour en concevoir l'idée, & pour en former même, comme d'un premier coup d'œil, tout le plan général dans sa tête. C'est dommage qu'il n'ait eû le tems d'en exécuter peut-être aucun hors *sa Theodicée* qui n'est pas ce qu'il pouvoit faire de mieux. Mais, sans parler des autres projets de M. Leibnis, on peut douter si celui dont il s'agit ici, étoit mûr pour le tems auquel il le promettoit, & où M. de l'Hôpital avoit voulu l'entreprendre.

Le Calcul différentiel étoit facile à éclaircir, ou même assez éclairci dès ce tems-là. Il ne contient en soi aucune vraie difficulté. Il est comme *lineaire* & du *premier ordre des Problèmes*, n'atteignant qu'aux *premières affections extérieures & lineaires des Courbes*, aux tangentes, sous-tangentes, perpendiculaires, sous-perpendiculaires, diamètres, axes, asymptotes, développées, points simples ou doubles, de courbure, d'inflexion, de reflexion, en un mot, *aux modifications des circonférences extérieures*. Ce calcul même est absolument fini, les Infiniment Petits s'y détruisant à cause de l'expression relative & fractionnaire $dx : dy$ qui est une grandeur finie.

Le principe très-simple de ce calcul va à tout, & sa règle unique n'a point d'exception, & n'est arrêtée dans la *differentiation*, ni par les fractions, ni par les complexes, ni par les radicaux. D'ailleurs divers Auteurs, particulièrement *MM. Bernoulli* avoient

suffisamment remanié cette partie , qui étoit à proprement parler la *partie de M. Leibnis* , sans oublier *M. de Fermat* , premier calculateur des *Infiniment Petits* , la partie , en un mot , des François , des Allemands , & de tout le continent de l'Europe.

Mais le *Calcul integral* , dont la difficulté monte au second degré des Problèmes , aux quadratures , aux rectifications , aux cubatures , à cause de son expression radicalement infinitesimale *ydx* ou &c. étoit comme la partie propre de *M. Newton* , & de cette nation célèbre qui semble former elle seule un continent à part dans le monde littéraire , comme dans le monde géographique , & peut-être aussi dans le civil & dans le politique.

Ce n'est pas qu'il n'eut transpiré quelque lueur de ce *calcul reciproque des fluxions*. MM. Leibnis , Bernoulli , de l'Hôpital pouvoient bien , sans le secours d'aucun autre , en avoir saisi les premières opérations , & pour le moins la règle inverse du retour d'une différentielle à son intégrale. Mais le grand Nevvton gardoit bien des choses *in petto* , comme le disoit M. Leibnis à propos d'autre chose. Ce que ce profond Géometre en avoit déjà donné au public étoit peu accessible. A peine avoit-on bien l'idée de ce qu'on qualifioit sans cesse de *nouvelles Methodes* , de *science de l'Infini* , de *Calcul infinitesimal* , de *Géométrie intérieure*.

Ce ne furent guères que les disputes élevées il y a environ 20 années entre MM. Leibnis & Nevvton , & presque entre les deux continens Rivaux , qui nous valurent la notion précise & désormais immuable ,

des nouveaux calculs. Il fallut que le grand Nevvton parlât lui-même pour nous dire que sa Méthode avoit inséparablement deux branches, dont la Méthode de M. Leibnis, qui en convint, étoit sous le nom d'*Analyse des Infiniment Petits*, la moins considérable, & dont l'*Analyse des Series* étoit l'autre grande moitié.

Et cela est tout d'un coup évident pour quiconque sçait que le calcul integral même ne va pas sans le secours de ces Series, & que la plupart des quadratures & des *Problèmes du second ordre*, envelopant des radicaux complexes, il faut, avant que de leur appliquer aucune regle d'*integration* ou de résolution, les développer en Series infinies.

C'étoit donc aux Anglois d'exécuter la seconde Partie de l'Ouvrage de M. de l'Hôpital, & c'est précisément ce que vient de faire le merveilleux M. Stone, dans l'Ouvrage dont on donne ici la traduction. Cet Auteur, l'admiration de l'Angleterre même, commence d'être connu en France par l'Extrait que les Mémoires de Trévoux donnerent de son Livre en 1732, Janvier, page 103, & par la Lettre de M. le Chevalier de R. au P. C. insérée à la page 109 de ces Mémoires à la suite de l'Extrait.

Comme c'est cette Lettre & cet Extrait qui ont fait souhaiter au public la Traduction de l'Ouvrage Anglois, & que l'Histoire de M. Stone est singulière, on rapportera ici la Lettre de M. de R. telle qu'elle a paru dans les Mémoires cités.

*Lettre de M. le Chev. de Ramsay Membre de la Société
Royale d'Angleterre, au P. Castel Membre de la
même Société.*

« Le véritable génie surmonte tous les défavan-
« tage de la fortune, de la naissance, de l'éduca-
« tion ; *M. Stone* en est un rare exemple : né fils du
« Jardinier du Duc d'*Argyle*, il parvint à l'âge de 19
« ans, sans sçavoir lire ; son pere ne sçavoit pas lui
« apprendre son métier de cette maniere élevée,
« qui rend le jardinage & l'agriculture une partie
« très-utile & très-noble de la Cosmographie & de la
« Physique.

« Par hazard, un domestique ayant appris au
« jeune *Stone* les lettres de l'Alphabet, il n'en fallut
« pas davantage pour faire éclore son génie & pour
« le développer. Il s'appliqua lui-même, il étudia,
« il parvint aux connoissances de la plus sublime
« Géometrie, & du calcul, sans maître, sans con-
« ducteur, sans autre guide que le pur génie.

« A l'âge de 28 ans il avoit fait tous ces progrès
« sans être connu, & sans connoître lui-même les
« prodiges qui se passaient en lui.

« Mylord Duc d'*Argyle*, qui joint à toutes les
« vertus militaires, & à tous les sentimens d'un He-
« ros, une connoissance universelle de tout ce qui
« peut orner & perfectionner l'esprit d'un homme de
« son rang, se promenant un jour dans son jardin,
« vit sur l'herbe le fameux Livre du Chevalier Nevv-
« ton en Latin. Il appella quelqu'un pour le ramaf-

» ser & le reporter dans sa Bibliotheque:

» Le jeune Jardinier lui dit que ce Livre lui appartenait : *A vous*, répondit le Mylord? *Entendez-vous la Géometrie, le Latin, M. Newton ? J'entends un peu de tout cela*, repliqua Stone avec un air de simplicité fondé sur l'ignorance profonde de ses propres talens, & de l'excès de son sçavoir.

» Mylord Duc fut très-surpris : mais comme il a le goût des sciences, il daigna entrer en conversation avec le nouveau Géometre : il lui fit plusieurs questions, & demeura étonné de la force, de la justesse, & de la candeur de ses réponses.

» *Mais comment*, dit le Mylord, *es-tu parvenu à toutes ces connoissances ?* L'autre répond : *Un domestique m'apprit, il y a dix ans, à lire : A-t-on besoin de sçavoir autre chose que les 24 lettres pour apprendre tout ce que l'on veut ?* La curiosité du Duc redouble ; il soupçonne que les démarches de ce genie merveilleux étoient encore plus surprenantes que ses progrès ; il s'assieoit sur un banc, & lui demande le détail de tout ce qu'il a fait pour devenir habile.

J'appris d'abord à lire, dit Stone, *les Massons travailloient alors à votre maison : je m'approchai d'eux un jour, & je vis que l'Architecte usoit d'une regle, d'un compas, & qu'il calculoit. Je demandai ce qu'il faisoit-là, & à quoi tout cela étoit bon : & je compris qu'il y avoit une science que l'on appelloit Arithmetique ; j'achetai un Livre d'Arithmetique, & je l'appris.*

» *On m'avoit dit qu'il y en avoit une autre appelée Géometrie : j'achetai des Livres, & j'appris la Géometrie.*

» Je

« Je vis à force de lire qu'il y avoit de beaux Livres sur
 « ces deux sciences en Latin : J'achetai un Dictionnaire, &
 « j'appris le Latin. J'appris aussi qu'il y avoit de beaux Li-
 « vres de même espèce en François : J'achetai un Diction-
 « naire, & j'appris le François. Voilà, Monseigneur,
 « tout ce que j'ai fait, il me semble qu'on peut tout ap-
 « prendre quand on sçait les vingt-quatre lettres de
 « l'Alphabet.

« Ce recit charma Mylord Duc. Il tira ce ge-
 « nie merveilleux de l'obscurité ; & il le pourvut
 « d'un emploi qui lui laisse tout le tems de s'appli-
 « quer aux Sciences. Il découvrit en lui le même
 « génie pour la Musique, pour la Peinture, pour
 « l'Architecture, pour toutes les sciences qui dépen-
 « dent du calcul & des proportions.

« J'ai vû le sieur Stone. C'est un homme d'une
 « simplicité admirable. Il sçait à présent qu'il sçait :
 « mais il n'en est pas enflé. Il est possédé d'un amour
 « pur & désintéressé pour la Géometrie. Il ne se sou-
 « cie pas de passer pour Géometre. Le bel esprit &
 « la vanité n'ont aucune part aux travaux infinis qu'il
 « subit pour exceller dans ce genre. Il méprise aussi
 « la fortune, & m'a sollicité vingt fois de prier My-
 « lord de lui donner un moindre emploi, qui ne
 « valloit que la moitié de celui qu'il a, afin d'être
 « plus solitaire, & moins distrait de ses études fa-
 « vorites. Il découvre quelquefois, par des métho-
 « des qui lui sont propres, les mêmes verités que
 « d'autres ont déjà trouvées. Il est charmé de voir
 « qu'il n'en est pas l'inventeur, & que les hommes
 « ont fait plus de progrès qu'il ne croioit. Loin d'ê-

» tre plagiaire , il attribué les solutions ingénieuses
 » & admirables, qu'il donne de certains problèmes,
 » aux indices qu'il en trouve dans les autres , quoi-
 » qu'elles n'en découlent que par des conséquences
 » fort éloignées, &c. »

Sur cet exposé aussi naïf qu'élégant , on peut croire que l'illustre Auteur de l'Analyse des Infiniment Petits , ne dedaigneroit pas d'avoir pour continuateur de son Ouvrage , au défaut de M. Leibnis , un Géometre du genie & de la capacité de M. Stone , qui a d'autant mieux rempli le plan général de l'Ouvrage , & les premieres vûes de l'Auteur , qu'il n'a pas été plus que lui servilement Géometre, & homme d'une seule étude & d'une science unique.

Car, si toutes les sciences se tiennent par la main , & ont besoin les unes des autres pour se perfectionner & se développer , la Géometrie, plus que toute autre , est une science sèche & roide , qui ne se manie point elle-même , & ne sçauroit se retourner sans le secours d'un peu de Litterature , de Logique , & même de Rhetorique , qui est une Logique ornée. Comment parler Géometrie , en effet , si on ne sçait pas parler ? Et comment écrire sur quoi que ce soit , si on ne sçait pas écrire ?

Le Calcul est une belle & bonne chose sans doute , & il a fallu autant de genie pour l'inventer & pour le perfectionner , que pour aucune autre partie de la Géometrie. C'est une partie de la Géometrie en effet , & une troisième partie : Car cette science en a trois bien décidées , calcul , analogie & mesure dont les deux premieres font un moyen pour arriver à la

troisième. Le calcul est une partie utile , nécessaire , indispensable même , au moins dans la pratique. Dans la théorie même il abrége l'expression des pensées , il en donne les résultats : il soulage sur-tout la mémoire & le génie. C'est même une sorte de mémoire locale , & un supplément de génie.

Et par-là même il est admirable pour les commençans, qui ne sont pas encore capables d'une forte attention , & peut , étant bien ménagé , beaucoup contribuer à leur donner cette attention , & à les accoutumer à penser. Il est peu d'esprits novices par exemple , qui sans calcul puissent franchir le second Livre d'Euclide , ou même la 47^e proposition de son premier Livre , & avec ce secours c'est tout ce qu'Euclide a de plus facile.

Le calcul est bon pour toutes les extrémités d'esprits & de génies. Il fait des merveilles entre les mains d'un génie inventeur qui travaille de tête , & qui embrassant plusieurs idées en même-tems , est soulagé d'en confier quelques-unes à des symboles abrégés & inarticulés qui ne lui disent mot , & de replier de moment en moment le fil d'un trop long raisonnement, en prenant les résultats & comme des sommes ou des produits de ses opérations.

En un mot, outre la pratique qui ne peut s'en passer , le calcul est nécessaire à tous ceux qui ne savent pas , ou qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas beaucoup penser. C'est une espèce de machine , ou de Cric géométrique qui étaye l'esprit , en lui donnant un point fixe qui lui aide à s'élever plus haut sans trop d'effort ni de contention.

Aussi n'a-t-on jamais douté que les Anciens, les Appollonius & les Archimedes n'eussent leur Analyse & leur calcul, dont on trouve en effet chez eux quelques vestiges, & pour le moins les solides fondemens dès le second Livre d'Euclide qui n'est qu'un calcul enveloppé. Or ce n'est pas pour honorer beaucoup les Anciens qu'on leur attribue du calcul. On croiroit au contraire les trop relever au-dessus de la nature humaine, que de les exempter de ce secours. Plus on leur prête de connoissance & d'usage du calcul, plus on prétend leur dérober de force de génie. Ils étoient hommes sans doute comme les autres.

Le grand avantage du calcul est, lorsqu'on a fait une découverte, pour en saisir les branches, les résultats, les corollaires; pour en faire les applications, en détailler les divers cas; pour la rendre sensible par des exemples, en épuiser toutes les veines: pour l'élever même plus haut sans trop guinder le raisonnement, l'étendre sans verbiage, la généraliser sans trop d'abstraction. Et c'est-là que les nouveaux calculs, l'Analyse des Infiniment Petits, le calcul différentiel de M. de l'Hôpital, le calcul integral de M. *Stone* triomphent, brillent, & paroissent dans tout leur beau. Soyons équitables, formons-nous des idées justes de toutes choses, & ne parlons de la Géométrie que suivant les loix scrupuleuses de la plus exacte vérité. Mesurons, pesons, comptons, évaluons toutes choses au plus juste.

Lorsque par les conditions heureusement combinées d'un problème élevé, on a constaté la nature

Géometrique d'une courbe, & que l'Analyse Cartesienne venant au secours d'un génie épuisé par un effort de raisonnement & d'invention, en a renfermé les propriétés caractéristiques dans une équation, on achève par les formules du calcul différentiel d'en déterminer à l'aide des sous-tangentes & des sous-perpendiculaires tous les points de contour, les inflexions, les nœuds, les plis & les replis les plus tortueux, l'extension en un mot & le développement entier; & tout de suite on quarre, on cube, on rectifie, on mesure par le calcul integral, & on épuise la mine ouverte par le génie.

Car, après avoir rendu de bonne foi au calcul la justice qui lui est dûe, la même équité, la même bonne foi, le même esprit de vérité Géometrique exige qu'on reconnoisse, que c'est le génie enfin qui dans tout genre de sciences & d'opérations d'esprit, fait les découvertes & les perfectionne: & que c'est outrer les choses, faire tort à son jugement, imposer à celui des autres, fermer la porte aux découvertes, & nuire infiniment au progrès de la science, que de donner le supplément du génie pour le génie même, le moyen pour la fin, & la troisième partie de la Géometrie pour le corps complet de la Géometrie, comme on ne l'a que trop fait dans ce dernier siècle.

Il est vrai que le calcul y a pris de merveilleux accroissemens, & y est monté peut être aussi haut qu'il puisse aller: ce qu'on ne peut pas dire de la Géometrie en général qui est infinie dans son étendue, au lieu que ces progrès mêmes du calcul, prouvent qu'il a comme atteint ses dernières bornes.

Plusieurs circonstances ont contribué au grand éclat des nouveaux calculs , & à l'espece d'éblouissement qui a saisi les Géometres en leur faveur : leur grande perfection n'a peut-être pas cependant été la principale cause de cette espece d'entousiasme ou d'extrale. Le calcul s'étoit perfectionné comme tout le reste , successivement , lentement , de proche en proche , & par plusieurs mains.

Les Anciens en avoient posé les fondemens Géometriques. *Diophante* & ses Commentateurs, sur-tout le célèbre *Bachet de Meziriac* l'avoient développé de Géometrique en Arithmetique , & d'Arithmetique en Algebrique , avec quelques semences d'Analyse. Mais *Viete* avoit poussé beaucoup plus loin l'Analyse dont il est comme l'Auteur : & tout de suite *Harriot* , *Oughtred* , & *Descartes* plus que tout autre , l'avoient monté à la grande Analyse qui ne pût désormais monter plus haut sans devenir tout-à-fait transcendante.

Mais à force de s'éloigner de son origine Géometrique , le calcul devenoit inutile pour la Géometrie , dégénérant en pures abstractions , en subtilités , en pointilleries , en mysteres , en chymeres , en visions ; si *Descartes* par un trait de haute intelligence , sentant que toutes les extremités se touchent , & que la fin rappelle le commencement dans le système circulaire qui regne par tout , n'eût comme replié ce calcul Analytique sur lui-même pour le ramener au Géometrique d'où il étoit parti , & ne nous eût appris à appliquer l'Algebre à la Géometrie.

Ce fut ce repliment important & ce retour du calcul à son origine qui le mit en état de s'élever encore plus haut ; & l'on pourroit prouver , que sans cela le calcul prenoit un train d'abstraction qui ne l'eût fait aboutir qu'à une transcendance purement métaphysique , sans aucune utilité pour aucune science solide.

Mais en l'associant à la Géometrie on lui donna un contrepoids qui l'empêcha de s'évaporer ; on le rendit vrai & réel ; & la transcendance où il s'éleva , ne le mit point hors des vraies bornes de la Géometrie , elle le contient même dans celles de la plus saine Physique , malgré l'infini qui devint son objet , & même parce que l'infini devint son objet.

On fut redevable de cette transcendance à deux grands hommes, MM. *Leibnis* & *Newton* , un peu prevenus tous deux , celui-ci par son Maître le célèbre *Barrow* , celui-là par M. *de Fermat* , sans parler de MM. *Wallis* , *Huguens* , *Bernoulli* , *Cheyne* , de l'*Hôpital* , *Varignon* , *Stirling* , *Tschirnaus* , &c. & divers autres qui les ont merveilleusement secondés. Car voilà à peu près l'Histoire abrégée de tout le calcul.

Mais cette transcendance même, & le grand nom de *Calcul Infinitesimal* qui ont consommé l'éblouissement , n'en ont pas cependant été la première ni la principale cause. Ce fut d'abord le grand éclat du système Physique de Descartes qui , rejaillissant sur son Analyse , qu'on auroit peut-être sans cela raisonnablement estimée , offusqua tous les yeux , & leur fit paroître le calcul Algebrique comme le grand complement de la Géometrie.

L'ombre que l'envie & l'ignorance avoient jettée sur la premiere ébauche du tableau de ce grand homme , ne servit pas peu dans la suite à le rehausser. On commença par combattre cette Physique & cette Analyse avec une espece de fureur ; on les adopta bien - tôt avec une aveugle superstition , & après avoir comme exilé cet Auteur de sa Patrie & l'avoir forcé de mourir dans une Terre Etrangere , on lui décerna des statues.

» Descartes qui est mort à Stokolm en Suede le
 » 11 Février 1650 , *disoit le docte Naudé pag. 125 ,*
 » *du Naudæana* , étoit un homme de mauvaise
 » mine , & qui n'avoit rien d'agréable. S'il a laissé
 » quelque chose à imprimer , ce sera *M. Piques* qui
 » en aura le soin : il avoit bien des visions dans sa tête
 » qui sont mortes aussi-bien que lui. »

Naudé , comme on voit , avoit assez de mémoires pour y loger les siècles passés, car c'étoit un érudit dans les formes ; mais il avoit peu de cette *faculté imaginatrice* , qui prévoit les siècles à venir. Quelques années plus tard , il auroit été Cartesien & demi. Il étoit de ces beaux esprits qui marchent les premiers avec assurance à la tête des Anciens , & les derniers à la queue des Modernes. Descartes même en mourant ne lui avoit pas ouvert les yeux , la fausse science ayant droit seule de survivre à l'envie.

Au défaut de Naudé assez d'autres emboucherent la Trompette , & pour reparer , quoiqu'un peu tard , les excès de mépris & d'injustice , dont on avoit accueilli la personne même de Descartes , on prodigua à son nom les mêmes excès d'éloges & de déférence,

rence. C'étoit peu de lui décerner des statues : on fit main-basse sur celles des anciens Philosophes & des modernes qui en avoient mérité ou qui en méritoient, afin que la sienne s'élevât au dessus de tout, & que rien ne partageât sa gloire.

Et, comme selon l'oracle, à celui qui a on donne ce qu'il n'a pas, & qu'à celui qui n'a pas on ôte même ce qu'il a, on ne crut pas après avoir placé Descartes au-dessus d'*Aristote*, devoir l'abaisser au niveau d'*Archimede*, & sa prééminence dans la Philosophie décida de celle dans les Mathématiques. L'éblouissement étoit tel, que les esprits les plus modérés & les plus équitables étoient comme entraînés par le torrent, & forcés, par un principe même de droiture, d'encenser l'Idole du siècle.

Les Anciens sont pourtant de grands hommes, disoit une personne que sa naissance doit rendre exempte de tout soupçon de bassesse à cet égard, mais que le préjugé commun dominoit; les Anciens sont des hommes admirables, mais admirables par ce seul endroit que, *quoiqu'en dise Viète, ils ne se sont point égarés*. Car du reste, « ils n'ont pas été loin, & « ils ont marché par de longs circuits . . . Ils n'ont « touché qu'à fort peu de courbes, ils n'y ont même « touché que légèrement. . . Ce ne sont par tout que « propositions particulières & sans ordre, qui ne font « appercevoir aucune méthode régulière & suivie. » Voilà pour les Anciens.

Pour ce qui est des Géomètres du moyen âge, depuis le renouvellement des sciences jusqu'à Descartes, on voit assez que tout ce qu'ils ont pu faire

pour enchaîner les siècles anciens avec les modernes, & mettre ceux-ci par le moyen de ceux-là en état d'aller plus loin, a été de reprendre la première trame, de fouiller dans les bibliothèques, de deterrer des lambeaux de manuscrits, de les déchiffrer, de les confronter, de les corriger les uns par les autres, de les suppléer, de les éclaircir, de les traduire, de les commenter, de les imprimer.

Tout cela a-t-il pu même s'exécuter sans beaucoup de génie, & sans enfanter de vraies & de grandes découvertes, dont l'Imprimerie, les taches du Soleil, les lunettes, &c. pouvoient immortaliser ces siècles laborieux & bien-faisans auprès des beaux Esprits, autant qu'auprès des honnêtes gens qui sont touchés du bien public ?

N'en jugeât-on même que par un certain résultat de renommée, les Mathématiques ne doivent-elles rien aux Galilées, aux Torricellis, aux Keplers, aux Cavallieris, aux Scheiners, aux Guldins, aux Clavius, aux Midorges, aux Gregoires de saint Vincent, aux Sarraffas, aux Lalouberes, aux Wallis, &c. pour ne daigner pas même en dire un mot de mépris dans une Histoire des découvertes ?

Ils n'ont sans doute rien fait pour le calcul, & le calcul fait tout désormais en Mathématique. Tous ces Auteurs *sont de grands hommes en bloc, & sans doute d'aussi grands hommes que les Anciens*, mais *qui en sont tous demeurés-là, là où les anciens en étoient demeurés; parce que* » par une admiration superstitieuse » pour leurs ouvrages, ils se sont contentés de les » lire & de les commenter, sans se permettre d'au-

» tre usage de leurs lumieres que ce qu'il en falloit
 » pour les suivre , sans commettre le crime de pen-
 » ser quelques fois par eux-mêmes , & de porter
 » leur vûë aux delà de ce que les Anciens avoient dé-
 » couvert. Ainsi bien des gens travailloient , ils écri-
 » voient , les Livres se multiplioient , & cependant
 » rien n'avançoit. Tous les travaux de plusieurs sie-
 » cles n'ont abouti qu'à remplir le monde de respe-
 » ctueux Commentaires , & de traductions repetées
 » d'originaux souvent assez méprisables. »

Et voilà les débris sur lesquels s'éleve enfin la sta-
 tuë du grand Descartes , avec cette inscription épi-
 phonematique. *Alors on ouvrit les yeux, & l'on s'avisa*
de penser : Ce qui atteint presque au *siluit terra*. Car
 en bon François cela veut dire , qu'avant Descartes
 les hommes , hommes Romains , hommes Grecs ,
 les Aristotes , les Platons sans difficulté ; mais les *Ci-*
cérons , mais les *Virgiles* , mais les *Homeres* , mais les
Demosthenes , &c. ne s'avisent pas d'être hommes ,
 hommes raisonnables , ni presque d'être animaux.
 Car les animaux ont des yeux , & malgré l'*Automa-*
tisme Cartesien , s'avisent quelques fois de les ouvrir ,
 pour faire au moins semblant de voir.

Mais après Descartes , permis à chacun d'avoir
 des yeux & d'en user , pour tourner toute la Géome-
 trie en calcul comme toute la Physique en Hypo-
 theses : & , comme ceux qui mirent la main à ce
 calcul étoient vivans & assez vifs sur leurs préten-
 tions , on vit les découvertes se multiplier & les in-
 venteurs jouir de leurs droits : c'étoit le siecle des
 découvertes , tout le monde étoit admis à en faire.

Car les Anciens n'avoient enfanté que de serviles copistes, & Descartes n'enfanta que de sublimes inventeurs.

On consentit même à trouver en leur faveur des défauts dans le calcul de Descartes. Mais *au défaut de ce calcul de Descartes, est survenu celui du célèbre M. de Leibnis* : lequel au reste fut assez peu ébloüi lui-même comme on verra dans la suite & assez admirateur de la Géometrie ancienne, pour rendre justice à plusieurs de ses prédécesseurs : Car *M. M. Bernoulli ont été les premiers qui se sont aperçus de la beauté de ce calcul*. Et M. Nevvton trouve dans cet éloge une place dont on seroit curieux de sçavoir s'il en fut fort touché, parce que, dit-on, *son excellent Livre intitulé : Philosophiæ naturalis principia Mathematica, est presque tout de ce calcul*.

La raison de douter si M. Nevvton agréa cet éloge, est que les Anglois, quoiqu'ils soient peut-être les plus forts calculateurs de l'Europe, & que M. Nevvton soit un autre pere du calcul, très-comparable à Descartes ; ces profonds Géometres n'ont pourtant jamais estimé ce calcul que ce qu'il vaut, jamais ils ne l'ont élevé au-dessus de la méthode ancienne, & M. Nevvton en particulier en a parlé avec assez de mépris, jusqu'à le traiter de supplément de génie, de ressource même de petit génie : & il s'en est très-peu & presque point servi dans ce Livre, d'autant plus admirable des principes de la Philosophie, qu'on n'avoit point lu sans doute lorsqu'on a avancé qu'il étoit *tout de ce calcul*.

Cela est si incontestablement vrai, que ce Livre

ayant entout 510 pages de la premiere édition, ce n'est qu'au milieu & à la 250^e page qu'on trouve le fameux Lemme *Data fluente*, &c. qui contient le principe immédiat du calcul soit direct, soit reciproque des fluxions; & qu'encore ce principe est là plutôt géométriquement démontré qu'analytiquement deduit; & que dans la suite l'Auteur n'en fait presque aucun usage analytique, & qu'il procede uniquement selon l'ancienne maniere d'Euclide, d'Appollonius, d'Archimede, qui est la seule vraiment Géometrique, la seule raisonnée, & démonstrative, la seule qui sente le genie & qui parle à l'esprit.

Prenons bien garde : autre chose est inventer le calcul, perfectionner le calcul, donner les principes du calcul : autre chose, user du calcul, calculer. User du calcul, calculer suppose une connoissance, une théorie preliminaire du calcul. Ce n'est pas par le calcul qu'on invente ni qu'on perfectionne le calcul : L'usage du calcul ne peut en donner que la routine, & à la longue peut-être mettre l'esprit en voye d'en penetrer les principes. C'est le génie, la méditation, le raisonnement qui inventent le calcul comme tout le reste.

Et suivant cela Descartes est admirable, non pas précisément pour nous avoir donné du calcul, mais pour l'avoir inventé ou enrichi de ses découvertes, & sur-tout pour en avoir reduit en art l'application à la Géometrie. Mais ces découvertes il pouvoit absolument nous les donner sans tant de calcul, si son but n'avoit pas été de nous donner en effet la maniere de calculer, & comme la personne même

du calcul ; la personne , dis-je , ou le corps même du calcul plutôt que l'esprit.

Car il est assez singulier que les Géometres anciens nous ayant constamment donné l'esprit du calcul , ses principes , sa pure théorie démonstrative plutôt que son corps , son usage , ses regles ; Descartes ait pris tout le contrepied , & ait affecté d'en donner les regles , les resultats , les applications sans presque aucune théorie ni démonstration. Les Géometres rigides du tems blâmerent fort cette méthode dans le fond peu géométrique , & qui alloit plutôt à la gloire de l'Auteur qu'à l'instruction du public : On accusa Descartes d'avoir uniquement voulu par-là se rendre admirable. On l'excuse cependant sur ce qu'il ne vouloit pas faire un Livre trop long , & sur ce qu'il prétendoit se vanger par ce petit artifice de ses critiques importuns , en leur donnant des énigmes à déchiffrer. Il y réussit au-delà de ses espérances.

Pour revenir à M. Nevvton , son Livre des Principes ne contient guere non plus que l'esprit & les semences du calcul , & s'il nous en a donné ailleurs quelques morceaux , ce sont de petits traités qu'il n'a même vraisemblablement faits, que pour se conformer , contre sa propre inclination , au goût régnant. Il voyoit que le calcul avoit tout à fait pris le dessus , qu'on n'étoit désormais réputé Géometre qu'à ce titre , qu'on ne l'avoit associé lui-même aux Géometres modernes que sur ce pied & en supposant que son Livre étoit tout de calcul ; qu'il étoit sur le point de se voir enlever toute la gloire par M.

Leibnis , qui s'étoit lui-même tout à fait livré au calcul , en voyant les premiers essais mieux accueillis qu'il ne l'avoit prévu. M. Nevvton se prêta donc au calcul.

Et alors la Géometrie ne fut plus qu'un ressassement de lettres & de symboles , de tables & de formules , de tarifs , en un mot , & de comptes faits. On auroit pris le cabinet d'un Géometre pour un Bureau de Finance , ou pour un Comptoir de Commerce. Encore si c'eût été un vrai commerce ou une bonne finance , la réalité d'un calcul effectif dédommageroit le cœur de l'humiliation de l'esprit.

Mais avec les aridités & les épines d'une Algebre triplement indéchiffrable , on se trouvoit encore condamné au ridicule emploi de calculer éternellement à faux ou à vuide , d'accumuler lettres sur chiffres , symboles sur signes sans aboutir de la vie à aucun vrai resultat , dont on pût jouir : quoiqu'il paroisse aussi essentiel à un Calculateur de profession de dire : *Je calcule , donc j'ai* ; qu'à un homme vivant de dire : *Je pense , donc je suis*.

On peut comparer le calcul dans la Géometrie aux troupes auxiliaires dans les armées Romaines. Tandis que ces troupes ne furent qu'auxiliaires & le tiers tout au plus d'une legion , Rome s'agrandit & conquit l'Univers. Mais la paresse gagna les legions avec les richesses des nations : on déposa donc le casque , la cuirasse & le courage : & les troupes étrangères & barbares , les Huns , les Gots , les Visigots , les Arabes sous le nom d'auxiliaires , gagnèrent les armées , les remplirent , les anéantirent ; & le tiers

devenant le tout , le tout fut réduit à rien , & il n'y eut plus enfin d'Empire Romain.

C'est le train que prend la Géometrie depuis qu'elle est métamorphosée en calcul Arabe & presque Ostrogot , & que le tiers y est devenu aussi le tout. La tête presque delivrée du soin de penser , devient paresseuse , & l'esprit laisse aller les doigts : on se repose de tout sur des formules : on se contente de démonstrations à *posteriori*, qui ne font juger du vrai des choses que par l'événement , & non par le principe interieur & par l'idée. Exige-t-on même des démonstrations d'aucune espece ?

Au défaut de l'évidence on se paye fort bien de la certitude, comme le Quinze-vingt qui substituë le toucher au coup d'œil, mais malgré lui. La certitude est même remplacée par l'induction , c'est-à-dire , encore le toucher précis par un tatonnement vague. Les exemples servent de preuves , l'explication de raisonnement. Les principes les plus fondamentaux passent de bouche en bouche , & de Livre en Livre par simple voye de tradition.

Ainsi, loin que Descartes ait été l'époque , au moins en Géometrie, de l'ouverture des yeux & des esprits , il est précisément arrivé sans que ce grand homme en soit pourtant responsable , & même parce qu'il étoit grand homme & qu'il avoit eu lui-même les yeux & l'esprit très-ouverts , il est arrivé ce qui arrive après tous les grands hommes , après les inventeurs , après les peres qui ont amassé du bien , après les Rois mêmes qui ont agrandi leurs Etats , qu'on a jouï de ses trésors & de ceux de quel-
que

ques autres dont nous allons parler, sans se mettre en peine de les augmenter. La Géometrie s'est trouvée assez riche dans le dernier siècle pour qu'on s'amusât à la remanier par des formules & des inductions. Un riche héritier passe sa vie à compter ses trésors & à les recueillir.

On n'outre rien ici : on prie les Géometres de ne se point roidir là-dessus : on ne veut offenser personne : on veut simplement dire une vérité utile, & la rendre bien sensible, afin d'ouvrir les yeux sur un abus qui perdra enfin une si belle science si on persiste de s'y opiniâtrer. Les Géometres modernes eux-mêmes ne conviennent-ils pas tous les jours de ces deux ou trois points capitaux ?

1°. Que le calcul soulage l'esprit en le déchargeant du soin de penser : & peuvent-ils nier qu'il ne faille penser pour perfectionner véritablement une science aussi profonde que l'est la Géometrie ? 2°. Ne conviennent-ils pas que les démonstrations des nouveaux calculs ne sont jamais qu'à *posteriori* ? 3°. Et, ce qui devroit tout-à-fait dessiller les yeux en faveur de la Géometrie ancienne, n'ont-ils pas mille fois remarqué de bonne foi que dans les conclusions de la Géometrie moderne, l'esprit aime à se retrouver avec celles de l'ancienne Géometrie, & qu'il n'y a que l'uniformité du but auquel ces deux Géometries aboutissent, qui rassure tout-à-fait sur la suspension & l'incertitude même où laissent les nouveaux calculs, où laisse même en général toute sorte de calcul, sur-tout l'Algebrique qui n'a rien de lumineux ?

L'ingenieur *M. de Fontenelle*, qui est de tous les

d

Auteurs modernes un de ceux qui ont le plus & le mieux philosophé sur la nature des nouveaux calculs, convient partout, dans son élégante Histoire de l'Académie, & dans ses nouveaux Elemens de la Géometrie de l'Infini, du défaut que nous remarquons ici dans ces calculs. *Il est arrivé dans la haute Géometrie, dit-il, une chose bizarre, la certitude a nui à la clarté.* Il ajoute dans la Préface de ses Elemens. *Le calcul n'est gueres en Géometrie que ce qu'est l'expérience en Physique, & toutes les vérités produites par le calcul, on les pourroit traiter de vérités d'expérience.* —

Ce célèbre Auteur attribué cette incertitude ou ce défaut de clarté à l'Infini : mais sans Infini sa proposition est toujours vraie, que le calcul n'a qu'une certitude d'expérience & comme d'évenement. L'Infini peut bien augmenter l'incertitude & l'obscurité. Mais il est vraisemblable que, si cet Infini étoit manié selon la methode des Anciens, géométriquement & sans calcul, par principes & non par regles, comme l'ont fait M. Nevvton dans ses principes, & Grégoire de S. Vincent dans son grand ouvrage géométrique, l'Infini n'auroit au moins que ses propres nuages ou n'en auroit point du tout, n'en ayant jamais eu dans ces deux Auteurs, ni dans Archimede qui a travaillé sur le même fonds, mais géométriquement, par idée & par raisonnement.

Nous n'avons encore touché que la premiere & dans le fond la moindre cause de l'ébloüissement des modernes en faveur de leurs calculs. Cet ébloüissement n'auroit été ni si durable, ni si universel, s'il n'avoit été fondé sur quelque chose de plus réel, de

plus substantiel qu'une méthode, une maniere, *une mode*, & *une mode* par conséquent, dont on seroit bien-tôt revenu comme on revient de toutes les modes. Voici le fait historique.

Les circonstances, où le calcul reçut sa perfection, furent très-favorables pour lui donner un air brillant de grandes découvertes géométriques. Car précisément dans le même tems que *Descartes* donnoit son Analyse, *Gregoire de S. Vincent* qui vivoit avant & qui a vécu après *Descartes*, enrichissoit la Géométrie d'un nombre inconcevable de vérités nouvelles, de vûes profondes, de recherches étenduës, de principes féconds, de methodes même générales & très-regulieres.

Et comme toute, ou presque toute la Géométrie, sur tout la plus élevée, peut se mettre en calcul, parce qu'après tout le calcul n'est qu'une maniere, une mode, un habit, & que ce calcul arrivé à sa perfection ne demandoit qu'à se réaliser, à s'appliquer à quelque sujet, à se signaler même par des sujets illustres, toute la théorie de *Gregoire de S. Vincent* fut jettée dans ce moule, passa par cette filière, fut revêtue en un mot de calcul, & si bien masquée que le renouvellement joint à la nouveauté réelle, fit paroître le calcul comme un Perou inépuisable, dont les premieres veines sembloient en annoncer de secondes & de troisièmes à l'infini.

Gregoire de S. Vincent étoit un Auteur vaste, profond, original, & par conséquent difficile : Il ne fut permis qu'aux Géometres du premiet vol d'y puiser. Mais les anciennes découvertes furent un butin

pour tout le monde, & le calcul ne se refusant à personne, il n'y eut plus de Géometre qui ne fût admis à se signaler par quelque découverte. Archimede, Appollonius, Euclide, tout fut refondu, & reprit un air de nouveauté par le moyen du calcul.

Ajoutez à cela les sciences Physico-Mathematiques anciennes & modernes, les découvertes de Kepler, de Guldin, de Galilée, de Torricelli, & surtout celles du profond & inépuisable Nevvton, qui sans être de calcul, ou même parce qu'elles n'en étoient pas encore, ne sembloient respirer que le calcul, ne demander que du calcul pour être développées & comme reduites en pratique.

Car c'est une réflexion qui ne paroît rien, & qui est pourtant singuliere, que la Géometrie moderne est dans son propre caractère & par sa forme toute problématique, une Géometrie pratique qui suppose par conséquent une Géometrie théorique, d'où elle est évidemment déduite par voye de corollaire & de résultat.

La Géometrie ancienne étoit presque toute théorématique, & les modernes mêmes, dans la passion qui les animoit de critiquer les Anciens, ont fort blâmé Euclide d'avoir mêlé dans ses *Elemens* les problèmes avec les théorèmes, c'est-à-dire, la pratique avec la théorie. Il est donc très-singulier de voir toute la Géometrie moderne sous une forme problématique. Qu'on ouvre l'Analyse des Infinitement Petits de M. de l'Hôpital, & de M. Stone, ce n'est point la faute de ces Auteurs : C'est simplement le stile du calcul & la marque certaine d'une seconde invention.

Seroit-il naturel sans cela qu'une science aussi raisonnable que la Géométrie, qui est peut-être la seule où la raison ait un plein droit de triompher de l'autorité, n'eût d'autre stile que ce langage impérieux : *Faites ceci, faites cela, décrivez un cercle, tirez une ligne, formez un angle, tracez une parabole, & que sans le piquer presque d'aucune démonstration raisonnée, elle n'eût d'autre garand de ses procédés que le despotique mot *sit pro ratione voluntas* ?*

Cependant la Géométrie moderne n'étant point théorique par son calcul, n'est point pratique ni praticable non plus par son calcul algébrique, analytique, infinitesimal : & la pratique même de l'Algebre & de l'Analyse ne peuvent jamais passer que pour une très-haute, très-sublime, très-quintessenciée & très-abstraite spéculation.

Mais admirons encore ici les Modernes. Ils nous parlent de *respectueux commentaires*, & de *repetitions d'originaux*. Et que font-ils donc depuis près d'un siècle, tant en Géométrie à l'aide du calcul, qu'en Physique à l'aide de l'hypothese, que des commentaires très-respectueux & des repetitions presque litterales, de deux ou trois ou quatre originaux modernes, des anciens mêmes, d'Archimede, d'Appollonius & d'Euclide, tout Euclide qu'il est ?

On ne blâme point les Modernes de ce procédé, on n'en parle même que pour montrer qu'il n'en faut blâmer personne, & que dans le fond ces commentaires, & ces repetitions & ces respects sont dûs aux Auteurs & au public ; que les Auteurs originaux, en saisissant la vérité, n'attrappent pas tou-

jours la vraie maniere , la maniere la plus simple & la plus demonstrative de la proposer. Qu'une chose utile est bonne à dire & à redire cent fois , qu'à force de la remanier-on la meurt, à force de la relâcher on l'inculque , à force de la faire paroître & reparoître on la rend sensible , & qu'enfin nous sommes redevables à ceux mêmes qui se donnent la peine de commenter & de repeter l'*a, b, c*. Il faut prendre toutes choses du bon côté , & pour le moins être toujours équitable.

Soyons-le donc tout à fait , & puisque le calcul n'est qu'une petite partie de la Géometrie , ne nous bornons pas au point de vûë dans lequel la premiere partie de l'Analyse des Infiniment Petits nous a présenté l'Histoire de cette science : Tâchons dans cette seconde Partie de rendre cette Histoire un peu plus complete, en rendant justice à ceux qui sans aucun étalage de calcul n'ont pas laissé de contribuer beaucoup à sa perfection , ou du moins à son embellissement & à son éclat , en contribuant à la perfection de la pure & saine Géometrie.

Les sections coniques sont comme le corps solide & substantiel de cette science. C'est-là qu'il en faut toujours revenir. On n'est Géometre qu'à proportion qu'on se rend profond dans la théorie de ces sections. Elles sont le modele de toutes les autres courbes. Celles des degrés pairs sont *circulaires* ou *elliptiques* : celles des degrés impairs sont infinies en étendue , c'est-à-dire , ou *paraboliques* ou *hyperboliques* , ou *parabolo-hyperboliques*. Mais c'est plus pour la curiosité ou pour l'ornement de l'esprit que pour

aucun usage nécessaire, qu'on s'amuse quelquefois à contempler ces autres courbes : On n'en a jamais poussé bien loin la speculation : Au lieu que depuis *Appollonius* les *coniques* ont été le grand objet de tous les profonds Géometres.

Ce fut en ébauchant leur théorie que cet ancien Auteur mérita le nom de *grand & de subtil Geometre* : Car il est vrai qu'il ne l'avoit qu'ébauchée, parce qu'un premier inventeur ne peut pastout inventer. Il est vrai aussi que les sciences étant tombées peu après lui, & ne s'étant enfin ranimées que peu à peu & par degrés, comme nous l'avons expliqué, on avoit peu ajouté aux découvertes d'*Appollonius* jusqu'au siècle qui vient de finir : & cela même en rendant la Géometrie peu vaste, la rendoit peu féconde en nouvelles découvertes. Car plus on a, plus il est facile d'acquérir, & ce n'est que par le connu qu'on pénètre jusqu'à l'inconnu : l'homme ne fait rien de rien.

Il falloit des génies vigoureux & presque créateurs qui fussent capables de tirer tout de leur propre fonds. Tel fut, on l'ose dire, parce qu'on va le prouver, le célèbre *Gregoire de S. Vincent*, dont on ne s'amusera point ici à faire l'éloge ni le caractère, mais dont on tâchera de faire connoître les Ouvrages. Il avouë lui-même, malgré son extrême modestie & son respect excessif pour les anciens, que la lumière qu'ils nous avoient laissée en Géometrie étoit bien foible : *Lumen quod ab antiquis nobis tradita Geometria exhibebat, nimis debile esse quam ut, &c.*

Il pensa donc à l'augmenter, & il y réussit au

point que son siècle en fut ébloui comme nous l'avons dit, & ébloui jusqu'à le méconnoître : Car l'objet qui éblouit, n'est pas toujours celui qu'on connoît le mieux ; & l'œil étonné d'un éclat trop vif, cherche des objets plus tempérés comme pour s'y reposer & y transporter l'image de celui qui l'a offusqué. Le Soleil par qui l'on discerne toutes choses ne se laisse point discerner ; & si par hazard on s'obstine quelques instans à le contempler, on retrouve ensuite son image sur tout ce qu'on s'avise de regarder.

Gregoire de S. Vincent ne fut pas cependant généralement méconnu ; & *Sarassa* nous apprend que les lettres que son maître recevoit de toutes parts, étoient adressées au *nouvel Apollonius*, à l'*Archimede moderne*, au *grand Géometre* : Voici les paroles de *Sarassa* dans sa Préface, *eum Archimedem alterum alii, alii Apollonium, magnum Geometram alii litteris inscriptis & non immerito passim compellunt, &c.*

Nous avons perdu la moitié au moins des Ouvrages de cet Auteur, un traité ample sur la *Quadratrice de Dinostrate*, une *Statique* entière, &c. qui furent brûlées dans l'incendie de Prague au tems des guerres de Bohême. Mais il nous reste encore deux grands *in-folio*, & même trois ; car il y a un Ouvrage posthume peu connu. Ces trois volumes contiennent près de 3000 Propositions, dont il y en a bien 1500 sur les Sections coniques, sur leur nature, leurs propriétés, leurs rapports, leur comparaison, leur description géométrique ou organique, leurs segmens, leurs secteurs, sur tous les aspects sous lesquels on peut les envisager.

C'est

C'est un grand Paradoxe & un Phenomene peut-être unique , qu'un gros Livre , qu'un triple *in-folio* , tout plein de vrayes & de grandes découvertes sans aucune compilation des ouvrages d'autrui. Aussi le célèbre *Viviani*, qui étoit lui-même un grand & un subtil Géometre , & qui étoit associé de l'Académie Royale des Sciences de Paris , qualifie ce Livre d'ouvrage vraiment Arhlantique: *In opere verè Atlhantico summi Geometræ Gregorii à S. Vincentio , è doctissimâ , spectatissimâ , nec unquam satis laudatâ , &c.*

C'est donc d'abord par un détail étonnant de propriétés des Sections coniques , & sur-tout par le rapport & la comparaison de leurs propriétés générales , que Gregoire a mis la Géometrie en état de s'enrichir , par la richesse même qu'il lui a procurée. Mais il ne s'est pas borné à ce détail , & il a scû lui-même jouir de ses premières richesses pour en acquiescir de nouvelles. Le détail l'a conduit au général , & en nous donnant des découvertes il nous a donné aussi les méthodes , dont il s'étoit servi pour les faire , & dont on s'est servi d'après lui ; je dis les méthodes de génie , de raisonnement , sinon de calcul ; & peut-être même aussi celles de calcul , ou pour le moins leurs principes géométriques les plus immédiats.

Partout il nous avertit de la généralité de ses propositions & nous apprend à en faire les applications en les faisant lui-même. Il avoit particulièrement étudié les Anciens dans la vûe de découvrir leur Analyse , celle du moins qui les avoit secrettement dirigés : & il lui avoit fallu la deviner & presque la

créer de nouveau, ou peut-être pour la première fois. *Methodus enim demonstrationis*, dit-il, *quâ Archimedes in hac materiâ utitur usque adeò secreta est & involuta, &c.* Et plus bas, *planè mihi persuaseram verissimam me reperisse viam quâ Archimedes adinvenit, &c.* Il étoit persuadé, comme bien d'autres, que les Anciens avoient caché leur artifice par un nouvel artifice pour se rendre plus admirables à la postérité: *Antiquis enim valdè solemne fuit artificium adinventionis celare, &c.*

Mais il est fort douteux s'il y a eû d'autre finesse de leur part; & il paroît plus croyable que tout leur Art se réduisoit à avoir beaucoup de génie & une application d'esprit convenable; & que s'ils ont supprimé les divers moyens de calcul ou les autres tentatives, dont ils se sont servis naturellement pour arriver à leur but, ils l'ont fait comme un Architecte ôte les ceintres & les échafauds, & écarte les massons après l'achèvement de l'édifice.

Que sçait-on même? l'Edifice de la Géométrie des Anciens a été peut-être encore trop simple & trop imparfait, pour qu'ils ôtassent ces ceintres & ces échafauds; & peut-être avons-nous dans leurs Livres tout l'artifice géométrique & toutes les méthodes dont ils se sont servis, & que nous avons tort d'aller chercher bien loin.

Car si le calcul est une méthode ou une manière utile, un outil pour l'invention, le second Livre, & plusieurs autres morceaux d'Euclide ne sont qu'un calcul enveloppé, ou plutôt théorique & purement géométrique. Mais ce n'est-là qu'une manière en ef-

fet & un outil : La comparaison , l'analogie , la proportion , le rapport est une vraie méthode , un instrument , & comme la chose même en Géometrie , dont tout le fait consiste à découvrir des rapports. Pour mesurer les choses en effet , il faut les rapporter les unes aux autres , les comparer.

On peut absolument se passer de calcul dans cette science , si ce n'est dans la pratique , comme nous avons dit ; & alors même le calcul le plus arithmétique est suffisant , le meilleur & le seul bien usuel. Mais on ne peut s'y passer de proportions & de rapports bien développés , & en quelque sorte bien prononcés. Et alors on ne peut accuser les anciens d'avoir caché leur artifice , puisqu'ils nous ont laissé une théorie distincte des rapports , & leur usage par tout sensible.

Tout ce qu'on pourroit dire , c'est que cette théorie étoit fort bornée & fort imparfaite , comme s'en apperçut Gregoire de S. Vincent dès qu'il voulut tenter d'aller plus loin. On pourroit aisément faire voir , dit-il , à la tête de son admirable Livre des *Proportionalités*, que la Géometrie est jusqu'ici fort imparfaite : *Mutilam in hodiernam diem & imperfectam esse Geometria scientiam multis argumentis ostendi posset , atque adeo cultores exquirere qui noticiam rerum suo labore excludant , &c.* Or le point principal sur lequel la Géometrie avoit besoin d'être portée plus loin , c'étoit l'artifice des Proportions : *Inter ceteras verò partes quæ necdum prodierunt , adnumerari merito potest pars ea omnis quæ rationum Proportionum continet , & usum explicat quo Geometricis consemplationibus inservire queat.*

Ce fut donc pour suppléer à ce défaut de la Géometrie, ou de la méthode Géométrique des Anciens, que cet Auteur composa ce Livre des Proportionalités en 172 Propositions toutes nouvelles, & qu'il appelle avec raison une nouvelle Géometrie, *novam Geometriam concinnare nie oportuit* : de nouveaux secours, *novis adjumentis* : de nouveaux Arts, *novas Artes* : pour aller plus loin, selon la devise *plus ultra*, qu'il a fait servir d'ame aux Colonnes d'Hercule dans le frontispice de son Ouvrage.

Tout ce que l'antiquité nous avoit appris sur les proportions, se réduisoit à des rapports de deux termes, & à des proportions de deux rapports rationnels & homogenes. Gregoire nous apprit à faire entrer les disproportions mêmes & toutes sortes d'inégalités & de grandeurs heterogenes, incommensurables, & incomparables même dans les comparaisons ou analogies Géométriques. Il considéra les rapports de rapports, les proportions de proportions, le tout avec facilité par le moyen des exposans ou dénominateurs. Ses proportionalités embrassent jusqu'à 8, 12, 16, ou plus de termes, souvent irrationnels & tout-à-fait dissemblables.

Avant lui Viète & divers Auteurs, bornés au calcul & au rationnel avoient établi comme une maxime, que le courbe ne pouvoit entrer en comparaison avec le Rectiligne, l'incommensurable avec le commensurable, l'infini avec le fini, le plan avec la ligne, le solide avec le plan. C'étoit-là une borne posée, non cependant par les Anciens qui avoient quarré la parabole & la lunule & même en un sens le

cercle , & rectifié sa circonference. On ne voit pas même que Descartes, tout Descartes qu'il étoit, eut pensé à ôter cette borne.

Descartes avoit pris la Géometrie d'un autre côté, du côté des problèmes lineaires ou executables par des lignes , & nullement du côté des quadratures qui sont pourtant le vrai côté; le but de la Géometrie étant de mesurer , & par conséquent de quarer , de rectifier , de cuber ; & les grandes découvertes de la Géometrie ne s'étant faites, comme bien des gens l'ont observé, qu'en visant à ce but general, comme celles de la Chymie en visant au grand œuvre qui n'est pourtant qu'un but chimerique; au lieu que les quadratures sont un but réel , & même l'unique dernier but.

Gregoire de S. Vincent qui dirigea tous ses travaux Géometriques de cinquante années vers ce but , sentit son génie captivé par la maxime moderne , & ce fut pour la surmonter qu'il composa ses proportionalités. L'incommensurable ne l'arrêta pas. Il sçût éviter l'*incommensurable absolu* , & reduire à des exposans rationels l'*irrationnel relatif* , & l'infini même à des rapports finis.

Car l'infini devint son objet aussi familier que le fini. Il saisit cet infini par les deux endroits par où le calcul le plus moderne l'a saisi. 1°. Dans le progrès interminable d'une *serie infinie* ; 2°. en lui-même dans le partage d'une grandeur quelconque en *parties infiniment petites*.

Son Livre des *Series Géometriques* en 177 Propositions toutes de lui , est sans doute un Art nouveau ,

& une méthode d'invention qui a servi de fondement à la principale moitié des nouvelles méthodes de calcul infinitesimal. La grande occupation de ce calcul a été depuis ce tems-là d'exprimer ces series, tantôt par des nombres Arithmetiques, tantôt par des lettres Algebriques, & enfin par un Algebre Analytique, tour-à-fait transcendante & générale, qui est l'Ouvrage du grand Nevvton, & où le célèbre M. *Stirling* entr'autres s'est merveilleusement signalé.

Mais si le Livre des Series fut la semence prochaine du calcul moderne de ces Series, le Livre de *du Zu Plani in Planum*, en 246 Propositions fut celle de la seconde partie des nouveaux calculs, & pour le moins du calcul integral. On peut regarder ce Livre en effet comme un calcul integral de tête, & du reste comme un vigoureux effort de génie.

La méthode même qui y regne, de former des corps, même les plus bizarres, par une multiplication locale de lignes diversement posées, n'a été développée qu'à demi par le calcul integral, & la partie du génie qui consiste dans cette *position*, & dans cette *multiplication locale* a été long-tems rebelle à toutes sortes de calculs, & n'y a été assujettie que depuis deux ou trois années dans le Livre qui traite des courbes à double courbure, & qui n'en est que plus estimable, pour être l'ouvrage d'un * jeune Géometre, à qui on est bien aise de rendre justice. Car l'Histoire de la Géometrie doit être vraie par deux endroits, & parce qu'elle est Histoire, & parce

* M. Clairaut.

qu'elle est l'Histoire de la Géométrie.

Oùï, le Livre de *Ductu Plani in Planum*, est proprement un traité de courbes à double courbure, & sur-tout de *Corps terminés par des courbes à double courbure*. La hauteur de cette speculation l'avoit renduë peu traitable jusqu'ici. Le premier & presque le seul qui y avoit touché depuis son inventeur, étoit le célèbre *Lalouberé*, qui avoit quarré géométriquement la courbe formée par un tour de compas sur la surface d'un Cylindre. Quadrature qu'on avoit ensuite fort bien renduë par le calcul, qui vient enfin de s'approprier avec beaucoup de dextérité cette theorie épineuse.

Voilà au vrai les nouvelles méthodes de Géométrie; voilà le nouvel Art avec quoi Gregoire de Saint Vincent, non-seulement fraya le chemin aux nouvelles découvertes (c'est-à-dire, aux nouveaux calculs) *ad inventa recentiora viam stravit*, comme le dit *Wolffius* dans son Histoire des Mathématiques, mais fit aussi lui-même une infinité d'autres grandes découvertes. Car cet esprit vaste, second & appliqué alloit de découverte en découverte; en avoir fait une, étoit une raison pour lui d'en faire une autre.

L'immense détail de propriétés dont il enrichit d'abord les Sections coniques, l'éleva peu à peu aux grandes méthodes dont on vient de parler; & ces méthodes générales le ramenerent à un nouveau détail de découvertes encore plus élevées que les premières.

Archimède avoit le premier quarré la parabole,

mais par un artifice peu naturel , & en un sens peu Géometrique , plus merveilleux cependant que la quadrature même de la parabole. Les Modernes qui ont remarqué ce detour ou cette espece d'écart sçavant d'Archimede , mais qui auroient dû un peu plus l'admirer , ont en revanche fort admiré leurs calculs pour la facilité avec laquelle ils leur donnoient cette quadrature de la parabole comme d'un trait de plume.

Mais sans aucun calcul & par le simple raisonnement Géometrique d'Euclide ou d'Apollonius , notre Auteur dans son traité de la parabole & même ailleurs , donne vingt & trente manieres differentes de quarrer cette courbe & ses divers segmens extérieurs & intérieurs : & plusieurs de ces quadratures sont l'affaire d'une ou de deux Propositions tout aussi courtes que le peut-être le procédé du calcul moderne pour arriver au même but.

Une découverte de la plus haute espece en ce genre de quadratures , fut la *symbolization* de la quadrature de l'hyperbole avec celle du cercle : cette seule découverte mise en calcul , a comblé de gloire les cinq ou six Géometres les plus célèbres du dernier siecle. *Mercator de Holstein en Dannemarc* , d'après le *Comte Brounker* , illustre Anglois , quarra l'hyperbole par une Serie. Aussi-tôt *M. Barrou Maître de M. Newton* , se souvint que cet illustre Disciple lui avoit fait voir autrefois une pareille quadrature. D'un autre côté *M. Leibnis* trouva la fameuse quadrature *serielle* du cercle , & le non moins célèbre *M. Huguens* fut comme enthousiasmé du rapport merveilleux de

de cette quadrature avec celle de l'hyperbole. *Waldis* & divers autres y mirent aussi la main.

Or, voici comment Gregoire de S. Vincent l'y avoit mise plusieurs années avant tous ces Auteurs. On en va juger par la *Scholie*, qui termine sa théorie Géométrique sur cette matiere, *pag. 1210, t. 2.*

„ Nimis elegans visâ est mihi symbolizatio inter proprietates circuli & hyperbolæ, quam ut eam superpressam voluerim, aut silentio præteritam. Quid enim ad circuli quadraturam necessarium fuit, id omne in Hyperbolæ quadratura ita ad amussim sese offert, ut *iisdem prorsus caracteribus*, eademque discurrendi methodo utramque absolvere possis, modo disponantur debita ratione quæ requiritur ad discursum formandum, &c. Neque enim est alia diversitas . . . quam quòd una parabolæ D N. cum hyperbola D P. P. *ad aliam partem translatâ sit* . . . Mirabiliter enim reficere nata est usque adeo universalis symbolizatio. »

On voit bien que ce grand homme, loin d'avoir fait au hazard une découverte qui résulteroit d'une très-longue suite de Propositions raisonnées & épineuses, sentoit toute la hauteur de cette découverte, & qu'il l'admiroit par les mêmes endroits qui enthousiasmoient M. Huguens. Il est au reste singulier, que l'Auteur remarque que les *mêmes caractères* & le même raisonnement servent pour les deux quadratures; ce qui joint avec cette autre remarque que l'unique diversité qui s'y trouve, vient d'une *transposition de parties* dans l'hyperbole, peut faire penser à ceux qui n'ont pas lû l'Auteur, & qui sont prevenus

f

pour le calcul , que toute cette affaire consiste dans un calcul algebrique , composé des mêmes lettres pour les deux quadratures , avec la seule diversité des *signes plus & moins*.

Il est pourtant vrai qu'il n'y a ici aucun calcul , si ce n'est enveloppé , & comme en puissance. Mais cela même montre évidemment que , si l'Auteur qui sçavoit bien l'Algebre , & pour le moins l'Arithmetique , & qui étoit bien au fait des Series , dont il étoit l'inventeur , avoit daigné exprimer cette découverte par le calcul , comme il l'a fait pour quelques autres , il n'auroit pû nous donner pour les deux quadratures que la même expression Analytique composée des mêmes chiffres ou lettres *iisdem prorsus caracteribus* , avec la seule diversité des signes qui marquent le transport des parties à des côtés opposés , *quod ad aliam partem translata sit*.

L'hyperbole est une courbe singuliere. Gregoire de S. Vincent en connoissoit toute la singularité : Aussi est-ce celle à laquelle il paroît s'être le plus attaché. Il a quarré un espace infini renfermé entre deux hyperboles concentriques. Les *Logarithmes Hyperboliques* , sont une découverte que le calcul s'est attribuée avec le plus de complaisance. Elle est , sans aucun mélange de calcul , de *Sarassa* Disciple de Gregoire qui en avoit jetté tous les fondemens , de l'aveu de *Sarassa* , en épuisant la matiere des *Quadrilateres & des Secteurs hyperboliques* , dont on connoît d'ailleurs l'importance pour la résolution des *Problèmes Physico-Mathematiques* , de ceux , sur-tout , qui regardent les chutes des corps , leurs mouvemens di-

verfement accelerés & retardés, les denfités des milieux, leurs refiftances, &c. comme on peut le voir dans le fublime Ouvrage des *Principes Mathematiques de la Philofophie naturelle*, & dans plufieurs beaux morceaux des *Memoires de l'Academie Royale des Sciences de Paris*.

La fymbolization de la Spirale d'Archimede avec la Parabole d'Apollonius, eft la découverte favorite de notre Auteur, & une de celles que les nouveaux calculs fe font appropriées des premieres, & qui lui ont le plus ouvert la porte à la comparaifon des courbes. Car avant Grégoire on ne connoiffoit pas ou prefque pas la *Géometrie comparée*, qui eft la grande clef des découvertes : & du refte il n'étoit pas aifé de deviner que la Spirale qui eft d'un ordre transcendant, ne fût qu'une parabole, qui eft une courbe du premier ordre, mais repliée & enveloppée, dont l'axe eft circulaire.

Cependant Gregoire a exactement démontré, que tout ce qu'Archimede avoit découvert de la Spirale convenoit à la parabole; que tout ce qu'Apollonius avoit devouvert de la parabole, convenoit à la Spirale; que mille autres propriétés leur étoient communes. Mais la rectification hypothetique du cercle par la tangente de la Spirale étoit une découverte d'Archimede, que toute l'antiquité avoit admirée, & que les modernes regardent encore comme de la plus haute efpece. Ils ont regardé comme parallele à cette découverte, celle de la même rectification par la tangente de la parabole : ils ne la connoiffent la plûpart que sous l'enve-

loppe du calcul. Elle n'est qu'un trait de la symbolization des deux courbes en question, & Gregoire seul en est le premier inventeur. Ce sont pourtant là des faits précis & Géométriques.

Le plus merveilleux de tout ceci, c'est que Gregoire de S. Vincent, modeste, & non moins excessivement admirateur des Anciens, ait mis une Préface exprès à la tête de cette symbolization pour prouver qu'Archimede n'avoit pû l'ignorer; & que dans la Préface générale de son Ouvrage il en parle sur le même ton; qu'en divers autres endroits il s'obstine, jusqu'à fatiguer le Lecteur, de la rapporter à Archimede, quoique les plus habiles Géometres de ce tems-là lui eussent protesté, après avoir bien examiné la chose, qu'Archimede n'y avoit pas pensé; que s'il l'avoit sçu, il n'auroit pas manqué de s'en parer, comme d'une découverte qui ne le cédoit à aucune des siennes, mais qu'il n'avoit pas dit un mot qui fit soupçonner qu'il en eût la moindre idée.

Qu'on compare ce procédé avec celui de ceux qui ont embelli leurs Ouvrages de ce morceau sublime, sans faire aucune mention, ni d'Archimede, ni de Gregoire de S. Vincent; & l'on verra dès ce moment s'accomplir l'Oracle sacré, que celui qui s'humilie sera exalté, & que celui qui s'exalte sera tôt ou tard enfin humilié. Mais sans humilier personne, on se contente ici d'exalter un homme que personne n'a eu droit d'humilier, & que les gens d'honneur aimeront sans doute à dédommager par leur reconnoissance, de l'ingratitude de son siècle ou du suivant.

Mais pour la force de l'invention, nulle découverte ne le dispute à la *curvature des onglets*, & à la *quadrature de leur surfaces à double courbure*. Le calcul n'a pas manqué de s'en saisir, & divers Auteurs ont paru sur les rangs pour en partager la gloire, c'est-à-dire, celle d'une seconde invention, quoique sans aucune mention du premier inventeur.

La symbolization de l'onglet inscrit dans un prisme, & circonscrit à une pyramide, avec la sphere inscrite dans un cylindre, & circonscrite à un cone, est un morceau qui va pour le moins de pair, avec la découverte du grand Archimede sur la comparaison des trois derniers corps, dont il voulut qu'on ornât son tombeau.

Le cylindre, la sphere & le cone, suivant Archimede sont dans le rapport des nombres 3, 2, 1. Le prisme, l'onglet, la pyramide sont, suivant Gregoire de S. Vincent dans les mêmes rapports; & tous les autres points de comparaison établis par le Géometre de Syracuse, entre les trois corps réguliers mentionnés, sont établis par notre Géometre Flamand, entre ces trois corps bizarres & tout-à-fait irréguliers. Car l'onglet est une portion de cylindre coupé de biais, & une espece de bec de flute, renfermé par trois surfaces, deux plates, l'autre courbe; l'une demi circulaire, l'autre demi elliptique, & la troisième bizarrement cylindrique.

Or les mêmes ou de pareilles symbolizations établies entre ces solides, se soutiennent entre leurs surfaces respectives, c'est-à-dire, entre la théorie de notre Auteur d'un côté, & celles de Pappus & d'Ar-

chimed de l'autre côté. On a voulu en dernier lieu que Descartes fût encore le seul Auteur qui eût touché aux courbes à double Courbure. Quel intérêt a-t-on donc d'attribuer tout à Descartes, au préjudice des legitimes possesseurs? C'est qu'en attribuant tout à Descartes, on s'attribue tout à soi-même, rien n'étant plus facile ensuite que de dépouiller celui à qui rien de tout cela n'appartient; au lieu qu'en citant Gregoire, & après lui *Laloubere*, on se recule-roit au troisième degré d'invention.

Tous les problèmes au reste qui avoient arrêté les anciens Géometres, ce grand Géometre, ou les résolut, ou en porta la résolution au point où les calculs modernes les laissent jusqu'ici: ce qui démontre absolument qu'il a ébauché, & plus que cela, toutes les nouvelles découvertes Géometriques, & que le calcul n'a gueres fait qu'épuiser les mines ouvertes par ce génie vraiment inventeur.

Il termina tout d'un coup les grandes disputes sur l'*angle de contingence*, en faisant voir que l'angle du rayon avec la circonférence du cercle étoit droit, & le même par conséquent qu'avec la tangente, confonduë à la naissance avec cette circonférence, & cela dans un petit, comme dans un grand cercle.

Les plus anciens Géometres, fort resserrés dans leur théorie, & bornés à la connoissance des deux especes de lignes les plus simples que nous ayons, la droite & la courbe circulaire, avoient érigé leur imperfection même en principe, & posé une borne que l'antiquité toute entière jusqu'à Descartes & à

Gregoire n'avoit pû franchir. C'étoit de ne regarder comme Géométriques que les problèmes qui se construisoient par la regle & par le compas, c'est-à-dire, par la ligne droite & par le cercle. Descartes comprit & décida qu'on pouvoit franchir cette borne, & Gregoire de S. Vincent la franchit cent & deux cent fois.

En particulier la *duplication du cube*, connuë sous le nom de *Mesolable*, ou de *deux moyennes proportionnelles*, problème proposé par l'*Oracle* même de *Delphe*, pour embarrasser les Géometres, & pour la destruction du genre humain, étoit regardée comme un *problème insoluble*, parce qu'il étoit insoluble par la regle & le compas. Gregoire le résolut sans façon, & de vingt & trente manieres différentes, par la construction de deux sections coniques, il en fit autant de la *trisection de l'angle*, qui étoit aussi dans l'antiquité un problème insoluble. La Serie que cet Auteur assigna dans son *Traité des Progreffions infinies*, Prop. 107, *cor. pag.* 112, pour cette trisection, est d'un artifice admirable & a été bien remaniée par le calcul.

Il a encore plus remanié la résolution du fameux *Problème de Zenon*, qui avoit tenu en échec non-seulement toute la Géometrie, mais la Philosophie même des Anciens. Par sa difficulté ce problème alloit de pair avec le célèbre *naud gordien*, & on lui avoit donné le nom d'*Achille*. On avoit même fait entrer Achille dans son expression pour marquer qu'il étoit insurmontable ou irresoluble, comme ce grand Capitaine étoit invincible. Ce fut Gregoire

seul qui le premier vainquit cet *Achille de Zenon*, en résolvant le problème, à la pag. 201, *Schol. de la Prop. 87, du Traité cité des Progreffions Géométriques*. On a bien vanté cette résolution, au profit d'abord du calcul, mais deormais à celui de notre Auteur.

Nous ne finirions pas si nous voulions détailler toutes les richesses d'un Auteur plus connu que célèbre, & en qui tout semble paradoxe : Car on peut dire, qu'il n'a jamais été plus célèbre que lorsqu'il a été le moins connu, ni jamais plus connu que lorsqu'il a été le moins célèbre. De son vivant les critiques qu'on en fit le rendirent très-célèbre : à mesure qu'on le connut mieux, on cessa de le critiquer, on en profita, chacun s'en appropriâ ce qu'il trouva le plus à sa bienséance ; & comme si on s'étoit donné le mot, on cessa de le citer & on ne chercha, en quelque sorte, qu'à l'ensevelir dans l'oubli ; & le nom de Descartes, à qui les François eurent la reconnoissance de rendre enfin justice, sembla faire disparoître tous les autres noms, au moins pour un tems. Le malheur de Gregoire de S. Vincent, si c'en est un, fut qu'il se trouva ne tenir, ni à une nation, ni à un corps, ni à une secte fort jalouse d'une pareille gloire.

Il étoit difficile cependant que parmi tant de bouches ouvertes pour élever la Géometrie moderne jusqu'aux nuës, il ne s'en trouvât de sinceres, & qui rendissent témoignage en partie à la verité. Outre *Viviani*, *Sarassa*, *Wolffius*, & bien d'autres, le témoignage de *M. Leibnis* est en cette matiere décisif, & tout-

tout-à-fait digne de sa candeur & de sa probité.

En 1686, au mois de Juin, ce célèbre Auteur rendant compte, dans les *Actes de Leipsic*, des progrès de la Géométrie & de la découverte des nouvelles méthodes, auxquelles il avoit lui-même tant de part, parle d'abord de la *méthode des indivisibles de Cavallieri*, qu'il daigne à peine mettre au rang des vûes Géométriques, qui ont donné naissance à la nouvelle Géométrie de l'Infini, *sed Geometria indivisibilium Cavallieriana scientia renascentis non nisi infantia fuit*. Arrêtons-nous un moment à ce temoignage.

Il est fort singulier que M. Leibnis, Juge fort éclairé & fort désintéressé entre Cavallieri & Gregoire de S. Vincent, traite la méthode de Cavallieri d'enfance, par rapport à la nouvelle Géométrie; tandis que d'un autre côté la plupart des nouveaux calculateurs ne cessent de rapporter toute cette Géométrie, & tous leurs nouveaux calculs, à l'époque précise des indivisibles de Cavallieri. Plusieurs le disent comme ils le pensent; mais on peut prouver & démontrer par de bons faits & de bons temoignages que les premiers Auters de ce langage l'ont affecté pour des raisons qu'on diroit bien s'il le falloit. On se contentera de celle qu'on a déjà indiquée, qui est qu'on a mieux aimé attribuer tout à Cavallieri qui n'y prétendoit presque rien, qu'à celui qui pouvoit y tout prétendre: On aimeroit bien mieux confier à un enfant qu'à un homme fait, le dépôt dont on voudroit s'emparer sous-main soi-même. Nous retoucherons bien-tôt cet article des indivisibles.

Après avoir traité ces indivisibles d'enfance de la nouvelle Géometrie, M. Leibnis continuë son Histoire abrégée, & dit que trois hommes célèbres ont apporté de plus grands secours, *majora subsidia attulerunt triumviri celebres*. Ces trois hommes sont, M. de Fermat, François, Conseiller au Parlement de Toulouse, par sa belle méthode des plus grands & des moindres, *Fermatius inventâ metodo de maximis & minimis*; Descartes, François aussi, par son application de l'Analyse Algebrique aux lignes de la Géometrie ordinaire, *Cartesius ostensâ ratione lineas Geometriae communis . . . exprimendi per aequationes*; & Gregoire de S. Vincent, Flamand, par plusieurs belles découvertes, & *Gregorius à S. Vincentio multis præclaris inventis*: A ces trois hommes célèbres, M. Leibnis ajoute Guldin, dont la découverte est en effet originale, & se rapporte de très-près aux nouvelles méthodes, *quibus egregiam Guldini regulam de motu centri gravitatis addo*.

On doit remarquer que M. Leibnis en attribuant une découverte à chacun des autres, en donna plusieurs à Gregoire seul. M. Leibnis n'étoit pas aussi enthousiasmé de Descartes que ses Panegyristes ordinaires, & ne regardoit pas même le calcul comme une si belle chose, n'ayant pas même d'abord regardé son calcul différentiel & integral, comme il le regarda lorsqu'il en vit quelques autres dans l'extase & dans l'admiration.

Mais c'est sur-tout dans les critiques qu'on fit de notre Auteur, que nous devons retrouver le vrai fonds des éloges qu'il a mérités. Car les Auteurs se

plaignent des critiques, & absolument ils ont droit de s'en plaindre, parce qu'elles sont ordinairement pleines de malice & de fiel, sans presque aucun mélange d'instruction & d'utilité solide : mais il est pourtant vrai que c'est le plus grand triomphe des grands hommes. Ce qui est si vrai que dans ces derniers tems où le raffinement de la critique maligne est monté parmi les gens de lettres à son plus haut point, on a vu des cabales entières se liguer, même par serment, pour ne laisser échapper aucun mot de critique, au moins publique, contre les Auteurs & les Ouvrages, auxquels elles en vouloient le plus; & l'on va voir en effet, que la gloire de S. Vincent, comme anéantie par le silence affecté de ceux qui ont approuvé sa doctrine en la copiant, se trouve toute pure & brillante dans les monumens que l'envie & l'ignorance n'avoient consacrés qu'à l'anéantissement effectif de cette même gloire, en rejetant sa doctrine.

Il faut l'avouer cependant : il étoit réellement trop grand homme, & son Ouvrage trop plein & trop nouveau, étoit trop au-dessus de la portée de son siècle, pour n'être pas méconnu par ses contemporains. La Géometrie devoit-elle être sujette à des chicanes? Ce fut alors qu'elle commença de l'être, parce qu'elle commença à être une science de calcul. Car tout est lié, & la chicane l'a toujours été, même en Géometrie, avec le calcul. N'en faisons point un crime à Descartes, il fut à plaindre lui-même, d'avoir été pendant toute sa vie la première victime de cet esprit de calcul qu'il venoit de repandre.

Quoiqu'il en soit, Gregoire de S. Vincent fut encore plus vivement attaqué, au moins sur la Géométrie par *Meibom Sylvius*, *Lipstrop*, *Merfenne*, *AA* *** *. Ce n'étoient pas-là ses plus dangereux adversaires, quoique les plus acharnés & les plus importants : mais le *P. Leotaud Jésuite*, le célèbre *M. Huguens*, & le grand *Descartes* lui-même, donnerent beaucoup de célébrité à la dispute, dont *Aynscom* presque seul avec *Sarassa*, soutint tout le poids sous les yeux de leur Maître, qui ne daigna pas s'y prêter ouvertement.

Meibom n'étoit qu'un Grammairien en Géométrie, non plus que dans le reste de la littérature. Il attaquoit imprudemment tous les Anciens, sans en excepter Euclide. Plus Gregoire avoit multiplié les découvertes, plus Meibom crut qu'il avoit amplifié les erreurs anciennes. *Hunc verò errorem ampliavit Gregorius à S. Vincentio*. Ce que nous recueillons de mieux de Meibom, c'est qu'il nous apprend, sans doute, contre son intention, le grand éclat des découvertes de son adversaire, & le grand ascendant qu'elles avoient pris, peu après leur publication sur tous les esprits : *Hujus autem, dit-il, errores quòd planè insignes sint, totumque orbem irretitum teneant, clarius demonstrandos duxi*. On comprend bien que ce que Meibom qualifie d'*errores*, ne doit être traduit que par le nom de découvertes, de nouveautés sublimes, ce qui est prouvé, 1°. par le fait même, 2°. *quod totum orbem irretitum teneant*. C'étoit-là un fait historique dont Meibom étoit bon témoin, & que sa critique même

* C'est par ces deux lettres *AA*. que Gregoire & Aynscom désignent M. de Roberval.

constate assez ; cet homme-là n'ayant attaqué Gregoire, que parce que tout l'Univers l'admiroit & pour se donner un illustre adversaire.

Ce n'étoit-là qu'un déclamateur, M. de AA *** étoit un sçavant de conséquence, qui ne manquoit pas de titres, que le P. Merfenne annonça à Gregoire, comme un Géometre célèbre dans tout l'Univers, *noto toto orbi Geometrà*, qui étoit comme à la tête de la coterie du tems, qui avoit déjà fait le coup de pistolet avec Descartes, que de nos jours on a comme associé à Cavallieri pour la découverte du principe des indivisibles, & qui enfin avoit toujours le P. Merfenne comme à ses ordres pour porter à tous les grands hommes qui vivoient alors, des especes de cartels de défi, qui ne furent pourtant pas toujours si bien reçûs que chez Grégoire de S. Vincent : car c'étoit un bon homme, simple, modeste, qui ne rebutoit personne.

Mais si le cartel de M. de AA *** fut ici bien reçu, il étoit mal adressé : & si Gregoire étoit bon homme, il étoit impitoyablement Géometre, & il n'étoit pas sûr de broncher devant lui. L'Ouvrage qu'on attaquoit étoit à l'épreuve, & Aynscom défendoit son Maître avec assez de chaleur, & d'un ton ferme, trenchant, joli même & assez finement ironique, comme il convient avec des adversaires trop acharnés.

Le Livre des Proportionalités, comme le plus élémentaire, fut presque le seul que AA *** censura ; car sa critique porta le nom de *Censure*. Il y traita son adversaire de haut en bas, selon le stile

de ces Messieurs, & son Livre, d'inutile, de suzanné, d'etroné cependant, & comme contenant 100 Propositions fausses sur 172. Meibom qui n'avoit non plus touché qu'à ce Livre, y comptoit 130 Propositions erronées.

Ils critiquerent les uns & les autres, les exposans commensurables des grandeurs incommensurables, les exposans finis des grandeurs infinies. Croira-t-on que ce Géometre connu de l'Univers alla jusqu'à prétendre, & à soutenir que le rapport d'égalité avoit pour exposant, non l'unité, mais zéro ? Quelques demi-idées échappées de la doctrine de l'Auteur sur les quadrilateres hyperboliques achevoient d'égarer Merfenne & AA***: Car voici comme ils raisonnaient. Les quadrilateres en question, sont les exposans du rapport des abscisses, & reciproquement des ordonnées : n'y ayant donc aucun quadrilatere renfermé entre deux ordonnées égales, &c. *Cum inter duas lineas aequales seu potius unicam, nullum spatium includatur hyperbolicum, patet rationem aequalitatis nullam habere quantitatem.* Ces Messieurs avoient bien lû Gregoite pour le critiquer, mais jamais pour l'entendre.

Une chose les revoltoit tous étrangement : c'étoit que l'Auteur exprimât & calculât les rapports comme les fractions, *tot errorum*, disoit M. AA***, *unica est causa, quod Gregorius à S. Vincentio rationes consideraverit ut fractiones.* Et le P. Merfenne son collegue en critique : comment l'autoient-ils redressé sur l'article ? lui qui faisoit de sçavans Volumes d'Harmonie dans le faux principe des Musiciens Géometres, qui

pour ajouter la quarte à la quinte, enseignoient qu'il falloit ajouter leurs rapports, 2, 3, & 3, 4, & qui pour ajouter ces rapports enseignoient aussi qu'il falloit les multiplier, corrigeant pourtant par cette seconde erreur le vice de la premiere.

Ces chicanes cependant, en constatant les propres découvertes de l'Auteur, alloient aussi au profit de la science, de la part des habiles Géometres, qui en étoient l'objet. Ce furent les critiques de Merfenne en particulier qui nous valurent la belle découverte de Sarassa : Ces Messieurs la firent tout-à-fait éclore à force d'en tourmenter les sémences. Il y a des plantes salutaires qui ne naissent qu'à la lueur des éclairs & au bruit des tonnerres.

Merfenne au fond n'étoit pas malin : il étoit même sçavant & sçavant de bonne foi ; chose rare alors & depuis ce tems-là, au moins dans la Géometrie. Mais Merfenne avoit la fantaisie de faire un personnage, & de se jeter entre les sçavans les plus distingués, sous le nom de Conciliateur ; ce qui finissoit ordinairement par une broüillerie irreconciliable, comme entre Descartes & Pascal. Il falloit surtout que Merfenne dit son avis sur tout ce qui paroissoit dans la littérature. Il avoit pourtant la modestie & la discretion d'en parler le plus souvent au nom d'autrui, & en termes généraux pour ne pas trop s'engager.

Enfin il se plaignit que pour donner la quadrature du cercle, Gregoire avoit trompé l'attente des Géometres en se frayant des routes extraordinaires. *At vero cum neque quadraturam dederis eo modo quo solet*

à *Geometris expectari* : Qu'il s'étoit même jetté dans des speculations plus épineuses que la quadrature même, *cum in eâ exhibendâ longè quam ipsam quadraturam difficiliora supponat vel postulet*. Remarquons pourtant que tout le Livre de Gregoire est par Propositions, rigoureusement démontrées comme Euclide, sans demandes ni suppositions.

Merfenne continuë à dire, apparemment sans commission, que cet Ouvrage a déplu aux Géomètres François, *nostris Geometricis displicuit*, parce qu'il avoit le titre fastueux de quadrature du cercle, *quòd cum opus suum quadraturæ circuli specioso superboque titulo insignierit*. Ce titre est pourtant tel, de *quadraturâ circuli opus Geometricum* : Ouvrage géométrique, touchant ou sur la quadrature du cercle. M. Nevvton a bien donné depuis un Ouvrage avec ce titre de *Quadraturâ curvarum*. Nulle part peut-être Gregoire n'a dit qu'il eût trouvé la quadrature : & tel qui écrirait contr'elle pourroit bien encore prendre le même titre.

Mais il y a bien de l'injustice & de la plus basse malignité dans ce que Merfenne ajoute, sur la foi sans doute de AA^{xxx} & de P^{xxx} : *Nihil tamen quod ad rem faciat præter id quod in ea re hætenus inventum, protulerit*. Merfenne & AA^{xxx} & P. auroient été bien déconcertés s'ils avoient pû prévoir le grand succès & le grand air de nouveauté sublime que tout cela alloit prendre à l'aide du Calcul Cartésien, dont ils étoient aussi ennemis que de cette Géométrie Gregorienne.

Merfenne termine sa censure, en disant que
cette

cette Géométrie se réduit à ce problème non résolu & plus élevé que la quadrature, sçavoir, trois grandeurs étant données & les logarithmes de deux étant donnés, de trouver le logarithme de la troisième. *Quippè in illud abit necdum solutum problema, quodque forsàn longè difficiliorè quàm ipsa quadratura solutionem requirit, datis tribus magnitudinibus, &c. datisque duarum ex illis logarithmis, tertiæ logarithmum Geometricè invenire.*

Or ce fut précisément ce problème plus difficile que la quadrature du cercle, dont Sarassa donna tout de suite la résolution après avoir montré cependant qu'il étoit mal & peu géométriquement proposé, & dans quel sens il pouvoit être résolu : & ce fut cette résolution qui nous valut la pleine découverte des logarithmes hyperboliques, dont voilà l'Histoire.

De tels critiques, comme l'on voit, n'étoient pas trop propres à persuader à des Géomètres de cette supériorité que la quadrature cherchée ne fût pas entre leurs mains. Descartes qui connoissoit les personages & qui n'étoit pas si bon homme ni si endurant, en écrivit en ces termes de Stockholm à un ami qui lui avoit apparemment rendu compte de cette dispute.

„ Je suis à présent dans un pays si éloigné, que
 „ je ne puis pas même espérer d'y voir les écrits
 „ dont vous me parlez ; car, outre qu'il seroit dif-
 „ ficile de les apporter ici, je n'y aurois pas aussi
 „ beaucoup de loisir pour les examiner. C'est pour-
 „ quoi si vous écrivez au R. P. Gregorius à S. Vincen-

» *tio* ; je vous prie de l'assurer de mon très-humble
 » service , & de lui faire sçavoir de ma part que ,
 » bien que je n'approuve pas la quadrature du cer-
 » cle , je ne crois pas néanmoins que le *sieur Ægide*
 » *Roberval* ait assez d'esprit pour la refuter , & ainsi
 » que pendant qu'il n'aura point d'adversaires plus
 » forts que cettui-là , il ne lui sera pas mal-aisé de
 » se défendre.

Aynscom ne rapporte cette Lettre de Descartes à la page 108 de son *Expositio ac deductio Geometrica* , imprimée à Anvers, que pour contrebalancer le *noto toto orbi Geometra* de Merienne , & son *nostris Geometricis displicuit* , en faisant voir que Descartes , quoique François , *homo gallus* , & habile Algebriste , *Algebrista egregius* , pensoit bien differemment de Merienne , sur le compte du *sieur AA**** , ou *Ægide Roberval* , qui est le mot de l'Enigme.

Car du reste , Gregoire , Saraffa , Aynscom & toute cette école Flamande renouvelée de celle de Syracuse , faisoit peu de fonds sur le suffrage de Descartes , qu'ils qualifioient volontiers de *Algebrista egregius* , mais qu'ils auroient peut-être eû peine à traiter de Géometre ordinaire ; tant les idées des hommes sont différentes , tant aussi on a excédé dans les panegyriques qu'on a faits de ce grand homme , qui n'a pourtant de grandeur en Géometrie , que celle qui lui revient de l'application qu'il a faite de son Algebre à cette science ; en quoi , pour le dire franchement , il a rendu un plus grand service à l'Algebre qu'à la Géometrie. Nous verrons bientôt la petite guerre qui resulta de-là entre les deux

écoles , celle de Gregoire & celle de Descartes , c'est-à-dire, celle d'Archimede & celle de Diophante.

Il nous reste un article important à discuter dans la censure de Mersenne & de AA*** : il y avoit de l'animosité dans leur fait. Aynscom à la page 28, rapporte une Lettre de Gregoire aux deux Censeurs, dans laquelle on voit éclater une noblesse de sentimens , une liberté de pensées , une modestie , un ménagement , une charité d'expressions qui devoient lui gagner le cœur & l'estime de ses critiques. Point, tout les encourageoit à oser de plus en plus , & le merite supérieur d'un tel adversaire, interdisant tout espoir d'égalité , ne laissoit à des rivaux jaloux que l'amertume dans le cœur , l'erreur dans l'esprit , & le fiel dans le stile.

A force de ronger ils entrevirent dans l'ouvrage sur lequel ils s'acharnoient , un air de methode d'indivisibles : ce n'étoit point elle , c'étoit la méthode d'exhaustion d'Archimede , mais aussi-tôt, sans prendre garde que l'auteur l'attribuoit pleinement à Archimede, Mersenne prit la plume pour accuser de Plagiarisme l'homme du monde le moins digne d'un pareil reproche. *Neque meminerit* , dit-il , *ullatenus Geometriae per indivisibilia eruditissimi Bonaventura Cavalieri* , &c. On aime à voir ces Messieurs prodiguer les éloges à Cavalieri qui en merite en effet de très-grands , mais pas un seul au préjudice de Gregoire , pour qui il n'en échappe pas seulement un mot aux deux célèbres distributeurs du mérite Géometrique. On sçait de quoi cette cabale étoit capable , & la seule édition du prétendu manuscrit

d'*Aristarque de Samos*, pour enlever d'un seul coup à Descartes son système général de Physique, montre leur sçavoir-faire en ce genre.

Comme cependant toutes ces chicanes n'ont pas laissé de jeter un voile sur l'Histoire littéraire, Gregoire de S. Vincent n'ayant eû ni secte ni cabale depuis près d'un siècle pour faire valoir ses droits, & que l'on a pris le train d'enter la nouvelle Géométrie sur les indivisibles malgré l'évidence du fait contraire, malgré la protestation de M. Leibnis, malgré le tort que cela faisoit à la Géométrie, soit en l'exposant à mille fausses lueurs, soit en lui ôtant sa certitude & son évidence, soit en la décriant auprès des esprits foibles, comme Philosophique & conjecturale, il faut une bonne fois discuter un point que toutes ces chicanes, ces méprises, ces manques de bonne foi ont couvert des plus épaisses ténèbres, & rendu infiniment difficile à éclaircir.

La difficulté en est telle que les plus honnêtes gens & les plus clairvoyans s'y sont mépris, & ont aidé à l'imposture en s'y laissant prendre, & que M. de AA *** même le plus grand ennemi des nouvelles methodes naissantes qu'il y ait eu, a trouvé le secret de se faire citer en dernier lieu * comme un de ceux qui y avoit le plus contribué, en mettant la main à la découverte des indivisibles. Mais cette prétention est si frivole que Mersenne même l'a ignorée. Car s'il en avoit eu la moindre idée, le moindre soupçon, il étoit trop sensible à l'amitié & trop curieux d'enfler son rôle d'Editeur d'Ancétotes littéraires, & de Censeur de nouveaux Ouvrages,

* Elemens
de la Géométrie de
l'Infini,
Pref.

pour passer ceci sous silence. Sans doute que AA*** ne se coëffa de cette chimere qu'après la mort de Merfenne.

Quoiqu'il en soit, celui-ci crut retrouver la méthode des indivisibles dans l'ouvrage géométrique de la quadrature du cercle, & il intenta à l'Auteur l'accusation de Plagiarisme; comme si, quand le fait seroit vrai, il ne suffisoit pas que parmi les découvertes que Gregoire s'attribuoit, ou qu'on lui attribuoit, il ne fût jamais parlé de celle de Cavalierius. Or jamais cet Auteur, ni ses Disciples, ni personne, hors Merfenne, n'a dit que la méthode des indivisibles se retrouvât dans l'ouvrage en question. Ils ne l'ont pas dit, & ils n'ont pû le dire, parce que cette méthode n'y est pas, & s'il faut le dire, n'étoit pas digne d'y être.

Cette méthode étoit une vraie enfance & un bégayement, si l'on veut, de la science renaissante, selon M. Leibnis. L'enfance est ordinairement naïve, ingénieuse, mais peu exacte & peu développée, la Géométrie de Cavallieri a tous ces traits. Elle est ingénieuse sans difficulté, mais si embrouillée, si emmaillottée en quelque sorte, si peu géométrique, si philosophique, que jamais la Géométrie ne l'auroit adoptée, si on n'avoit trouvé ailleurs de quoi la corriger & l'éclaircir: *illa falsa*, dit Ainscom, *nisi alio reeducatur; ut à pluribus ostensum est.*

Une preuve évidente que la méthode de Gregoire est fort différente de celle de Cavalierius, c'est que tous les Géometres ayant rejeté celle-là, celle de Gregoire a tout d'un coup passé sans que personne

ait même incidenté ni reconnu le moindre rapport des deux méthodes, si ce n'est Mersenne, qui voyant le succès de cette dernière, s'est avilé de la vouloir confondre avec l'autre pour l'attribuer à celui des deux Auteurs qui piquoit le moins son émulation.

Une nouvelle preuve, & en même tems une chose tout-à-fait de conséquence à sçavoir, & qu'on est bien fâché d'avoir apperçue si tard : c'est que les nouvelles méthodes en sont là encore, que toutes les fois que l'on les presente dans le point de vûë de Gregoire de S. Vincent & d'Archimede, elles ne trouvent aucune contradiction, & que c'est par-là qu'elles entraînent dans leurs conclusions les plus habiles Géometres; au lieu que dès qu'on fait luire, comme on ne le fait que trop, le côté Philosophique des indivisibles, aussi-tôt tout le public & plusieurs Géometres se révoltent, & crient au Paradoxe ! à la contradiction ! à l'erreur !

Ainscom caractérise assez bien les deux méthodes. *Il*a, dit-il, *additione infinitorum indivisibilium, ut sic, procedit : hæc ductum reſtangularum in invicem verè geometricum seu multiplicationem continet.* Voilà la difference, la même qu'entre l'addition & la multiplication, l'addition numérique & la multiplication géométrique, qu'entre un Arithméticien & un Géometre : ce qui démontre de plus en plus la justesse du jugement de M. Leibnis, l'Arithmetique n'étant que l'enfance de la Géometrie, & l'addition une espece d'enfance par rapport même à la simple multiplication, comme la soustraction par rapport à la division.

*Il*a, continuë Ainscom, *ab una specie quantitatatis ad*

aliam nec geometricè nec demonstrativè procedit, hæc geometricâ vereque archimedæâ perficitur exhaustivè. Après tout les deux méthodes sont la méthode d'Archimède, l'une manquée, & l'autre élevée plus haut. Cavalieri a voulu prendre cette méthode d'Archimède, mais la Géométrie lui a manqué plutôt que le génie, car il paroît en avoir eu beaucoup : mais il n'a saisi la chose que par un petit coin ; elle lui a comme échappé en la saisissant : au lieu que Gregoire a comme empoigné, comme embrassé l'ancien système dans toute sa plénitude, avec cette force de génie & cette capacité géométrique qui l'égale à Archimède, lors même qu'il en emprunte quelque chose.

Aussi doit-on bien remarquer que la méthode de Cavalieri n'a été entre ses mains qu'une petite méthode, une méthode de doctrine plutôt que d'invention. C'étoit comme un petit filet d'eau détourné, suffisant à peine pour la culture du petit nombre de découvertes que l'antiquité avoit mises au jour. Tout ce qu'a pu faire son Auteur par son moyen, a été de remanier par cette manière, par cette façon les anciennes découvertes ; & en passant on remarquera que tous ceux qui s'en sont tenus à la première idée des indivisibles, n'ont jamais pu s'élever plus haut qu'à la seconde ou troisième façon des vérités déjà découvertes par d'autres : au lieu que la méthode d'Archimède, élevée par celle de Gregoire, a paru un grand fleuve, plein & abondant qui du premier pas a rempli deux *in-folio* pour le moins de vérités toutes neuves & de l'ordre le plus élevé.

Tout cela revient toujours au témoignage de

M. Leibnis, l'enfance n'étant en aucun genre l'âge de rien enfanter, & ne pouvant jamais, quelque nourriture qu'elle prenne, s'élever au-dessus de sa propre substance. Mais à ce témoignage clair & bien prononcé de M. Leibnis, nous ajouterons le procédé précis & géométrique de M. Nevvton. Il faut croire que les deux Auteurs prochains & immédiats de la nouvelle géométrie, auront connu la vraie base sur laquelle elle s'est élevée, la vraie source d'où elle a découlé.

C'est cette base, c'est cette source que ce celebre Geometre Anglois établit & constate lui-même en 11. lemmes generaux, dès la premiere section de son premier livre des Principes Mathematiques de la Philosophie naturelle, où, sans presqu'aucun calcul, il se sert constamment de la nouvelle Geometrie pour la découverte & la démonstration de la belle & profonde science Physico-Mathematique dont il est comme le Createur.

Il donne ces lemmes sous le titre de Methode des premieres & dernieres raisons propres à démontrer toute la suite de son Ouvrage, *de methodo rationum primarum & ultimarum, cujus ope sequentia demonstrantur*. Comme cette section est toute parallele à ce que Gregoire appelle la troisième partie des *ductus*, on remarquera ce titre, *tertia pars universales quasdam continet Propositiones, reliquis planè fundamentales, quibus corpora ex ductibus orta inter se comparantur*. On va voir le grand rapport de ces deux titres, & qu'ils annoncent le même dessein, & le même but Géométriquement immédiat: Car Nevvton va ensuite
plus

plus loin, à un but Physico-Mathématique, qui est son unique but dans ce bel ouvrage.

Gregoire termine cette troisième Partie, par une Scholie où il dit que son principe ou sa théorie est très-universelle, & que pour éviter les répétitions & l'ennui, il a voulu y renfermer en peu de mots toute l'affaire de l'exhaustion. *Theorema jam demonstratum universalissimum est . . . ne igitur idem discursus in singulis propositionibus labore inutili, & cum molestia lectoris repetendus esset, placuit totum exhaustionis negotium, &c.*

M. Nevvton termine de même la section lemmatique par une scholie, où il dit qu'il a mieux aimé donner ces lemmes pour éviter l'ennui des démonstrations *ad absurdum* des Anciens : *Premisi verò hæc lemmata ut effugerem tedium deducendi perplexas demonstrationes, more veterum Geometrarum, ad absurdum.* Or quelles sont les démonstrations que les Anciens réduisoient à l'absurde, si ce n'est celles qui regardent l'affaire de l'exhaustion? Le but présent des deux Auteurs, est donc d'ériger en théorie directe & générale l'exhaustion ancienne, & ils l'ont parfaitement parallèles dans leur titre initial, & dans leur scholie finale. Il s'agit sur-tout de la théorie mitoyenne.

M. Nevvton déclare lui-même que la méthode qu'il a fait regner n'est point celle des indivisibles; parce que cette méthode est trop dure & une pure hypothese philosophique, *durior est indivisibilium hypothesis*, & qu'elle n'est pas assez Géométrique, & *propterea methodus illa minus Geometrica censetur*: ce qui l'a obligé de recourir aux premières & aux dernières

raisons des quantités naissantes & évanouissantes : *malui demonstrationes rerum sequentium ad ultimas evanescentium summas & rationes, &c.* Il n'est donc plus question que de voir ce qu'il entend par ces premières & dernières sommes & raisons.

La méthode d'Archimede étoit une inscription & une circonscription de Poligones à l'infini , qui se confondoient enfin en dernière raison avec la courbe. La méthode de Gregoire procede aussi par les Poligones inscrits & circonscrits , mais par les derniers qui se confondent avec la courbe : & M. Nevvton ne parle non plus dans ses lemmes que d'inscriptions & de circonscriptions indefinies de Polygones confondus, *ultimò, in ultimâ ratione* avec la courbe. Est-il question de rien de pareil dans la méthode de Ca vallieri ?

Mais les Poligones du Géometre de Syracuse sont des Poligones ordinaires , inscrits par leurs angles & circonscrits par leurs côtés , des Poligones concaves en dedans, convexes en dehors , ou dont tous les angles sont saillans. Difference essentielle par où la méthode Flamande s'élève au-dessus de la Sicilienne, ou de la Grecque qui lui sert de base. Les Poligones de Gregoire , tant les inscrits que les circonscrits , ont leurs angles alternativement saillans & rentrans en forme d'échelons ou de marches d'escalier. Trouve-t-on rien de pareil dans la méthode Italienne des indivisibles ? Mais on le trouve & précisément le même dans la méthode Angloise , & en général dans toute la méthode, moderne , Francoise , Allemande , Européenne en un mor.

P R E L I M I N A I R E. lxxij

L'œil même ne peut s'y méprendre. Qu'on envisage les figures des lemmes Nevvtoniens, sur-tout des quatre ou cinq premiers, on les verra précisément les mêmes que celles de la troisième partie du *Ductus* Gregorien. Or les Propositions sont les mêmes, les conclusions les mêmes, le raisonnement le même : Les figures inscrites & circonscrites différenciant entr'elles par une somme de plusieurs petits rectangles dans l'une & l'autre méthode, & les deux Auteurs s'attachant également à prouver que cette somme est égale à un rectangle qui a été fait, dans la construction, moindre qu'une grandeur donnée, *dato minus*, dit l'un & l'autre Auteur.

Et de-là l'un & l'autre, multipliant les petits rectangles à l'infini, concluent que le rectangle qui leur est égal, & qui est l'excès de la figure circonscrite sur l'inscrite, est infiniment petit, nul, ou *minus quam datum quodvis*, dit Nevvton, ou *minus quocumque dato*, dit Gregoire. Et de là encore ils concluent enfin que les trois figures, l'inscrite, la circonscrite & la courbe mitoyenne sont égales, dit le Géometre Flamand, *in ratione ultimâ aequalitatis*, dit le Géometre Anglois, ou *ultimo aequales*.

Remarquons au reste, que quiconque liroit M. Nevvton d'un œil distrait, ou ignorant, ou malin, & le verroit tranché par tout de rectangles infiniment minces qui remplissent les figures inscrites & les circonscrites, s'imagineroit facilement qu'il suit la méthode des indivisibles, tandis qu'il nous avertit lui-même qu'il ne la suit pas à cause de son caractère dur, hypothétique & peu géométrique. Mer-

fenne n'a point eu d'autre raison pour croire que Gregoire avoit suivi cette méthode. C'est ainsi que nous avons vu qu'on avoit crû le Livre des Principes de M. Nevvton tout plein de calcul. Qu'il y a peu de Lecteurs qui lisent dans un Livre ce qu'ils y lisent en effet ! & qu'en Géometrie , sur-tout , il est rare qu'on ait les idées précises de ce qu'on croit sçavoir le mieux , & dont on se mêle souvent de décider même en Auteur dogmatique !

Une remarque plus importante & plus instructive que celle-là , c'est que la seule forme des Polygones inscrits & circonscrits de Gregoire de S. Vincent, cette forme d'échelons qui ne paroît rien , a été décisive pour la naissance des nouveaux calculs , le différentiel & l'integral , & pour toutes les méthodes analytiques des tangentes , de *maximis & minimis* , des perpendiculaires , des quadratures , des rectifications qui en dependent. Peut-être tout cela seroit-il à naître encore si la méthode en étoit restée aux Polygones paralleles d'Archimede , qui ne different de la courbe que par des segmens mixtilignes , ou aux simples indivisibles de Cavallieri , dont pour cette raison précise la méthode étoit infeconde , & une pure méthode de doctrine.

Mais dès que les Polygones inscrits furent à échelons , la figure même presenta d'un côté un rectangle qui étoit l'élément de la quadrature de la courbe , ce qui donna le calcul integral , & de l'autre côté un petit triangle dont les deux côtes intérieurs étoient la décomposition naturelle des côtes infiniment petits de la courbe ; exprimant leur position

oblique, les angles du Polygone, la position des tangentes, & la rectification même élémentaire de cette courbe, d'où résulta le calcul différentiel & tout ce que les nouveaux calculs ont de plus merveilleux.

On a beau dire, beau vanter les nouveaux calculs comme s'ils étoient tombés du ciel, ou inspirés par revelation, ou dûs à un rare & puissant effort d'imagination. On n'invente que de proche en proche, & les plus hautes découvertes sont les mieux préparées. Dès que le petit triangle infinitesimal eût paru entre la Courbe & le Polygone à échelons, le celebre *Barrow* le remarqua, & les très-celebres *Newton* & *Leibnis*, sans avoir eû trop besoin de se donner le mot, le mirent en calcul, suivant la maxime Cartesienne qui avoit prévalu, de tout mettre en calcul; maxime même déjà appliquée aux Infiniment petits par l'illustre *M. de Fermat*, & même à ce petit triangle par *Barrow*.

Aynscom a quelque chose encore à nous dire en réponse à son *P. Merfenne* au sujet de l'accusation de Plagiarisme. C'est que la méthode de *Gregoire de S. Vincent* étoit publique & publiée avant celle de *Cavallieri*: Voici le fait. *Gregoire* étoit extrêmement vieux lorsqu'il donna son grand ouvrage, & on comprend bien que la plupart des grandes parties de cet ouvrage, & sur tout sa grande & primitive méthode de *Ductu* devoient être faites long-tems avant qu'il les publiât.

Aynscom atteste que le livre de *Ductu*, où est cette méthode, fut composé en 1621; que deux ans après, c'est-à-dire, en 23, l'Auteur l'envoya à Rome à

Griembergerus son ami & habile Geometre pour l'examiner : chose dont les lettres de celui-ci font foi avec bien des témoins qui vivoient lorsqu'*Aynscom* écrivoit ; entr'autres un certain *Guillaume Boelmans* Disciple de Gregoire, lequel Boelmans étant Professeur de Mathematique , fit en 1634, imprimer une these dans laquelle il quarroit la Parabole par la Méthode *de Dufzu* de son Maître.

Ainsi la Methode qu'on veut avoir été prise de Cavallerius , a été composée 14 ans , envoyée à Rome 12 ans, soutenuë en these , & publiée un an, avant que celle des indivisibles ait paru. Car la date du livre de Cavallerius est de 1635 : cela est bien décisif , & fait bien voir l'injustice de Merfenne , & de tous ceux qui ont affecté d'embrouïller ce point d'Histoire. Car on l'a affecté & très-affecté ; on en a les preuves en main qu'on produira pour peu qu'on en soit requis , ou forcé par quiconque s'obstineroit désormais de perpetuer la même injustice.

Après cela comment soupçonner un homme qui a fait un nombre innombrable de découvertes très-supérieures à celle des indivisibles , de s'être rendu plagiaire pour si peu de chose. Car cette méthode d'Exhaustion, la seule chose par où Gregoire ressemble un peu à Cavallerius, n'est que la moindre partie de la méthode *de Dufzu* , qui consiste à former les corps & de très-nouveaux corps à double courbure par la multiplication de divers plans diversement posés à plomb les uns à côté des autres : multiplication locale & de tête qui embrasse la generation des corps par le glissement d'un plan sur un autre , & va beaucoup au-delà.

PRELIMINAIRE. lxxj

Or cette méthode encore de *Ductu* n'est pas elle-même la moitié de la grande & generale méthode de l'Auteur, laquelle embrasse plusieurs méthodes toutes grandes, mais moins generales; celle des proportionalités, celle du calcul des rapports, celle des séries geometriques, celle de comparaison, ou comme il l'appelle, de symbolization, &c. La vérité perce tôt ou tard. Il viendra donc un tems où on ne pourra croire l'excès d'injustice que le siècle précédent a fait à cet Auteur, ni comment on a pu s'y méprendre en faveur d'une infinité de petits Auteurs qu'on a enrichis ou qu'on a souffert qui se soient enrichis de ses dépouilles. Qu'on fouille, qu'on creuse, qu'on compare; plus on étudiera le détail de tout ceci, plus on admirera cet Auteur: car nous ne pouvons en parler encore qu'en general & d'une manière assez vague. C'est une mine & un vrai Perou. Venons à la dispute de Descartes & des autres.

Ce fut *Daniel Lipstorp de Lubec* qui l'engagea, & qui la soutint avec assez peu de succès pour lui & pour son maître, qui se seroit bien passé de se commettre avec des gens de la force de ces Géometres Flamands. Car dans la Lettre de Stockolm, Descartes, en faisant des civilités à Gregoire, & en rabaisissant beaucoup devant lui le sieur *Ægide Roberval*, comme un homme de peu d'esprit & un trop foible adversaire, s'étoit contenté d'insinuer qu'il n'approuvoit pas la quadrature du cercle de l'ouvrage géometrique, ce qui n'engageoit aucune dispute. En effet, la chose en étoit restée là, & Ainsicom

même avoit rendu la politesse à Descartes en le qualifiant de *Algebraista egregius*. Mais Lipstorp , se mettant imprudemment entre Descartes & Gregoire , comme font volontiers les Disciples des grands Maîtres pour se signaler , Lipstorp parla & fit parler son Maître , & la guerre fut aussi-tôt déclarée.

Ces paroles indiscrettes de Lipstorp se trouvent dans ses *Specimina Philosophia Cartesiana*, imprimés en 1653. S'il se fut contenté d'y louer Descartes absolument & sans aucune comparaison odieuse , il ne pouvoit en trop dire. Descartes est sans difficulté un très-grand Homme , grand Métaphysicien , grand Dialecticien , grand Physicien , sur-tout , grand Algebraiste au reste , & même grand Géometre. Car il étoit lui-même plus solidement Géometre que n'ont voulu l'être ses Sectateurs trop asservis au calcul. Mais un Disciple ne se modere gueres sur la gloire de son Maître , persuadé que l'éclat en rejailloit sur lui, d'autant plus qu'il est plus vif.

Lipstorp disoit entr'autres choses que » ce qu'il y » avoit d'admirable dans Descartes , étoit que par » la singuliere pénétration de son esprit , il avoit pû » sans difficulté déterminer ce qui étoit pénétrable » ou impénétrable à l'esprit humain , & si un problème étoit possible ou impossible : *quid humano ingenio pervium esset, quid non; an problema aliquod possibile esset, an minus*. C'est pourquoi, ajoutoit Lipstorp , » ce grand homme n'a jamais touché à ce problème si rebelle de la quadrature du cercle : Car il le » connoissoit si rebelle & si herissé que c'étoit perdre » sa peine & son tems que d'en chercher la solution.

» Desorte

PRELIMINAIRE. lxxiij

« Desorte que le vaste ouvrage de Gregoire de S.
 « Vincent ne l'ayant arrêté que trois jours , il y dé-
 « couvrit la source erronée unique d'où toutes les
 « autres erreurs ont découlé , *unicum in eo erroris fon-*
 « *tem , ex quo reliqui omnes promanarunt , notavit.*

Cette critique , pareille à celles qui sont le plus à la mode de nos jours , étoit infiniment cavaliere & offensante , étant absolument dénuée de preuves , & tout-à-fait du goût de celle de Mersenne. On ne traite point comme cela un Auteur respectable , & un Ouvrage si plein de sublimes découvertes. On ne sçait point comment Gregoire de S. Vincent prit la chose. Mais le Disciple de Descartes trouva dans Ainscom un Disciple tout aussi zélé que lui pour son Maître. Ainscom cependant étoit un homme d'honneur , incapable de passer les bornes d'une légitime défense , & qui ne poussa la recrimination tout au plus qu'à une petite ironie fine & ingénue.

Il ne s'inscrivit en faux contre aucun des éloges absolus qu'on donnoit à Descartes. Mais il dit librement ce qu'il pensoit de la méthode Cartesienne d'Algebre & de Calcul. Il avoit accordé à Descartes le titre d'Algebriste habile , *Algebrista egregius*. Descartes , ni Lipltorp n'en avoient tant dit en faveur de Gregoire : Ainscom ne retracta point cet éloge , mais il s'en tint là , & en continuant de regarder son adversaire comme louable d'avoir perfectionné ou inventé l'Algebre , il regarda cette Algebre comme une petite ressource pour aller plus loint dans la Géometrie. C'étoit le préjugé du tems : nous avons vû que c'étoit aussi celui de M. Nevv-

ton ; & nous avons dit nos raisons en faveur de ce préjugé qui est aussi le nôtre.

Ainscom applaudit donc à la sagesse que Lipstorp attribuoit à Descartes , de n'avoir jamais tenté l'affaire des quadratures : » Non , dit-il , qu'elles soient » impossibles ou impénétrables à l'esprit humain , » mais parce que connoissant bien les bornes & » les limites de son Algebre , *sed quia Algebra sue terminos ac limites probe noscens* , il la jugeoit peu » capable de se mesurer avec un problème si élevé , » *illam tam sublimis problematis solutioni imparem videret* , » & qu'apparemment il avoit désespéré d'en venir » à bout par la Géometrie ordinaire , *communi autem Geometriâ idem perficere se posse desperaret*.

Ainscom ajoute avec raison qu'il est surpris que Descartes ayant découvert cette prétendue source d'erreurs dans l'ouvrage géométrique en question , ne l'ait pas publiée ou fait connoître au moins à quelqu'un , & à Lipstorp même qui auroit pû s'en faire honneur , supposé que Descartes jugeât cet honneur trop au dessous de sa gloire. Pour le moins , falloit-il charitablement détromper le public , auprès de qui l'autorité de Descartes , qui est comme sur-humaine pour ses partisans , auroit été d'un grand poids pour le détromper d'un Ouvrage qui , selon l'expression de Meibom , tenoit enchaîné tout l'Univers , *cum ab autoritate Cartesii , quæ apud illos penè suprà humanam est , non leve momentum res ea habitura esset*.

Cependant Ainscom , fier qu'on n'attaquât un Ouvrage géométrique que par voye d'autorité , &

PRELIMINAIRE. LXXV

par des raisons & des convenances philosophiques , triomphoit & se confirmoit de plus en plus dans la bonne opinion qu'il avoit de son Maître & de ses quadratures , dont il paroît plus persuadé que son Maître même. *Philosophicas rationes* , dit-il , & *nescio quas congruentias afferre , dum de re Geometricâ pronuntiandum , ineptum planè & absurdum est.*

On peut pourtant un peu excuser Descartes , qui du reste avoit eu la sage discretion de ne rien hasarder là-dessus dans le public. L'événement entraîna les sages , & les plus grands Philosophes ont peine à se défendre de toutes sortes de préjugés populaires. L'esprit de l'homme est ainsi fait que tout ce qui est un peu difficile il le traite d'impossible , & que tout ce que bien des gens ont souvent tenté sans aucun succès , lui paroît une chose à l'épreuve de toutes les tentatives. La quadrature du cercle est certainement jusqu'ici au-dessus de tous les efforts qu'on a faits pour y parvenir.

Peut-être n'y a-t-il point eû de grand Géometre depuis Euclide jusqu'à Archimede , & depuis Archimede jusqu'à Gregoire de S. Vincent inclusivement , qui n'ayent travaillé toute leur vie pour la trouver. Depuis ce tems là on y a peut-être un peu moins travaillé en général ; on assure pourtant que M. Nevvton s'y est exercé toute sa vie ; & du reste les quadratures en général , & la quadrature du cercle en particulier , ont été le grand objet de la nouvelle Géometrie. Il paroît cependant qu'elles ne sont pas l'objet propre du calcul , & qu'au moins l'Analyse Cartesienne n'alloit point-là. De soi l'Analyse est

bornée à ce qu'on appelle des Problèmes, *Problèmes lineaires*, en prenant cette expression dans un sens un peu étendu. Descartes ne pouvoit pas tout faire, & c'étoit beaucoup que de corriger le mauvais goût de son tems. La Géometrie y étoit dégénérée en un petit calcul Algebrique & en petits problèmes qui n'avoient pour objet que les propriétés abstraites des nombres. Descartes ramena le calcul à la Géometrie, & aux problèmes géométriques, à déterminer des points, à trouver des lignes, à ce qu'on appelle les lieux géométriques & la construction des équations. Ces problèmes par leur subtilité valent bien peut-être toute autre sorte de Géometrie ; mais ce ne sont que des problèmes, des moyens & non un but, des moyens même inutiles & frivoles, & qui cessent d'être des moyens dès qu'on s'y arrête comme à un but : ce sont des pratiques spéculatives & idéales, plus difficiles même que les plus subtiles théories.

Enfin la Géometrie Cartesienne ne passa jamais cette borne, & peut-être même ne l'aurions-nous point encore passée, vû l'ascendant que prit d'abord la méthode Cartesienne : mais Gregoire de S. Vincent avoit par trop de découvertes & de nouvelles vûës ouvert la véritable carrière, & montré le vrai but & la vraie Géometrie, qui consiste à mesurer les corps, les surfaces & les lignes, & par conséquent à trouver des quadratures : Car sous ce nom général de quadratures on entend la mesure de ces trois sortes d'étendus.

Descartes donc nourri au calcul, à l'algebre, aux

PRELIMINAIRE. lxxvij

problèmes , & voyant que tous les efforts qu'on avoit faits pour la quadrature du cercle avoient échoüé , ne doutoit pas apparemment qu'elle ne fût impossible , & s'applaudissoit comme d'un trait de prudence & de sagesse , de s'être jetté dans un genre de Géometrie qui l'éloignoit peut-être plus qu'il ne pensoit du vrai bur.

Cependant le Livre de Gregoire de S. Vincent parut & excita en naissant de grands mouvemens dans les esprits. Le premier jugement de Descartes fut sans doute celui que Lipstorp rapporte , que l'Auteur avoit manqué le but comme les autres ; & comme l'Ouvrage étoit vaste , il crut que sur quelque faux principe Gregoire avoit entassé bien des erreurs : non-seulement Descartes , mais tout Géometre un peu au fait , sans être même persuadé de l'impossibilité , & sur la seule connoissance de l'extrême difficulté du projet , porte le même jugement de tout nouvel Ouvrage qu'on lui présente sous le titre de la Quadrature du Cercle.

Etoit-ce la peine de lire un Ouvrage bâti sur un faux principe , aboutissant à un Paralogisme , & tout semé par conséquent de grossieres erreurs ? Descartes vrai-semblablement jetta les yeux sur l'ouvrage géométrique , le parcourut des yeux , mais ne le lut pas. Les trois jours qu'on dit qu'il s'y arrêta , ne sont apparemment que pour la forme & pour une certaine bienséance. Avoir lû un ouvrage si vaste & si plein en trois jours , n'étoit pour Descartes même que l'avoir effleuré des yeux.

Comme même le principe d'erreur en question

n'est qu'en idée , que le courant de l'ouvrage est fort sain , & que s'il y a des erreurs elles sont en petit nombre & uniquement dans la conclusion , & dans le morceau final des quadratures , c'est-à-dire , dans les trente ou quarante dernières pages de tout l'ouvrage , il est clair que pour trouver ces erreurs , il auroit falu parcourir un enchainement de près de deux mille Propositions , nouvelles & profondes , herissées même & difficiles : chose tout-à-fait impossible en trois jours , ou même en trois mois , alors sur tout que rien de tout cela n'avoit été remanié ni éclairci : Car aujourd'hui quelqu'un qui sçait un peu les nouveaux calculs , sçait presque tout son Gregoire d'avance , & peut le lire facilement en peu de mois.

Le lire ! ou le parcourir des yeux pour y reconnoître les choses qu'il fait déjà ! Car il y a raison de douter , qu'un esprit accoutumé au calcul fût capable non-seulement de la patience , mais même de l'attention & d'une certaine pointe de pénétration , que demande une suite de raisonnemens distincts , articulés & bien énoncés par de vraies syllabes , de vrais mots , un vrai discours. Et sur ce pied Descartes lui-même auroit eu peine à se captiver à lire un ouvrage de pure Géometrie de l'étendue de celui-ci. Et on peut croire que la persuasion où il fut d'abord de la quadrature manquée , augmenta en lui la repugnance qu'il avoit à cette lecture , & qu'à son tour cette repugnance confirma tout-à fait cette persuasion : & qu'ainsi Descartes n'avoit jamais lû ce Livre ni en trois jours ni en mille , lû au moins pour

en juger d'une maniere digne de lui, & de cette façon décisive que lui prête Lipstorp.

L'Ouvrage avoit pourtant des Partisans & des Admirateurs, & Descartes avoit les siens aussi, & étoit un Maître en Israël. Descartes étoit même homme à entrevoir un nombre de découvertes & de sublimes vérités qui brilloient dans cet Ouvrage. Voilà les principes sur lesquels il se gouverna dans tout ce que le commerce du monde l'engagea de faire ou de dire en public ou en particulier sur cet Ouvrage. En public & dans les discours qui pouvoient revenir à l'Auteur ou à ses Disciples, comme la Lettre de Stockolm que nous avons rapportée, Descartes parla obligeamment de l'Auteur, & rechercha son amitié, se contentant d'insinuer son sentiment sur le point particulier de la quadrature circulaire.

Mais en particulier, & devant ses Disciples affidés qui sans doute le pressioient de s'expliquer & n'avoient les yeux que sur lui, en attendant l'Oracle pour juger eux-mêmes d'un Ouvrage qui tenoit toute l'Europe sçavante enchaînée, en servitude ou en suspens. Descartes, obligé de parler clair & en Maître, crut sans doute pouvoir hazarder le jugement définitif, que Lipstorp eut l'imprudence de faire éclater.

Descartes ne fut pas le seul grand Géometre, qui se laissa imposer par le préjugé général de l'impossibilité de la quadrature; quoiqu'il fût un des plus réservés à faire éclater son jugement ou son préjugé contre l'Auteur; réserve qui fait sentir elle seule sa supériorité sur tous ces grands Géometres. M. Hu-

guens de l'Académie Royale de Paris , & le P. Leotaud Jésuite, inférieurs en ce point à Descartes, mais supérieurs aux AA*** & aux autres critiques, passant à l'Auteur tous ses préliminaires, toutes les vrayes découvertes, c'est-à-dire, tout son premier volume & plus des trois quarts & demi du second, renfermerent sagement leur critique ou leur examen dans le morceau final des quadratures. Huguens fit un Livre exprès pour en découvrir le faux : Ce Livre porte le nom Grec de *ἐξέτασις* ou *exetasis*, critique ou discussion.

Cette critique, non plus que celle de Leotaud ne demeura point sans réponse. Ainscom fidèle à son Maître le défendit *tela omnia contra*, & ce qu'il y a de surprenant le défendit bien, & personne ne put alors se vanter d'avoir découvert le faux ou le foible des quadratures de S. Vincent. La plupart n'y trouverent d'erreurs que celles qu'ils substituerent eux-mêmes à celles qu'ils y imaginoient & qu'ils vouloient absolument y trouver : Or ce qu'on ne put faire alors, personne ne l'a tenté depuis, & les vrayes beautés de l'Ouvrage gagnant d'un autre côté la Géometrie, & l'habitude de lire les Livres de pure Géometrie se perdant à force de calcul, le gros du public Géometre perdit de vûë Gregoire & l'erreur même de ses quadratures; ceux qui auroient pû en découvrir le défaut ayant intérêt à faire oublier jusqu'au nom même de l'Auteur, c'est-à-dire., de la mine où ils puisoient de quoi embellir leur calcul.

J'ai dit le *foible* & le *défaut* des quadratures de Gregoire:

Gregoire : Car Lipstorp , AA*** , Merfenne , Meibom , Alexis Sylvius , Huguens , Leotaud , Descartes , outrerent les choses en voulant y découvrir des erreurs , & surtout des sources d'erreurs. Ils n'y en découvrirent point , mais le comble du Paradoxe fut qu'ils ne pouvoient pas même y en découvrir , parce qu'il n'y en avoit point , si ce n'est un petit nombre de la part de l'Imprimeur , dont AA*** eut la gloire d'en découvrir une qui lui attira un sincere remerciement de la part de l'Auteur.

C'est ici une espece de prodige ou de merveille de l'esprit humain , qu'on ne prie personne d'admirer ni de croire avant que de l'avoir verifié de ses propres yeux. Est-il croyable qu'un Auteur ait entrepris de trouver la quadrature du cercle , que pendant cinquante années il l'ait suivie de très-près , & comme de poste en poste , par toutes sortes de routes nouvelles & de sentiers escarpés , à travers trois , ou peut-être six mille propositions , & que tous les plus grands Géometres d'un siècle entier où la Géometrie a été extrêmement cultivée , aient trouvé dans ce labyrinthe une multitude innombrable de vérités sublimes & fécondes sans pas une erreur , & que l'Auteur n'ait manqué que son dernier but sans jamais s'égarer dans le chemin ; qu'il ait manqué ce but en le saisissant , qu'il l'ait saisi sans le prendre , qu'il l'ait pris sans le tenir ?

Il est tems d'éclaircir ce mystere & de résoudre ce problème qui n'est pourtant pas sans exemple dans la Géometrie. Gregoire a donné la quadrature comme Euclide & Archimede l'avoient donnée , &

comme les plus grands Géometres de ce siecle l'ont donnée, non absolument, mais hypothetiquement. Euclide ou Archimede ont démontré que le cercle est égal à un triangle qui a pour base sa circonference, & pour hauteur son rayon, que la circonference est égale à la tangente de la spirale, que la sphere est égale à un cone qui a sa surface pour base, & pour hauteur son rayon, que la surface spherique est quatre fois le cercle générateur, que le cylindre est triple de la sphere & du cone, &c. C'est ainsi que Torricelli a démontré, ou tout autre, que la Cycloïde est triple du cercle générateur; Gregoire, que la tangente de la parabole donne la rectification du cercle; M. Nevvton, qu'une infinité de courbes étoient quarrables, en supposant la quadrature du cercle ou de telle autre de ces courbes, &c.

Voilà tout le mystere, & la maniere dont notre Auteur a quarré le cercle sans le quarrer; comme qui mesurerait une chose par une mesure immesurable elle-même ou inconnue enfin; Auteur plus admirable au reste, après s'être si avant engagé dans un si tortueux dedale, d'avoir retrouvé pour en sortir la porte par où il y étoit entré, que si le hazard l'avoit fait aboutir, comme il pouvoit arriver, à l'issuë par où il avoit prémédité de sortir avec son butin; puisqu'enfin il en est toujours sorti, sinon sans gloire, du moins sans aucun deshonneur & sans payer aucun tribut à l'erreur, & en remportant même avec assez de gloire de bons lambeaux de cette riche toison.

Il vient de nous échaper que le hazard auroit bien

pû conduire l'Auteur à l'issuë de son projet , comme si nous pensions que la quadrature du cercle fût une chose possible à trouver. Et pourquoi ne le pensions-nous pas en effet ? Descartes l'a cruë sans doute tout-à-fait impossible. Aujourd'hui cette idée paroît la plus repandue parmi nos Géometres, & M. de Fontenelle qui est un des plus célèbres a insinué dans ses élémens de la Géometrie de l'Infini , pp. 513 , & 14 , une espece de démonstration de cette impossibilité.

Mais, outre que l'ingenieux Auteur est bien éloigné de donner sa démonstration pour géometrique, ou même absolument pour une démonstration régulière d'aucune espece , & que toute cette théorie Métaphysique découle du principe d'un infini numérique, dont on a démontré le faux , il n'y a pas d'incommensurabilité qui empêche le rapport du diamètre à la circonférence , ou du quarré au cercle , d'être un rapport fini & déterminé assignable de soi & déterminable par conséquent.

Une preuve même sans réplique , que toutes ces espèces diverses d'incommensurabilités auxquelles on veut élever le cercle , sont fausses , c'est que la quadrature d'un cercle infini , ou d'une portion infiniment petite d'un cercle fini, est possible , & même déjà donnée (*Mathem. univers. pag. 651 :*) ce qui seul démontre que l'incommensurabilité de la quadrature est de la première espece , & sans doute de la seule réelle , de la seule au moins qui soit démontrée. Car cette incommensurabilité est telle , que l'infini la fait disparaître & reparoitre tout à

tour, témoin la diagonale & le côté dont les quarrés font commensurables, les cubes incommensurables, &c.

Après cela l'incommensurabilité n'empêche pas qu'on ne trouve tout aussi facilement par la Géométrie les incommensurables que les commensurables, l'incommensurabilité n'étant pas tant une difficulté géométrique qu'une impossibilité Arithmétique, qui vient de l'imperfection des nombres comparés avec l'étendue, dont ils ne sçauroient exprimer les richesses, n'étant faits que pour marquer les bornes, & ne pouvant jamais représenter la grandeur absoluë qui est infinie.

S'il y avoit diverses especes d'incommensurabilité plus élevées les unes que les autres, elles se serviroient les unes aux autres comme de contregardes ou d'avant-murs. On ne pourroit approcher de la seconde qu'après avoir atteint la premiere, & comme on ne pourroit qu'approcher de la premiere sans jamais l'atteindre, toute approche de la seconde, & à plus forte raison de la troisième & de la quatrième, seroit absolument interdite. La quadrature est donc de la premiere espece d'incommensurables, puisqu'on en approche d'aussi près qu'on veut, d'aussi près enfin que de la racine par exemple, de 3, de 5 de 6, &c. sans jamais rencontrer de mur ou de fossé qui barre le chemin, & qui en tienne éloigné d'aucune distance déterminée. C'est peut-être ici une démonstration contre les ingenieuses conjectures du sçavant Académicien.

Personne n'a donc démontré ni même gueres en-

trepris de démontrer l'impossibilité de la quadrature du cercle. Mais on a souvent entrepris de démontrer, & tous les plus célèbres Géomètres ont supposé la possibilité de cette quadrature. Mais nul ne l'a tenté avec plus de subtilité & de profondeur qu'un certain Auteur Allemand ou Flamand, Disciple ou Contemporain de Gregoire de S. Vincent: son nom est *Della faille*. C'est dans une simple These de Mathématique qu'il a fait voir que le centre de gravité d'un Arc, ou d'un Segment circulaire étant donné, le cercle seroit quarré.

C'est-là une quadrature hypothetique & une des belles découvertes particulieres du dernier siecle. Dira-t-on qu'un arc ou un segment de cercle n'ont point de centre de gravité? Le contraire est demonstratif. Il faut cependant donner aux choses leur valeur, & convenir qu'il n'y a pas plus de démonstration géometrique de la possibilité que de l'impossibilité de cette quadrature, & que seulement cette possibilité est démonstrative, & l'impossibilité simplement présumée, parce que le cercle comme toute autre courbe a une quadrature, c'est-à-dire, est égal à une figure quarrée ou rectiligne, & que la capacité est déterminée entre des limites qu'on assigne & qu'on raproche, sinon infiniment, du moins à l'infini.

Quelques prétendus Géomètres ont imaginé que le cercle échappe par sa courbure, d'autres par son uniformité, par sa perfection: comme si nous ne quarrions pas bien d'autres courbes, ou comme si la quadrature du cercle n'étoit pas inséparablement

liée à celle de l'ellipse, de l'hyperbole, & d'une infinité d'autres courbes non uniformes, non parfaites, bizarres même, & même rectilignes. Car le cercle est égal à un triangle qui a pour hauteur le rayon & pour base la circonférence; & qu'on ne dise pas que cette base est fictive & que la circonférence ne peut se redresser, puisqu'elle est démontrée égale à la tangente naturellement droite de la spirale, ou de la parabole.

Sous la forme même circulaire & entre des lignes purement circulaires, ne quarre-t-on pas la lunule d'Hippocrate & les diverses portions, selon toute raison donnée? Gregoire de S. Vincent n'a-t-il pas réduit avec un art merveilleux des corps circulaires & non circulaires qu'il a cubés, & dont il a quarré les surfaces circulaires? L'ellipse cylindrique de *Lalouberie* n'est-elle pas quarrée?

A quoi tient-il donc qu'on ne quarre le cercle? si nous sçavons précisément à quoi il tient, dès ce moment il ne tiendrait plus à rien. Nous ôterions l'obstacle s'il étoit clairement reconnu, & dans le cas de l'impossibilité, nous sçaurions qu'on ne peut l'ôter, & le problème seroit résolu, même par son irrésolubilité démontrée. Mais si nous ignorons la difficulté précise, & le moyen précis approprié pour la surmonter, nous sçavons en général la route qu'on peut prendre pour y arriver, & celle qu'on a prise jusqu'ici pour arriver à d'autres quadratures, sinon aussi difficiles, qui avoient au moins leur degré de difficulté.

Car tout cela ne peut rouler que sur la différence

du plus au moins de difficulté. Et comme notre unique but dans une si longue Préface, n'est & ne peut être que d'ouvrir les vraies sources de l'invention géométrique, d'en montrer le vrai but, d'en indiquer les vrais moyens, il est tems que nous recueillions de tout ce qui précède une méthode d'étudier & de cultiver la géométrie, qui nous mène au but ou à des choses au moins aussi importantes que le but particulier & précis de la quadrature du cercle.

On peut absolument se passer d'arriver à ce but, si on ne regarde que l'usage pratique de cette quadrature, puisqu'on en approche autant qu'il le faut & qu'on le peut dans cette pratique usuelle. Mais on ne doit pas, malgré cela, cesser d'envisager ce but, puisque la providence semble y avoir attaché les autres découvertes, & les avoir toutes semées sur le chemin qui y conduit, & qu'enfin en toutes sortes d'opérations spirituelles & mécaniques l'homme a besoin de se proposer un but élevé.

Car il est élevé, & nous ne devons pas en dissimuler la difficulté à ceux à qui nous le proposons, étant bien éloignés, en aiguillonnant les pusillanimes, de vouloir trop encourager les présomptueux. Ce sont les Géomètres habiles qui sont ici les pusillanimes, parce qu'ils sentent en effet la difficulté : & il n'y a que les petits génies, les demi-Géomètres qui entreprennent la quadrature avec trop de confiance, sans prendre presque aucun des moyens nécessaires pour en surmonter la grande difficulté : de tels gens n'arrivent pas au but, & ne cueillent mê-

me sur le chemin aucune autre espece de découverte, mais un nombre d'erreurs pareilles à celles que Descartes soupçonnoit & que Roberval, Merfenne, Huguens vouloient trouver dans Gregoire de Saint Vincent.

Prennent-ils même le vrai chemin, ces chercheurs de pierre Philosophale plutôt que de quadrature ? munis à peine d'un peu de Géometrie élémentaire, ils errent au hazard, portant la présomption & l'ignorance jusqu'à dire que le hazard pourra bien un jour enfanter cette grande découverte, & que ce sera peut-être un médiocre Géometre de bons sens qui fera le coup. Car, disent-ils, les prétendus grands Géometres y font trop de façons & c'est du raffinement que toute cette Algebre, cette haute Analyse, cet infini équivoque, ces sections coniques, ces courbes, &c. Voilà en vérité de beaux titres pour entreprendre une découverte de cette force, que des peut-être & des hazards préparés par une médiocrité de genie & de science avec une dose de bon sens, comme si le bon sens alloit-là !

Mais c'est ce hazard qui merite un bon éclaircissement, parce qu'il a passé comme en proverbe parmi même les Philosophes & les Géometres habiles, & dans les Livres comme dans le discours, que c'est le hazard qui fait les découvertes, & que ce sera peut-être un ignorant en Géometrie qui trouvera la quadrature en question.

Nous ne voyons pas cependant qu'un Physicien fasse des découvertes géométriques, ni qu'un Géometre purement Géometre en fasse de Physiques, ni

PRELIMINAIRE. lxxxix

ni un Horlogeur dans la Peinture , ni un Peintre dans la Méchanique , ni un Méchanicien dans la Chimie , ni un Chimiste dans la Théologie , ni un Théologien dans la Médecine : chacun en fait dans son métier & dans la sphere qu'il habite. Or chaque sphere générale a ses spheres particulieres & subalternes , ou ses divers degrés d'élevation ; Jupiter a ses Satellites diversement éloignés de son centre , selon le degré de leur pesanteur. La sphere terrestre même a ses couches & ses élémens. Si les animaux faisoient des découvertes , nul hazard n'en feroit faire aux Poissons dans l'air , ni aux Oiseaux dans l'eau.

De même celui qui ne sçait que les élémens d'Euclide & qui ne connoît que la ligne droite & le cercle , n'ajoutera jamais aux propriétés des sections coniques , l'Arithmétique ne perfectionnera jamais l'Algebre , le simple Algebriste n'enrichira point d'une nouvelle formule le calcul infinitesimal , l'Astronome ne trouvera point le passage de l'Europe à la Chine par les mers du Nord , ni le Géographe la conciliation de l'immobilité de la terre avec son transport autour du Soleil. Et par une suite naturelle un petit esprit ne fera point de découvertes de l'ordre le plus élevé , ni un demi Géometre de celles qui demandent une profonde connoissance de la Géometrie , ni un paresseux de celles qui sont le fruit d'un grand raisonnement , d'une longue méditation , d'un travail épineux , pas plus qu'un homme qui sera à la Chine fera la découverte des mines du Potosi.

Chaque but a son chemin , chaque fin a son
m

moyen , chaque ouvrage a son travail , chaque problème a son degré de difficulté qui demande un degré de genie & de capacité. Un Géometre monté par son esprit & par sa science , c'est-à-dire , par ses connoissances naturelles & acquises au niveau de la quadrature du cercle , peut bien ne pas la trouver , s'il ne la cherche pas , ou s'il se jette , même en la cherchant , dans des sentiers qui l'en écartent malgré lui & comme sous-main , sans qu'il s'en apperçoive. Il peut aussi fort bien la trouver comme par hazard & sans la chercher d'une maniere expresse & sans y penser.

Mais ce n'est jamais qu'un demi hazard , puisque la cause précise & unique pourquoi il la trouve , est parce qu'il a du genie , parce qu'il a de la science , parce qu'il s'applique , parce qu'il connoît son objet , qu'il s'y affectionne , qu'il le manie , qu'il le tourne & le retourne , qu'il l'envisage de tous les côtés , de tous les sens , parce qu'il pense jour & nuit à des choses qui y sont liées , qui y ont des rapports prochains , qui de soi y aboutissent. Celui qui découvrit les mines du Perou , étoit au Perou , dans l'endroit même où étoit la mine , & parce qu'il arracha un arbruste qui tenoit à la mine ; il n'y eut à cela d'autre hazard qu'en ce qu'il n'y pensoit pas ; c'est-à-dire , en ce qu'il ne connoissoit pas la mine avant que de la connoître.

Pour trouver donc la quadrature du cercle , ou enfin quelque chose d'équivalent , il faut se mettre à portée d'y atteindre , laissant à faire au hazard le moins qu'il est possible , c'est-à-dire , uniquement la dernière démarche , qui consiste à ne la recon-

noître qu'au moment qu'elle se présente ; mais à se mettre en état de la reconnoître alors , & de ne pas la manquer. Car celui à qui la mine se découvrit après qu'il eût arraché l'arbusle , n'en auroit pourtant jamais fait la découverte s'il n'avoit eu des yeux pour la voir , & un esprit même pour la discerner , s'il n'eut connu l'Or , s'il n'avoit même eu quelque connoissance de l'Or en mine.

Il s'agit donc de savoir le degré précis , ou général au moins , de genie & sur-tout de capacité , requis pour être à portée de cette découverte ou de toute autre découverte géométrique de pareille espèce. Et pour cela il faut sçavoir à peu-près le degré de difficulté du Problème. Par exemple, la quadrature de la Lunule d'Hippocrate est évidemment du premier degré , puisqu'on l'a découverte dès le commencement & dans un tems où la Géometrie ne fournissoit que des secours de l'ordre le plus bas & une grande modicité de vûes Géométriques , c'est-à-dire, la simple Géometrie d'Euclide, le triangle & le cercle , la regle & le compas.

Au lieu que la quadrature de la Parabole, quarrée d'abord par le secours extraordinaire de la mécanique , & ensuite d'une maniere plus géométrique par Gregoire de S. Vincent , mais par un ordre de Géometrie plus élevé & par les sections coniques, cette quadrature étoit du second ordre de difficulté *au moins* : Car le génie extrêmement élevé d'Archimede & de Gregoire même, peut avoir abaissé tout d'un coup au second degré , ce qui pour les bons esprits ordinaires auroit été peut-être du trois ou qua-

trième. Cependant il paroît qu'il n'y faloit que la connoissance un peu profonde des sections coniques, suivant la nature du problème, comme il ne faloit à la lunule que le cercle & le triangle.

La trisection de l'angle & la duplication du cube appartiennent évidemment au troisième ordre de difficultés, parce qu'il y faut non-seulement la connoissance simple des sections coniques, mais leur comparaison & leur complication aussi. L'ancienne Géometrie d'Euclide & d'Apollonius cherchoit en vain la résolution de ces problèmes : ils n'étoient pas mûrs même pour le grand Archimede à moins que son genie ne suppléât aux moyens géometriques du troisième ordre, par quelque moyen extraordinaire pareil à celui qui lui avoit donné la quadrature de la parabole.

Mais admirons la témérité des chercheurs de problèmes de profession, qui, sans pouvoir se flater du genie d'Archimede, & sans aucune connoissance des sections coniques, ni d'Apollonius, ni de Gregoire, cherchent pourtant toujours la trisection & la duplication par la Géometrie d'Euclide, par la regle & le compas, quoiqu'il soit décidé que les problèmes sont du troisième ordre au moins, & qu'ils soient même résolus autant qu'ils peuvent l'être.

On ne peut pas prétendre à définir les ordres consecutifs avec précision ; mais en regardant Euclide comme un premier ordre de Géometrie & de moyens géometriques, Apollonius comme le second, Archimede comme le troisième, & Gregoire de S. Vincent comme le quatrième, & leur asso-

ciant , si l'on veut, leurs ordres collateraux de calcul qui sont comme des moyens de moyens , associant Diophante à Euclide , Viète à Apollonius , Descartes à Archimede , Nevvton , Leibnis & tous les nouveaux Analystes à Gregoire , & remarquant enfin que la quadrature n'est au niveau d'aucune de ces quatre Géometries , & qu'elle s'éleve au-dessus de ces quatre ordres , on peut tirer ces conclusions.

1°. Qu'elle est au moins du cinquième ordre de difficulté. 2°. Que pour y atteindre , il faut , se mettre au niveau de ces quatre ordres de géometrie, les sçavoir & en être bien possesseur : Et *peut-être* même , 3°. s'élever au-dessus de ce quatrième ordre à peu-près comme Gregoire s'est élevé au-dessus d'Archimede par l'invention de plusieurs moyens géométriques nouveaux , & par une amplification de la Géometrie ou de la matiere géométrique.

On dit *peut-être* , & c'est pour la consolation de ceux qui cherchent la quadrature , ou qui veulent se signaler par des découvertes d'un ordre un peu élevé , & qui ne soient pas de simples corollaires de celles qui ont précédé. Car on peut douter si le calcul auquel on a assujetti toute la géometrie moderne , n'a pas épuisé d'un côté le génie de ses inventeurs , des Descartes , des Leibnis , des Nevvtons , &c. & si d'un autre côté il n'a pas émoussé un peu les esprits subalternes ; & si enfin tous ces grands hommes recueillant les découvertes des quatre ordres de pure Géometrie qui avoient précédé , en prenant sur tout l'esprit , & en suivant le même fil d'invention , n'auroient pas atteint déjà tout-à-fait le bur , dont il

y a grand lieu de croire que Gregoire de S. Vincent n'étoit pas éloigné.

C'est dommage que la vaste étendue de cet Auteur, l'ait mis comme hors de portée, pour la plupart de ceux qui ont cultivé depuis ce tems-là la géometrie, & que ceux qui ont pû le lire, ayent été trop sensibles au détail de ses découvertes, & à la gloire qui pouvoit leur revenir du talent qu'ils avoient de les remanier par le cacul. Moyennant cela presque personne n'a pû ou voulu se donner la peine d'embrasser le corps entier de l'Ouvrage : personne n'en a pris le plan général, le système, l'esprit.

C'est cet esprit, le même que celui d'Archimede, d'Apollonius, d'Euclide, de toute la saine antiquité, qui pouvoit seul, & qui pourroit seul encore aujourd'hui ranimer l'espoir de la quadrature, en reveiller les étincelles, en revivifier les semences. Car on a beau dire qu'en chemin faisant, Gregoire a semé mille théories qui ne se rapportent point à cette quadrature : Il n'y a pas une proposition dans tout cet immense ouvrage qui n'aille très-directement à ce but, qu'il s'étoit proposé dès le commencement, & qu'il n'a pas perdu un seul instant de vûë.

La géometrie a-t-elle d'autre but aprèstout? Tout Auteur systématique qui cultivera cette science de tête & avec connoissance de cause, sans trop masquer son objet de calcul, aboutira toujours là, ou tournera nécessairement tout autour. Le calcul tourne, mais ne fait que tourner comme par un cercle.

dont elle est le centre. La méthode ancienne qui est celle du génie & du raisonnement clair & articulé, tourne peut-être, mais en approchant, comme par une spirale, dont il faut espérer que les retours ne seront pas infinis en nombre ni en étendue.

Un préjugé avantageux, que ces approches ont un centre auquel on arrivera enfin & peut-être bientôt, si on suit la vraie route; c'est que le mouvement qui porte à ce centre, est un mouvement véritablement centripète & accéléré. Apollonius encherit beaucoup sur Euclide, Archimède à proportion autant sur Apollonius, & Gregoire pour le moins autant sur Archimède. Un cinquième encherisseur de cette force pourra bien atteindre au but.

Mais il en doit coûter à ce cinquième, s'il faut qu'il entre son génie sur celui de ces quatre Auteurs, sur tout s'il est si difficile d'embrasser le vaste ouvrage de Gregoire de S. Vincent. Il en doit coûter sans doute pour faire mieux que n'ont fait de si grands hommes: mais on pourroit se contenter de la réponse, qu'une grande entreprise demande un grand courage, une grande hardiesse, un grand travail. On ne veut cependant décourager personne. S'il falloit lire Gregoire d'un bout à l'autre, on pourroit y trouver de la difficulté, non qu'absolument le stile de cet Auteur soit difficile, ni ses propositions longues & embarrassées; mais parce que le total de l'Ouvrage est long, & que ce stile ancien purement géométrique & de pur raisonnement, de pure idée demande à la longue une forte attention dont tout

le monde n'est pas capable, à moins qu'on ne voulût se surmonter d'abord un peu pour en prendre l'habitude ; ce qui seroit bien le mieux.

Le stile du calcul qui couvre le raisonnement & enveloppe les idées est plus assorti, avons-nous dit, au commun des esprits : actuellement même la plupart en ont l'habitude, & quand on a cette habitude, il n'est pas aisé de se façonner à l'ancien stile. Heureusement Gregoire de S. Vincent, Archimede & les autres de ce stile ont été mis & remis mille fois en calcul. On peut donc les étudier d'abord par là si on ne se sent pas la force de les étudier en eux-mêmes : mais à condition qu'on les étudie ensuite bien en eux-mêmes, si l'on veut en prendre l'esprit, & l'esprit d'invention qui est un esprit d'idée, de reflexion, de méditation, de raisonnement, esprit tout-à-fait entravé, émoussé, éteint dans le calcul.

Voici donc l'ordre d'étude que l'on conseilleroit à quelqu'un qui auroit le courage & le goût de se rendre solidement Géometre. Ce seroit en général de commencer par le calcul, & de finir par la pure Géometrie en les entremêlant peu à peu pour n'être pas trop esclave du premier, & se familiariser insensiblement à la dernière.

Par exemple on étudieroit Euclide par le calcul dans Lamy, Malezieu, &c. On le parcourroit ensuite sans calcul dans Tacquet, Dechaies, &c. On se rendroit après cela un peu profond dans l'Arithmetique, l'Algebre, l'Analyse & dans toutes les grandes parties du calcul, qu'il auroit suffi d'ébaucher

cher un peu pour l'intelligence d'Euclide.

De-là on passeroit aux Sections coniques de M. de l'Hôpital, & ensuite à l'application de l'Algebre à la Géometrie par M. Guinée. On viendrait tout de suite à la Géometrie de Descartes, qu'on liroit d'abord dans l'excellent & très-solide Commentaire du P. Rabuel, imprimé depuis peu; & on parcoureroit ensuite deux ou trois fois le texte pur de Descartes. On se jetteroit au sortir de là dans l'Analyse démontrée du P. Reynaud de l'Oratoire, c'est aussi un bon Livre & un Auteur de l'Académie.

On fait cependant reflexion, que voilà bien du calcul, & qu'on pourroit s'y trop roidir l'esprit, & que peut-être seroit-il mieux après les Sections coniques de M. de l'Hôpital de se jeter un peu dans Apollonius, soit en Original, soit en Commentaire géométrique, dans Archimede, ou même tout d'un coup dans l'ouvrage géométrique de Gregoire, entremêlant la Géometrie avec le calcul, & faisant désormais marcher de pair, & comme en front de bandiere ces deux especes de troupes legionaires & auxiliaires, infanterie & cavalerie, armes pesantes & armes legeres; la Géometrie au centre, & comme au corps de bataille, & le calcul comme sur les aîles, ou à l'avant & à l'arriere-garde, pour ouvrir les chemins, pour ébaucher les idées, les détailler ensuite, en épuiser les corollaires, & en quelque sorte faire des prises & achever la victoire.

La lecture, par exemple, de Rabuel, de Descartes, de Reynaud marcheroit en même-tems, que les Livres du Cercle, de l'Ellipse, de la Parabole,

de l'Hyperbole, de Gregoire de S. Vincent, qui auroit déjà été préparé par la lecture de M. de l'Hôpital, & qui trouveroit son Commentaire perpetuel dans ces trois ou quatre Auteurs.

L'Analyse de l'Infini est assez à fond dans le second volume du P. Reynaud. Peut-être après y en avoir pris une legere connoissance, ou même laissant-là ce volume qui a d'excellentes choses, mais qui a bien des embarras, sur tout dans son Traité des Sections Coniques: vaudroit-il mieux se jeter dans l'Arithmetique des Infinis du célèbre M. Wallis, dans le Traité des Series de M. Bernoulli, dans l'Analyse des Infiniment Petits de M. de l'Hôpital, dans les divers morceaux de calcul de M. Nevvton, & enfin dans la seconde Partie des Infiniment Petits de notre M. Stone; entremêlant cette lecture de celle du *Ductus plani in planum* de Gregoire, & de tout son second volume, qu'on lira assez couramment lorsqu'on sera un peu plein de tous ces Auteurs de Calcul, sur-tout des Sections coniques de M. de l'Hôpital & de l'Arithmetique des Infinis de Wallis, & si l'on veut du Traité des Series de M. Bernoulli: on pourroit y ajouter aussi les Sections Coniques de Wallis.

Car on remarquera que de tous les Auteurs, dont la lecture peut le plus servir pour l'intelligence de l'ouvrage géométrique de Gregoire de S. Vincent, M. Wallis est celui qui mérite le plus d'être lû. Son Arithmetique des Infinis, est comme le précis Analytique de tout cet ouvrage géométrique. Car tandis que Roberval, Merfenne, Huguens, Leotaud s'a-

mufoient à éplucher cet ouvrage, & à y trouver des erreurs, Wallis plus clair-voyant & plus laborieux, s'occupoit folidement à le defricher, & à en compofer fon Arithmetique, qui eft un excellent Livre, & un des meilleurs que nous ayons fur cette matiere : l'Auteur ayant bien plus vifé à y mettre toutes ces fublimités géométriques à la portée de tout le monde par un ftile Arithmetique, & un peu afoibli par une induction tirée de la méthode des indivifibles de Cavallieri, qu'à fe rendre admirable par trop de force géométrique d'exhauf tion ancienne, ou par une Algebre & une Analyfe moderne.

Un Ouvrage dont on ne penfoit point à parler ici, & dont quelques perfonnes veulent qu'on faffe mention, c'eft celui de la *Mathematique Univerfelle*, abrégée à l'ufage & à la portée de, &c. l'Ouvrage eft affez connu. Mais peut-être fera-t-il bon d'avertir ceux, qui feront bien-aifés d'épargner la multitude des Livres, la longueur du chemin, & la difficulté du travail ; que cet Ouvrage renferme tout ce qui eft neceffaire pour lire Gregoire, Archimede, Apollonius & Euclide, dont il contient un précis affez étendu : qu'il a même été fait dans l'efprit d'introduire dans la lecture de ces Auteurs anciens, en fuppléant à celle de la plûpart des modernes, qui n'ont gueres fait de corps complet de géometrie, & qui font du refte extrêmement embarraffés de calcul, de conftitutions, de problèmes, de chofes en un mot non démontrées, non démonſtratives, & fort peu méthodiques.

c DISCOURS, &c.

Quoiqu'il en soit, quand on a une fois lû Wallis, de l'Hôpital, Stone, & si l'on veut Rabuel, ou mieux encore, la Mathématique Universelle, on ne trouve presque plus rien de nouveau, ni par conséquent de difficile dans tout l'Ouvrage de Gregoire de S. Vincent, ni même d'Apollonius & d'Archimede; & on peut en les lisant d'un esprit libre & satisfait, s'attacher désormais uniquement à en prendre comme on a dit, le corps, l'esprit, le système, le fil de l'invention, & se mettre tout-à-fait à leur place, pour porter plus loin l'Ouvrage de la Quadrature, ou en général l'édifice de la Géométrie, selon la devise du Géometre Flamand, *Plus ultra*.



A P P R O B A T I O N.

J'Ai lû par l'ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, un manuscrit intitulé : *Suite de l'Analyse des Infinitement Petits, de M. le Marquis de l'Hôpital*. Comme nous n'avons en François que très-peu d'Ouvrages sur le Calcul Integral, & qu'on trouvera dans celui-ci les premiers Elemens de ce calcul, expliqués avec beaucoup de clarté : j'ai crû que l'impression en seroit très-utile. Fait à Paris, ce 24 Mars 1733.

P I T O T.

P R I V I L E G E D U R O Y.

LOUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : à nos amez & feaux Conseillers, les Gens tenans des Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prevôt de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra; Salut. Notre bien amé PIERRE-FRANÇOIS GIFFART, Libraire à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'il lui autoit été mis en main une suite de l'*Analyse des Infinitement petits de M. le Marquis de l'Hôpital*, Ouvrage suppléé par le sieur Stone, traduit de l'Anglois, qu'il souhaiteroit faire imprimer & donner au Public, s'il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilège, sur ce nécessaires; offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & en beaux caracteres, suivant la feuille imprimée & attachée pour modele sous le contrescel des Présentes. A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Exposant : Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes de faire imprimer ledit Livre ci-dessus spécifié, conjointement ou séparément, & aiant de fois que bon lui semblera, sur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée sous notre dit contrescel, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le temps de six années consécutives, à compter du jour de la date desdites Présentes; Faisons défenses à toutes personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance: comme aussi à tous Libraires, Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Livre ci-dessus exposé en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns Extraits sous

quelque prétexte que ce soit d'augmentation, correction, changement de titre ou autrement, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Exposant, & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles, que l'impression de ce Livre sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'Impetrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du dix Avril 1725; & qu'avant que de l'exposer en vente, le Manuscrit ou imprimé qui aura servi de copie à l'impression dudit Livre, sera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, es mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Chauvelin; & qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Chauvelin, le tout à peine de nullité des Présentes; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Exposant ou ses ayans-cause, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement: Voulons que la copie desdites Présentes qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, soit tenue pour dûement signifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Conseillers & Secretaires: foi soit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent de faire pour l'exécution d'icelles tous Actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Hato, Clarte Normande & Lettres à contraires. Car tel est notre plaisir. Donné à Paris le deuxième jour de Mai l'an de grace mil sept cens trente-trois, & de notre Regne le dix-huitième. Par le Roi, en son Conseil. SAINSON.

Registré sur le Registre V^{III}. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N^o. 540. fol. 336 conformément aux anciens Réglemens confirmés par celui du 28 Février 1723. A Paris le 20 Mai 1733.

G. MARTIN, Syndic.



T A B L E

D E S S E C T I O N S

Contenuës dans ce Traité.

SECTION I. *M*aniere de reduire les fractions & les quantités sourdes en séries infinies , page 1

SECTION II. *Trouver les Integrales d'une expression différentielle donnée,* page 18

SECTION III. *Usage de la méthode des Integrales pour la quadrature des espaces Curvilignes,* page 38

SECTION IV. *Usage du Calcul Integral pour trouver la rectification des Courbes,* page 72

SECTION V. *Usage du Calcul Integral dans la Cubation des solides, & dans la quadrature de leurs surfaces,* page 92

SECTION VI. *Usage du Calcul Differentiel & Integral, pour trouver le centre de gravité des figures,* page 109


SECTION VII. *Usage du Calcul Differentiel & Integral,*

civ TABLE DES SECTIONS.

dans la recherche des Centres de percus-
sion des figures , page 131

SECTION VIII. *Résolution de divers Problèmes par le*
Calcul Differential & Integral, page
139

Fin de la Table des Sections.



SUITE



S U I T E
D E
L'ANALISE
D E S
INFINIMENT PETITS:
C O M P R E N A N T
L E C A L C U L I N T E G R A L .

SECTION PREMIERE.

*La maniere de réduire les fractions & les quantités sourdes
en séries infinies.*



N ne peut trouver les integrales exprimées par des fractions , ou par des quantités sourdes , qu'en faisant disparaître dans les unes leur dénominateur complexe, dans les autres leur signe radical, ce qui se fait par le moyen d'une série infinie , comme on va l'expliquer dans les deux Problèmes suivans.

A

PROBLEME PREMIER.

Transformer $\frac{b}{a+x}$, où a & b sont des quantités connues & x inconnue, en une serie infinie pour la dégager de son dénominateur binome.

1. IL faut diviser b numerateur de la fraction par le denominateur $a+x$, ainsi qu'on en use dans les fractions decimales, en ajoutant 0, à ce qui reste & continuant cette operation jusqu'à ce que le quotient ait 4, 5 ou 6 termes. Alors vous en pourrez presque toujours trouver autant qu'il vous plaira en considerant la suite progressive de ce quotient, & ce nombre infini ou serie de termes que vous aurez trouvés sera le quotient de la division; mais ordinairement un petit nombre de premiers termes suffisent pour approcher aussi exactement qu'il est necessaire.

E X E M P L E P R E M I E R.

$$a+x) b \div 0 \left(\frac{b}{a} - \frac{bx}{a^2} + \frac{bx^2}{a^3} - \frac{bx^3}{a^4} \&c.$$

$$\begin{array}{r} b - \frac{bx}{a} \\ \hline 0 - \frac{bx}{a} + 0 \\ \hline - \frac{bx}{a} - \frac{bx^2}{a^2} \\ \hline 0 + \frac{bx^2}{a^2} + 0 \\ \hline + \frac{bx^2}{a^2} + \frac{bx^3}{a^3} \\ \hline 0 - \frac{bx^3}{a^3} + 0 \\ \hline - \frac{bx^3}{a^3} - \frac{bx^4}{a^4} \\ \hline 0 + \frac{bx^4}{a^4} \&c. \end{array}$$

Car divisant b par a le quotient est $\frac{b}{a}$, multipliant $\frac{b}{a}$ par $a+x$ le produit est $\frac{bx}{a} + \frac{bx^2}{a^2} = b + \frac{bx}{a}$ qu'il faut ôter du diviseur b , le reste est $0 - \frac{bx}{a}$ qu'il faut diviser encore par a

DES INFINIMENT PETITS. §

le quotient sera $\frac{bx}{a^2}$. Ainsi le produit de $a+x$ par $\frac{bx}{a^2}$ sera $\frac{abx}{a^2} - \frac{bx^2}{a^2}$ ou $\frac{bx}{a} - \frac{bx^2}{a^2}$ qui étant soustrait du dividende $\frac{bx}{a}$ donnera $a + \frac{bx^2}{a^2}$ d'où on voit la suite de la division. Car le quotient consiste dans une suite infinie de termes dont les numérateurs sont les puissances de x , ayant pour exposans le nombre des termes moins l'unité & les dénominateurs sont les puissances de a dont les exposans suivent l'ordre des termes. Par exemple : dans le troisième terme, l'exposant de la puissance de x dans le numérateur est 2, & celui de a au dénominateur est 3.

Si vous mettez la lettre x , la première dans le diviseur, alors divisant b par $x+a$, comme ci-devant, le quotient sera $\frac{b}{x} - \frac{ba}{x^2} + \frac{ba^2}{x^3} - \frac{ba^3}{x^4} \&c.$ en sorte qu'on pourra former autant de séries par la division, qu'il y a de termes dans le diviseur ; mais il faut placer les plus forts termes les premiers dans le diviseur & dans le dividende si vous voulez former une véritable série.

Par exemple si $b=1$, $x=1$, & $a=2$ en supposant a pour la première lettre du diviseur, vous aurez $\frac{1}{1} = \frac{1}{1+2} = \frac{1}{3} - \frac{1}{6} + \frac{1}{12} - \frac{1}{24} \&c.$ ce que nous connoissons être vrai d'ailleurs.

Mais si c'étoit x qui fût la première lettre du diviseur, alors $\frac{1}{1} = \frac{1}{1+2} = 1 - 2 + 4 - 8 + 16 \&c.$ ce qui est faux ; car cette série diverge & diffère autant du vrai quotient que le nombre des termes en est plus grand ; par exemple le premier terme 1 excède $\frac{1}{3}$ de $\frac{2}{3}$; deux termes sont surpassés de $\frac{1}{3}$; trois termes excèdent de $\frac{2}{3}$ quatre termes sont surpassés de $\frac{1}{3}$, ainsi des autres.



EXEMPLE II.

$$b+x) aa+o \left(\frac{aa}{b} - \frac{aax}{b^2} + \frac{aax^2}{b^3} - \frac{aax^3}{b^4} \right) \&c.$$

$$aa + \frac{aax}{b}$$

$$o - \frac{aax}{b} + o$$

$$- \frac{aax}{b} - \frac{aax^2}{b^2}$$

$$o + \frac{aax^2}{b^2} + o$$

$$+ \frac{aax^2}{b^2} + \frac{aax^3}{b^3}$$

$$o - \frac{aax^3}{b^3} + o$$

$$- \frac{aax^3}{b^3} - \frac{aax^4}{b^4}$$

$$o + \frac{aax^4}{b^4} \&c.$$

Si vous mettez x pour le premier terme, alors le quotient sera $\frac{aa}{x} - \frac{aab}{x^2} + \frac{aab^2}{x^3} - \frac{aab^3}{x^4} \&c.$ De même le quotient de la fraction $\frac{x}{1+xx}$ sera $1 - x^2 + x^4 - x^6 + x^8 \&c.$ ou si vous mettez xx , pour le premier terme du diviseur, vous aurez $x^{-1} - x^{-3} + x^{-5} - x^{-7} \&c.$

De même si de la fraction $\frac{x^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{3}{2}}}{1+x-3x^2}$, vous ôtez par la

division son dénominateur composé, vous aurez $1 x^{\frac{1}{2}} -$

$$2 x + 7 x^{\frac{3}{2}} - 13 x^2 + 34 x^{\frac{5}{2}} \&c.$$

$$\text{Enfin cette fraction } 1 - \frac{1}{2}ax^2 - \frac{1}{6}a^2x^4 + \frac{1}{24}a^3x^6 - \frac{1}{120}a^4x^8 \&c.$$

$$1 - \frac{1}{2}bx^2 - \frac{1}{6}b^2x^4 - \frac{1}{24}b^3x^6 - \frac{1}{120}b^4x^8 \&c.$$

dont le numérateur & le dénominateur sont des séries infinies, peut être réduite en une seule série, en divisant le numérateur par le dénominateur comme dans les fractions

DES INFINIMENT PETITS.

5

décimales infinies : ce qui donnera pour quotient

$$1 - \frac{1}{2}bx^2 + \frac{1}{8}b^2x^4 - \frac{1}{16}b^3x^6 + \frac{1}{128}b^4x^8 \text{ \&c.}$$

$$\begin{array}{r} -\frac{1}{2}a \\ -\frac{1}{2}a \\ -\frac{1}{4}ab^2 \\ -\frac{1}{8}a^2 \\ -\frac{1}{16}a^3 \\ -\frac{1}{128}a^4 \end{array} \quad \begin{array}{r} -\frac{1}{4}ab^2 \\ -\frac{1}{8}a^2b \\ -\frac{1}{16}a^2b^2 \\ -\frac{1}{32}a^3b \\ -\frac{1}{128}a^4 \end{array}$$

PROBLÈME II.

Dégager une expression complexe comme $\sqrt{aa+xx}$, de son signe radical & la réduire en une série infinie.

2. **E**XTRAIEZ la racine comme vous en usez dans celles des fractions décimales en ajoutant les chiffres & en ôtant autant de termes qu'il est nécessaire pour trouver la suite de la progression ; en sorte que par les termes déjà trouvés vous puissiez continuer de trouver les autres à volonté.

EXEMPLE I.

$$aa+xx(a+\frac{x^2}{2a}-\frac{x^4}{8a^3}+\frac{x^6}{16a^5}-\frac{5x^8}{128a^7} \text{ \&c.}$$

$$\begin{array}{r} aa \\ \hline 0+xx \\ \hline \frac{xx}{2a} + \frac{x^3}{4a^2} \\ \hline 0 - \frac{x^3}{4a^2} \\ \hline -\frac{x^3}{4a^2} - \frac{x^5}{8a^4} + \frac{x^7}{64a^6} \\ \hline 0 + \frac{x^5}{8a^4} - \frac{x^7}{64a^6} \\ \hline + \frac{x^7}{8a^4} + \frac{x^9}{16a^6} - \frac{x^{11}}{64a^8} + \frac{x^{13}}{256a^{10}} \\ \hline 0 - \frac{5x^9}{64a^6} + \frac{x^{11}}{64a^8} - \frac{x^{13}}{256a^{10}} \text{ \&c.} \end{array}$$

Car tirant la racine de aa , il vient $+a$ pour le premier terme de la racine ; ensuite après l'avoir quarré , soustrayez-le de $aa+xx$ reste xx lequel étant divisé par $2a$, comme

dans l'extraction de la racine quarrée , le quotient sera $+\frac{x^4}{2a}$ pour le second terme de la racine , qui étant ajouté à $2a$, & le tout multiplié par $\frac{x^2}{2a}$ donnera $xx + \frac{x^4}{4a^2}$ lequel soustrait d' xx , il restera $-\frac{x^4}{4a^2}$ qui étant divisé par $2a + \frac{x^2}{a}$ double des deux premiers termes, donnera pour le troisième terme du quotient $-\frac{x^4}{8a^3}$ qui étant ajouté à $2a - \frac{x^2}{a}$ & le tout multiplié par $-\frac{x^2}{8a^3}$ produira $-\frac{x^4}{4a^3} - \frac{x^6}{8a^4} + \frac{x^8}{64a^5}$ lequel soustrait de $-\frac{x^4}{4a^2}$ le reste sera $0 + \frac{x^6}{8a^4} - \frac{x^8}{64a^5}$ & en continuant ainsi vous pouvez trouver autant de termes qu'il vous plaira.

Si xx est le premier terme de la serie, alors la racine sera $x + \frac{ax}{2x} - \frac{a^2}{8x^3} + \frac{a^3}{16x^5} - \frac{5a^4}{128x^7} \&c.$

Ici, aussi-bien que dans la division précédente, le plus grand terme de la serie doit être le premier, autrement la racine ou serie seroit fausse.

E X E M P L E I I.

$$x - xx (x^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{8}x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{16}x^{\frac{7}{2}} - \frac{1}{128}x^{\frac{9}{2}} \&c.)$$

$$x$$

$$0 - x^2$$

$$-x^2 - \frac{1}{2}x^3$$

$$0 - \frac{1}{2}x^3$$

$$-\frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{8}x^4 + \frac{1}{16}x^5$$

$$0 - \frac{1}{8}x^4 + \frac{1}{16}x^5$$

$$-\frac{1}{8}x^4 + \frac{1}{16}x^5 + \frac{1}{84}x^6 - \frac{1}{128}x^7$$

$$0 - \frac{1}{84}x^5 + \frac{1}{128}x^6 - \frac{1}{1024}x^7$$

$$-\frac{1}{84}x^5 + \frac{1}{128}x^6 + \frac{1}{112}x^7 + \frac{1}{1024}x^8 - \frac{1}{16384}x^9$$

$$0 - \frac{1}{112}x^6 - \frac{1}{128}x^7 - \frac{1}{1024}x^8 - \frac{1}{16384}x^9$$

$$\&c.$$

$$\&c.$$

E X E M P L E I I I.

$$1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + 5x^4 \text{ &c. } (1 - x + x^2 \text{ &c.}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 0 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + 5x^4 \text{ &c.} \\ \hline - 2x + x^2 \\ \hline 0 + 2x^2 - 4x^3 + 5x^4 \text{ &c.} \\ 2x^2 - 2x^3 + x^4 \\ \hline 0 - 2x^3 - 4x^4 \text{ &c.} \end{array}$$

On peut de la même manière extraire la racine cubique, quatrième, &c. d'une quantité sourde, quand bien même elle seroit une série infinie.

Mais on peut abréger ces extractions aussi-bien que les divisions précédentes, par le théorème de M. le Chevalier

$$\text{Nevvton dont voici la formule } P + P \frac{m}{n} \mathcal{Q} = P^n + \frac{m}{n} A \mathcal{Q} + \frac{m-m}{2n} B \mathcal{Q} + \frac{m-2n}{24n} C \mathcal{Q} + \frac{m-3n}{4n} D \mathcal{Q} + \text{&c.}$$

Où $P + P \frac{m}{n} \mathcal{Q}$ représente une quantité quelconque dont il faut chercher la racine ou toute autre dimension, qui se trouve transformée en une série infinie. P , est le premier terme de la quantité: $\mathcal{Q}$, est le reste des termes, divisé par le premier; & $\frac{m}{n}$ est l'exposant numérique de la puissance de $P + P \frac{m}{n} \mathcal{Q}$. Ordinairement $A, B, C, D, \text{ &c.}$ sont employés pour signifier les termes trouvés au quotient; *Par exemple*,

A , pour le premier terme $P^{\frac{m}{n}}$; B pour le second $\frac{m}{n} A \mathcal{Q}$, ainsi des autres.

Quelques exemples donneront l'usage de ce merveilleux théorème.

E X E M P L E I.

$$\sqrt{aa + xx} \text{ ou } aa + xx \text{ est } = a + \frac{xx}{2a} - \frac{x^4}{8a^3} + \frac{x^6}{16a^5} - \frac{5x^8}{128a^7} \text{ &c.}$$

Car dans ce cas $P = aa$, $\mathcal{Q} = \frac{xx}{aa}$, $m=1$, $n=2$, A

$$\begin{aligned} (=P^{\frac{m}{n}} = a a^{\frac{1}{2}}) = a. B (= \frac{m}{n} A \mathcal{Q}) = \frac{ax}{2a}. C (= \frac{m-n}{2n} B \mathcal{Q}) \\ = -\frac{x^4}{8a^3}, \text{ \textit{C\text{e}}}. \end{aligned}$$

E X E M P L E I I.

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{a^5 + a^4x - x^5} \text{ ou } a^5 + a^4x - x^5)^{\frac{1}{3}} = a + \frac{a^4x - x^5}{3a^3} - \\ \frac{2a^4xx' + 4a^3x^2 - 2x^{10}}{27a^3} + \text{C\text{e}}. \text{ dans ce cas } m=1, n=3, P=a^5, \\ \& \mathcal{Q} = \frac{a^4x - x^5}{a^3}. \end{aligned}$$

E X E M P L E I I I.

$$\begin{aligned} \frac{b}{\sqrt[3]{y^3 - a^3y}} \text{ ou } b \times y^3 - a^3y)^{-\frac{1}{3}} = b \times \frac{1}{y} + \frac{aa}{3y^2} + \frac{2a^4}{9y^3} + \\ \frac{14a^6}{81y^4}, \text{ \textit{C\text{e}}}. \text{ en ce cas } P=y^3, \mathcal{Q} = -\frac{aa}{y}, m=-1, n=3, A \\ (P^{\frac{m}{n}} = y^3 \times -\frac{1}{y}) = y^{-2} = \frac{1}{y}. B (\frac{m}{n} A \mathcal{Q} = -\frac{1}{y} \times \frac{1}{y} \times \\ -\frac{aa}{y}) = \frac{aa}{3y^2}, \text{ \textit{C\text{e}}}. \end{aligned}$$

E X E M P L E I V.

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{a+x^4} \text{ ou } a+x^4)^{\frac{1}{3}} = a^{\frac{1}{3}} + \frac{4xx^3}{3} + \frac{2xx^3}{9a^{\frac{2}{3}}} - \frac{4x^3}{81a^{\frac{5}{3}}} + \text{C\text{e}}. \\ \text{en ce cas } P=a, \mathcal{Q} = \frac{x}{a}, m=4, n=3, A (=P^{\frac{m}{n}}) \\ = a^{\frac{4}{3}}, \text{ \textit{C\text{e}}}. \end{aligned}$$

E X E M P L E V.

$$\begin{aligned} \frac{1}{a+x^5} \text{ ou } a+x^5)^{-1} = a^5 + 5a^4x + 10a^3x^2 + 10a^2x^3 + \\ 5ax^4 + x^5. \text{ En ce cas } P=a. \mathcal{Q} = \frac{x}{a}, m=5, n=1. \\ A (=P^{\frac{m}{n}}) = a^5 B (= \frac{m}{n} A \mathcal{Q}) = 5a^4x. \text{ de même } C = \\ 10a^3xx, D = 10aa^4x^2, E = 5a^4x^3, F = x^5 \& G (= \frac{m-5n}{6n} \\ F \mathcal{Q}) = 0 \end{aligned}$$

E X E M P L E

E X E M P L E V I.

$$\frac{1}{a+x} \text{ ou } \overline{a+x}^{-1} \text{ ou } \overline{a+x}^{-\frac{1}{1}} = \frac{1}{a} - \frac{x}{aa} + \frac{xx}{a^3} - \frac{x^3}{a^4}, \&c.$$

En ce cas $P=a$, $Q=\frac{x}{a}$, $m=-1$, $n=1$, & A

$$(\frac{m}{n} = a^{-1}) = a^{-1} = \frac{1}{a}. B (\frac{m}{n} A Q = -1$$

$$\times \frac{1}{a} \times \frac{x}{a}) = -\frac{x}{aa}. \text{ Et } C = \frac{xx}{a^3}. D = -\frac{x^3}{a^4}, \&c. \text{ De}$$

sorte que par ce merveilleux theoreme on degage les fractions de leurs denominateurs, en même tems qu'on extrait leurs racines.

E X E M P L E V I I.

$$\frac{3}{a+x} = 3 \times \overline{a+x}^{-1} = 3 \times \frac{1}{a} - \frac{3x}{a^2} + \frac{6xx}{a^3} - \frac{10x^3}{a^4}, \&c.$$

E X E M P L E V I I I.

$$\frac{b}{\sqrt[3]{a+x}} = b \times \overline{a+x}^{-\frac{1}{3}} = b \times \frac{1}{a^{\frac{1}{3}}} - \frac{x}{3a^{\frac{4}{3}}} + \frac{2xx}{9a^{\frac{7}{3}}} -$$

$$\frac{14x^3}{81a^{\frac{10}{3}}}, \&c.$$

E X E M P L E I X.

$$\frac{b}{\sqrt[5]{a+x}} = b \times \overline{a+x}^{-\frac{1}{5}} = b \times \frac{1}{a^{\frac{1}{5}}} - \frac{1x}{5a^{\frac{6}{5}}} + \frac{12xx}{25a^{\frac{11}{5}}} -$$

$$\frac{52x^3}{125a^{\frac{16}{5}}}, \&c.$$

M. de Moivre nous a donné dans les *Transactions Philosophiques* * le theoreme suivant, soit pour élever une serie infinie à la puissance donnée m , soit pour en extraire la ra-

* n°. 230.

cine. Par exemple, $az + bz^2 + cz^3 + dz^4 + ez^5 + fz^6 \&c. \text{ est } =$

$$= a^m z^m +$$

$$+ \frac{m}{1} a^{m-1} b z^{m+1}$$

B

$$\left. \begin{aligned} & + \frac{m}{1} \times \frac{m-1}{2} a^{m-2} b^2 \\ & - + \frac{m}{1} a^{m-1} c \end{aligned} \right\} x^{m-2}$$

$$\left. \begin{aligned} & + \frac{m}{1} \times \frac{m-1}{2} \times \frac{m-2}{3} a^{m-3} b^3 \\ & + \frac{m}{1} \times \frac{m-1}{1} a^{m-2} bc \\ & - + \frac{m}{1} a^{m-1} d \end{aligned} \right\} x^{m-3}$$

$$\left. \begin{aligned} & + \frac{m}{1} \times \frac{m-1}{2} \times \frac{m-2}{3} \times \frac{m-3}{4} a^{m-4} b^4 \\ & - + \frac{m}{1} \times \frac{m-1}{2} \times \frac{m-2}{1} a^{m-3} b^2 c \\ & - + \frac{m}{1} \times \frac{m-1}{1} a^{m-2} b^2 d \\ & - + \frac{m}{1} \times \frac{m-1}{2} a^{m-3} c^2 \\ & - + \frac{m}{1} a^{m-1} e \end{aligned} \right\} x^{m-4}$$

$$\left. \begin{aligned} & + \frac{m}{1} \times \frac{m-1}{2} \times \frac{m-2}{3} \times \frac{m-3}{4} \times \frac{m-4}{5} a^{m-5} b^5 \\ & - + \frac{m}{1} \times \frac{m-1}{2} \times \frac{m-2}{3} \times \frac{m-3}{1} a^{m-4} b^3 c \\ & - + \frac{m}{1} \times \frac{m-1}{2} \times \frac{m-3}{1} a^{m-3} b^2 d \\ & - + \frac{m}{1} \times \frac{m-1}{1} \times \frac{m-2}{2} a^{m-4} b c^2 \\ & - + \frac{m}{1} \times \frac{m-1}{1} a^{m-3} b e \\ & - + \frac{m}{1} \times \frac{m-1}{2} a^{m-2} c d \\ & - + \frac{m}{1} a^{m-1} f \end{aligned} \right\} x^{m-5}$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{m}{1} \times \frac{m-1}{2} \times \frac{m-2}{3} \times \frac{m-3}{4} \times \frac{m-4}{5} \times \frac{m-5}{6} a^{m-6} b^6 \\
& + \frac{m}{1} \times \frac{m-1}{2} \times \frac{m-2}{3} \times \frac{m-3}{4} \times \frac{m-4}{5} a^{m-5} b^4 c \\
& + \frac{m}{1} \times \frac{m-1}{2} \times \frac{m-2}{3} \times \frac{m-3}{4} a^{m-4} b^3 d \\
& + \frac{m}{1} \times \frac{m-1}{2} \times \frac{m-2}{3} \times \frac{m-3}{4} a^{m-4} b^2 c^2 \\
& + \frac{m}{1} \times \frac{m-1}{2} \times \frac{m-2}{3} a^{m-3} b^2 e \\
& + \frac{m}{1} \times \frac{m-1}{2} \times \frac{m-2}{3} a^{m-3} b c d \\
& + \frac{m}{1} \times \frac{m-1}{2} a^{m-2} b^2 f \\
& + \frac{m}{1} \times \frac{m-1}{2} \times \frac{m-2}{3} a^{m-3} c^3 \\
& + \frac{m}{1} \times \frac{m-1}{2} a^{m-2} c^2 e \\
& + \frac{m}{1} \times \frac{m-1}{2} a^{m-2} d^2 \\
& + \frac{m}{1} a^{m-1} g
\end{aligned}
\left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \right\} z^{m+6}, \text{ & } \text{& } c.$$

Il est absolument nécessaire, pour entendre ce theoreme, d'observer tous les termes qui multiplient la même puissance de z : pour cet effet on doit considerer dans chacun de ces termes deux choses ; 1^o, le produit des puissances quelconques des quantités ou coefficients donnés $a, b, c, d, \text{& } c.$ 2^o, le produit de $\frac{m}{1} \times \frac{m-1}{2}$, & $c.$ qui est mis devant les termes.

Maintenant pour trouver tous les produits qui appartiennent à la même puissance z ; par exemple, pour trouver le produit dont l'exposant est $m+r$, (r étant un nombre entier quelconque) ces produits doivent être distingués en plusieurs classes. Ces produits, après une certaine puissance a , par laquelle ils commencent, sont ceux de la première classe ;

B ij

comme $a^{m-1}b^1c$ est un produit de la premiere classe, parce que b suit immédiatement a^{m-1} . Ceux qui ont c immédiatement après une puissance d' a sont les produits de la seconde classe; ainsi $a^{m-1}c^1d$, est le produit de la seconde classe. Ceux qui donnent d , immédiatement après une certaine puissance d' a , sont les produits de la troisième classe; ainsi du reste.

Ceci bien entendu; 1°. Multipliez par b tous les produits qui appartiennent à a^{m-r-1} , qui precede immédiatement a^{m-r} , & divisez le tout par a . 2°. Multipliez par c , & divisez par a , tous les produits qui appartiennent à a^{m-r-1} , excepté ceux de la premiere classe. 3°. Multipliez par d , & divisez par a , tous les produits appartenans à a^{m-r-1} , excepté ceux de la premiere & de la seconde classe. 4°. Multipliez par e , & divisez par a , tous les termes appartenans à a^{m-r-1} , excepté ceux de la premiere, seconde & troisième classe, continuant ainsi jusqu'à ce qu'on ait trouvé deux fois le même terme. Enfin ajoutez à tous ces termes le produit de a^{m-1} par la lettre dont l'exposant est $r+1$.

Nota. L'exposant d'une lettre est le nombre qui exprime la place qu'elle occupe dans l'alphabet, comme 3 est l'exposant de la lettre c .

Il est clair qu'on peut facilement trouver par cette méthode tous les produits appartenans à la seconde puissance de z , si vous mettez le produit appartenant à z^m comme a^m .

Maintenant pour trouver le produit (a) mis devant les termes, considérez la somme de toutes les unités qui sont contenues dans l'exposant des lettres qui les composent dont il faut excepter l'exposant d' a ; pour lors écrivez autant de termes de la serie $m \times m - 1 \times m - 2$ &c. qu'il y a d'unités dans la somme des exposans; cette serie sera le numerateur d'une fraction dont le dénominateur sera le produit de ces diverses series $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5$ &c. $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5$ &c. $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6$ &c. dont la premiere contient autant de termes qu'il y a d'unités dans l'exposant de b , la seconde autant qu'il y en a dans l'exposant de c , la troisième dans d , &c.

Vous pouvez en voir la démonstration dans les transactions ci-dessus citées. Un ou deux exemples donneront l'usage de ce theoreme.

$$(a) \frac{m}{1} \times \frac{m-1}{2} \times \frac{m-2}{3}, \text{ \&c.}$$

DES INFINIMENT PETITS. 13

E X E M P L E I.

Pour élever à la seconde puissance ou au carré cette série infinie $\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^4}$, &c.

En supposant dans ce theoreme $m=2$, $x=x$, $a=\frac{1}{xx}$,
 $b=\frac{1}{x^4}$, $c=\frac{1}{x^4}$, $d=\frac{1}{x^4}$, &c. donc $\frac{1}{x} + \frac{1}{xx} + \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^4}$ &c.
 ou $\frac{1}{x^1} + \frac{2}{x^2} + \frac{3}{x^3} + \frac{4}{x^4}$, &c. pour le premier terme $a^m x^m$
 ($= \frac{1}{x^2} \times x^2$) $= \frac{1}{xx}$. Le second terme $\frac{m}{1} a^{m-1} b x^{m+1}$
 ($= \frac{2}{xx} \times \frac{1}{x^4} \times x^4$) $= \frac{2}{x^4}$

$$\text{Le troisieme } \left. \begin{aligned} &\frac{m}{1} \times \frac{m-1}{2} \times a^{m-2} b^2 \\ &+ \frac{m}{1} a^{m-1} c \end{aligned} \right\} x^{m+2} \left\{ = 2 \times \frac{1}{x^2} \times \frac{1}{x^4} \times x^4 \right.$$

$$= \frac{1}{x^4} + 2 \times \frac{1}{xx} \times \frac{1}{x^4} \times x^4 = \frac{2}{x^4} \left. \right\} = \frac{3}{x^4}$$

$$\text{Le quatrieme } \left. \begin{aligned} &\frac{m}{1} \times \frac{m-1}{2} \times \frac{m-2}{3} \times a^{m-3} b^3 \\ &\frac{m}{1} + \frac{m-1}{1} a^{m-2} b c \\ &\frac{m}{1} a^{m-1} d \end{aligned} \right\} x^{m+3} \left\{ = \right.$$

$$\left. \begin{aligned} &2 \times \frac{1}{2} \times \frac{0}{3} \times x^2 \times \frac{1}{x^4} \times x^4 = 0 \\ &2 \times 1 \times 1 \times \frac{1}{x^4} \times \frac{1}{x^4} \times x^4 = \frac{2}{x^4} \\ &2 \times \frac{1}{xx} \times \frac{1}{x^4} \times x^4 = \frac{2}{x^4} \end{aligned} \right\} = \frac{4}{x^4}$$

E X E M P L E II.

Pour carrer cette serie infinie $1-x+x^2-x^3+\dots$ &c. su-

posant dans ce theoreme $m=2$, $z=x$, $a=\frac{1}{x}-1$, $b=1$,

$c=1$, $d=1$, &c. ainsi $1-x+x^1-x^2+x^3$. &c. sera
 $=1-2x+3x^1-4x^2+5x^3$ &c. Car $a^m z^m (= \frac{1}{x} - 1 \times x^1)$
 $=1-2x+x^1$. $\frac{m}{1} a^{m-1} b z^{m+1} (= \frac{2}{1} \times \frac{1}{x} \times x^1) = 2xx$
 $=2x^2$.

$$\left. \begin{array}{l} \frac{m}{1} \times \frac{m-1}{2} a^{m-2} b^2 \\ \frac{m}{1} a^{m-1} c \end{array} \right\} z^{m+1} = \left\{ \begin{array}{l} \frac{2}{1} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{x} - 1 \times 1 \times x^1 \\ \frac{2}{1} \times \frac{1}{x} - 1 \times -1 \times x^1 \end{array} \right\} = -x^1 + 2x^2, \text{ \&c.}$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{2}{1} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{x} - 1 \times 1 \times x^1 \\ \frac{2}{1} \times \frac{1}{x} - 1 \times -1 \times x^1 \end{array} \right\} = -x^1 + 2x^2, \text{ \&c.}$$

EXEMPLE III.

Pour élever $1-x+x^1-x^2+x^3$, &c. à la troisième puissance ou au cube.

Suposez $m=3$, $z=x$, $a=\frac{1}{x}-1$, $b=0$, $c=1$, $d=0$.
 Alors la troisième puissance donnera $1-3x+3x^1-2x^2-6x^3$, &c. Car $a^m z^m (= \frac{1}{x} - 1 \times x^1) = 1-3x+3xx-x^3$.

$$\frac{m}{1} a^{m-1} b z^{m+1} (= 3 \times \frac{1}{x} - 1 \times 0 \times x^1) = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{m}{1} \times \frac{m-1}{2} a^{m-2} b^2 \\ \frac{m}{1} a^{m-1} c \end{array} \right\} z^{m+1} = \left\{ \begin{array}{l} 3 \times 1 \times \frac{1}{x} - 1 \times 0^2 \times x^1 = 0 \\ 3 \times \frac{1}{x} - 1 \times 1 \times x^1 = 3x^1 - 6x^2 \times 3x^3 \end{array} \right\} =$$

$$\left. \begin{array}{l} 3 \times 1 \times \frac{1}{x} - 1 \times 0^2 \times x^1 = 0 \\ 3 \times \frac{1}{x} - 1 \times 1 \times x^1 = 3x^1 - 6x^2 \times 3x^3 \\ 3x^1 - 6x^2 + 3x^3 \end{array} \right\} =$$

DES INFINIMENT PETITS. 15

Et parce que b & $d = 0$. Ainsi le second terme du theoreme general sera $= 0$. On peut continuer ainsi, &c.

EXEMPLE I V.

Pour extraire la racine d'une serie infinie, où on suppose $z = ax + bx^2 + cx^3 + dx^4 + ex^5$, &c.

Pour trouver la valeur de x en une serie composee d'un nombre infini de termes affectés de z , &c. delivres de x .

D'abord on suppose $x = fz + bz^2 + kz^3 + lz^4 + mz^5 + nz^6$ &c. maintenant par le theoreme $x^2 = f^2 z^2 + 2f b h z^3 + b^2 z^4 + 2b k z^5 + k^2 z^6 + 2f k z^4 + 2f l z^5 + 2h l z^6 + 2f m z^6$ &c.

$$x^3 = f^3 z^3 + 3f^2 b z^4 + 3f b^2 z^5 + b^3 z^6 + 3f^2 k z^5 + 3f^2 l z^6 + 6f b k z^6$$

$$x^4 = f^4 z^4 + 4f^3 b z^5 + 6f^2 b^2 z^6$$

$$x^5 = f^5 z^5 + 5f^4 b z^6$$

$$x^6 = f^6 z^6$$

Maintenant substituant ces valeurs dans l'équation $0 = z + ax + bx^2 + cx^3 + dx^4 + ex^5$, &c. on trouve par-là $-z = -z$

$$+ ax = + afz + abz^2 + akz^3 + al z^4 + amz^5 + an z^6$$

$$+ bx^2 = * b f^2 z^2 + 2b f b h z^3 + b b^2 z^4 + 2b f l z^5 + b k^2 z^6$$

$$+ 2b b k z^4 + 2b b k z^5 + 2b f m z^6$$

$$+ cx^3 = * * + c f^3 z^3 + 3c f^2 b z^4 + c f b^2 z^5 + 3c f^2 l z^6$$

$$+ 3c f^2 k z^5 + 3c f^2 l z^6$$

$$+ 6f b k z^6$$

$$d x^4 = * * * + d f^4 z^4 + 4d f^3 b z^5 + 6d f^2 b^2 z^6$$

$$+ 4d f^3 k z^6$$

$$e x^5 = * * * * + e f^5 z^5 + 5e f^4 b z^6$$

$$+ 5e f^4 b z^6$$

Maintenant si vous supposez égale à 0, la somme de tous les coefficients des termes de cette équation, vous trouverez les valeurs des coefficients f, b, k, l, m, n , de cette maniere. La somme des coefficients du premier terme $\frac{1}{af} z$ sera $af - 1$.

dans lequel si $af - 1 = 0$, alors $f = \frac{1}{a}$. Ainsi la somme des coefficients du second terme $\frac{ab}{bf^2} z^2$ sera $ab + f^2$. Or $ab + bf^2 = 0$, donc $b = \frac{-bf^2}{a} = \frac{-b}{a^2}$, de la même manière celle du coefficient du troisième terme étant égal à 0, $ak + 2bfh + cf^3 = 0$, donc $k = \frac{-2bfh - cf^3}{a} = \frac{2b^2 - ac}{a^2}$, de même $al + bfh + 2bfk + 3cf^2b + df^4 = 0$, donne $l = \frac{-bfh - 2b^2fk + 3cf^2b - df^4}{a} = \frac{-b^3}{a^3 - 4b^2} + \frac{a^2 + 2ba}{a^3 + 3bc} + \frac{a^2 - d}{a^3} = \frac{5abc - 5b^2 - a^2d}{a^3}$, de la même manière $m = \frac{14b^4 + 6abd - 12ab^2c + 3a^2c^2 - a^3e}{a^4}$, &c. $n = \frac{-42b^5 + 84ab^3c - 12a^2b^2c - 12a^2bd + 7a^2cd + 7a^2ed + 7a^2eca^2f}{a^5}$.

Enfin substituant toujours les valeurs des coefficients f, b, k, l, m, n , dans l'équation proposée $x = fz + bz^2 + kz^3 + lz^4 + mz^5 + nz^6$, &c. La racine cherchée sera $x = \frac{x}{a} - \frac{bx^2}{a^2} + \frac{2b^2 - ac}{a^3} z^3 + \frac{5abc - 5b^2 - a^2d}{a^4} z^4 + \frac{14b^4 + 6abd - 12ab^2c + 3a^2c^2 - a^3e}{a^5} z^5$ &c.

Nota. S'il y a quelques termes de moins dans l'équation proposée, il est évident que ces termes manqueront également dans la racine; par exemple, si $z = ax + cx^3 + ex^5$, &c. alors $x = \frac{x}{a} - \frac{ac}{a^2} z^3 + \frac{3a^2c^2 - a^3e}{a^4} z^5$, &c. Mais si $z = ax + bx^3 + cx^5 + dx^7 + ex^9$, &c. Alors il arrivera le contraire; car $x = \frac{x}{a} - \frac{b}{a^2} z^3 + \frac{3bb - ac}{a^3} z^5 + \frac{8abc - aad - 12b^2}{a^4} z^7 + \frac{55b^4 - 55abbc + 10aabd + 5aacc - a^2e}{a^5} z^9$, &c.



SCHOLIE.

S C H O L I E. *

3. Ces deux expressions de la racine d' x ainsi trouvées, serviront de règle, pour trouver par substitution la racine d'une équation infinie proposée.

Par exemple, si on veut extraire la racine de cette équation $z = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5}$, &c. Il n'y a qu'à substituer dans la première équation 1 pour a , $-\frac{1}{2}$ pour b , $\frac{1}{3}$ à la place de c , $-\frac{1}{4}$ pour d , &c $\frac{1}{5}$ pour e ; vous aurez $x = z + \frac{1}{2} z z - \frac{1}{6} z^3 + \frac{1}{24} z^4$, &c. observant que la racine de cette équation $z = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5}$, &c. est $x = z + \frac{z^2}{3} + \frac{2z^3}{15} + \frac{17z^4}{315} + \frac{62z^5}{2835} + \frac{1}{315}$, &c. en mettant dans l'expression 1 pour a , $-\frac{1}{2}$ pour b , $\frac{1}{3}$ pour c , $-\frac{1}{4}$ pour d , &c $\frac{1}{5}$ pour e , &c.





SECTION II.

Trouver les integrales d'une expression differentielle donnée.

*D E F I N I T I O N.

L'Integrale d'une expression differentielle donnée, est la quantité dont la differentielle est l'élément. Comme l'integrale de dx est x ; celle de $dx + dy$, est $x + y$: l'integrale de $x dy + y dx$, est xy : celle de $mx^{m-1} dx$, est x^m : celle de $ax^{\frac{m}{n}} dx$, est $\frac{an}{m+n} x^{\frac{m+n}{n}}$.

C O R O L L A I R E I.

Fig. 1.

4. Si l'ordonnée PM , (y) d'une courbe, ou ligne droite, AM , coupant à angles droits l'ascisse $AP(x)$, est multipliée par $Pp(dx)$, qui représente une differentielle quelconque; alors l'aire APM sera l'integrale de cette differentielle; & au contraire, le rectangle formé par l'ordonnée PM , multipliée par dx , différence de AP , sera la differentielle de l'espace APM . Car ce rectangle peut être pris pour le trapeze $PMmp$, qui est la differentielle réelle de cette aire: leur différence étant seulement le petit triangle Mmn , qui est infiniment plus petit que $PMmp$; donc il peut être négligé, suivant l'axiome premier, partie premiere.

C O R O L L A I R E II.

5. D'où il est évident que la méthode inverse des fluxions, ou la méthode des integrations, revient à celle de trouver la somme d'une serie.

S C H O L I E.

6. Nous devons observer ici qu'une integrale ne peut avoir qu'une difference, mais qu'au contraire une difference peut avoir une infinité d'integrales. Par exemple, l'integrale ax ne peut avoir que cette seule differentielle $a dx$; mais la differentielle $a dx$ peut avoir une infinité d'integrales; car si on suppose b, c, d, f, g , &c. des quantités constantes, alors $ax \pm b, ax \pm c, ax \pm f, ax \pm g$, &c. ou $ax \pm$ une infinité d'autres quantités constantes, donnera pour integrale non pas seulement ax , mais $ax \pm p$; or p est une quantité donnée quelconque qui peut représenter une expression composée de quantités constantes. Il faut entendre la même chose dans toutes les autres expressions differentielles & integrales.

Comme il est aisé d'élever une quantité à une puissance donnée quelconque, & qu'on n'en peut pas au contraire trouver en termes finis la racine quelconque; de même dans les differentielles il est facile de trouver les differences d'une quantité quelconque variable, ou composée de variables & de constantes; mais au contraire on ne peut trouver que rarement en termes finis l'integrale d'une difference quelconque; ainsi comme dans l'algebre nous avons recours aux approximations pour les racines sourdes qui ne peuvent pas être exactement exprimées; de même dans les integrales nous nous servons de séries infinies, lorsque nous ne pouvons pas les trouver exactement.

PROBLEME PREMIER.

7. *Trouver l'integrale d'une expression differentielle donnée.*

Premier cas. **Q**Uand les expressions differentielles ne sont point mêlées de quantités constantes, mais sont les produits des integrales multipliées par les differences, c'est qu'on doit entendre de toutes grandeurs variables, comme dans cette expression $x dy + y dx$, ou $x y dz + z x dy + z y dx$; pour lors suivant la regle on trouvera les integrales par le revers de l'operation directe; par exemple :

C ij

Au lieu de chaque différentielle substituez sa quantité variable ; ajoutez ensemble tous les termes , & divisez la somme par le nombre des termes.

Ainsi l'intégrale de $x dy + y dx$, est xy , celle de $xy dz + z x dy + y z dx$, est xyz .

2. Quand une expression différentielle se trouve mêlée avec une puissance quelconque ; par exemple , $2 x dy$, ou

$3 x^2 dx$, ou $m x^{m-1} dx$, ou $\frac{n}{m} x^{\frac{n-m}{m}} dx$, ou $a x^{\frac{m}{n}} dx$,

qui est l'expression la plus générale pour le cas dont il s'agit ; alors l'intégrale se trouvera par le revers de l'opération directe & ordinaire. Car dans l'opération ordinaire on trouve la différentielle quelconque d'une grandeur , en diminuant l'exposant d'une unité , en mettant la caractéristique dx , & multipliant le tout par l'exposant de la puissance de la quantité variable. Pour trouver donc l'intégrale d'une différentielle , il n'y a qu'à faire le contraire , en ajoutant une unité à l'exposant de la quantité variable , en retranchant la caractéristique dx , & divisant le tout par l'exposant ainsi augmenté de l'unité. On en usera de même dans tous les cas semblables : voici la règle.

Retranchez la différentielle , ajoutez l'unité à l'exposant de la quantité variable , & divisez par l'exposant ainsi augmenté de l'unité.

Ainsi l'intégrale de $2 x dx$ ou $2 x^1 dx$, sera x^2 ; car retranchant dx , on aura $2 x^1$, ajoutant 1, à l'exposant, viendra $2 x^{1+1} = 2 x^2$; divisant par 2, on aura $\frac{2 x^2}{2} = x^2$ intégrale de $2 x dx$. De la même manière l'intégrale de $3 x^2 dx$ sera

x^3 ; celle de $m x^{m-1} dx$, sera x^m ; celle de $\frac{n}{m} x^{\frac{n-m}{m}} dx$,

sera $x^{\frac{n}{m}}$; celle de $-n x^{-n-1} dx$, sera x^{-n} ou $\frac{1}{x^n}$;

celle de $a x^{\frac{m}{n}} dx$, sera $\frac{an}{m+n} x^{\frac{m+n}{n}}$: Car dans ce dernier

cas si on ajoute 1 à $\frac{m}{n}$ exposant de la puissance de la quantité variable , & si on retranche la différentielle dx , on aura

$a x^{\frac{m+n}{n}}$ qui, divisé par $m+n$, nouveau exposant, le quotient $\frac{a n}{m+n} x^{\frac{m+n}{n}}$ fera l'intégrale de la différentielle $a x^{\frac{m}{n}} dx$.

Autrement.

La dernière différentielle & son intégrale étant plus générales qu'aucune de celles que nous avons rapportées, elles peuvent servir de formules pour trouver les intégrales des différentielles simples que nous avons déjà citées, en leur donnant la même forme & en faisant les substitutions convenables; par exemple, pour trouver l'intégrale de $x^{\frac{m}{n}} dx$ en

lui donnant la même forme qu'à la différentielle $a x^{\frac{m}{n}} dx$, cette différentielle se changera en $1 x^{\frac{1}{1}} dx$, supposant $a=1$, $n=1$, $m=2$. En substituant 1, pour a ; 1, pour n , & 2,

pour m ; dans l'intégrale $\frac{a n}{m+n} x^{\frac{m+n}{n}}$ alors vous aurez $\frac{1}{3} x^3$, pour l'intégrale de $1 x^2 dx$. De même l'intégrale de

$$4 \sqrt{x} dx = 4 x^{\frac{1}{2}} dx, \text{ est } \frac{8}{3} x^{\frac{3}{2}} = \frac{8}{3} \sqrt{x^3}.$$

L'intégrale de $\sqrt[3]{x^5} dx = x^{\frac{5}{3}} dx$, fera $\frac{3}{8} x^{\frac{8}{3}} = \frac{3}{8} \sqrt[3]{x^8}$.

L'intégrale de $\frac{1}{x^3} dx = 1 x^{-3} dx$, fera $\frac{1}{-2} x^{-\frac{1}{2}} = -x^{-\frac{1}{2}}$, en supposant dans cet exemple $a=1$, $n=1$, & $m=2$.

L'intégrale de $\frac{1}{\sqrt{x^3}} dx = x^{-\frac{3}{2}} dx$, fera $\frac{1}{-\frac{1}{2}} x^{-\frac{1}{2}} = -\frac{2}{\sqrt{x}}$.

Enfin l'intégrale de $\frac{1}{x} dx = 1 x^{-1} dx$, fera $\frac{1}{0} x^0 =$

$\frac{1}{0} x^0 = \frac{1}{0} \times 1 = \frac{1}{0} = \infty$. Car ici $a=1, m=-1, & n=1$.

Second cas. Si une expression différentielle consiste dans un nombre quelconque de termes simples comme ceux du premier cas, n. 2. alors l'intégrale sera composée d'autant de termes joints ensemble par les signes + & -, qu'il y a de termes dans l'expression différentielle ; par exemple :

L'intégrale de $x^3 dx + x^{\frac{3}{2}} dx$, ou $x^3 + x^{\frac{3}{2}} x dx$, sera $\frac{1}{3} x^3 + \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}}$. Car, par le premier cas, n. 2.

l'intégrale de $x^3 dx$ est $\frac{1}{3} x^3$; celle de $x^{\frac{3}{2}} dx$, est $\frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}}$. Par conséquent la somme de ces intégrales fera l'intégrale de la somme de ces différentielles.

De même l'intégrale de $x^3 dx - x^{\frac{3}{2}} dx$ sera $\frac{1}{3} x^3 - \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}}$.

Celle de $3 x dx - 2 x^2 dx + x^3 dx - 5 x^4 dx$, sera $\frac{3}{2} x^2 - \frac{2}{3} x^3 + \frac{1}{4} x^4 - x^5$.

Observez que celle de $x^{-1} dx + x^{-\frac{1}{2}} dx$, ou de $x^{-1} dx - x^{-\frac{1}{2}} dx$, sera $-x^{-1} - 2 x^{-\frac{1}{2}}$ ou $-x^{-1} + 2 x^{-\frac{1}{2}}$; en changeant les signes on aura leurs valeurs affirmatives, savoir $-x^{-1} + 2 x^{-\frac{1}{2}}$ ou $x^{-1} - 2 x^{-\frac{1}{2}}$.

Celle de $x^3 dx + x^{-1} dx$, sera $\frac{1}{3} x^3 - x^{-1}$.

Troisième cas. Quand les termes d'une expression diffé-

DES INFINIMENT PETITS. 23

rentielle se trouvent plus composés que ceux que nous venons de parcourir, il faut d'abord les réduire à de simples termes, en réduisant l'expression, comme on a fait dans les cas précédens, ou une partie en une série infinie, suivant les règles de la première section; ensuite l'intégrale peut aisément se trouver suivant les règles déjà données; par exemple, que $\frac{b}{a-x} dx$ soit une différentielle; il faut la réduire en une série infinie, (*premier Probleme, Section premiere.*) on aura $\frac{b}{a} dx - \frac{b}{a^2} x dx + \frac{b}{a^3} x^2 dx - \frac{b}{a^4} x^3 dx$, &c. dont l'intégrale, suivant le second cas, fera $\frac{b}{a} x - \frac{b}{2a^2} x^2 + \frac{b}{3a^3} x^3 - \frac{b}{4a^4} x^4$, &c.

De même l'intégrale de $\frac{1}{1+xx} dx = (*) 1 dx - x^2 dx + x^4 dx - x^6 dx$, &c. fera (*) $x - \frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{5} x^5 - \frac{1}{7} x^7$, &c. * art. 1. * art. 7.

L'intégrale de $\frac{2x^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{3}{2}}}{1+x^{\frac{1}{2}} - 3x} dx = (*) 2x^{\frac{1}{2}} dx - 2x dx + 7x^{\frac{3}{2}} dx - 13x^{\frac{5}{2}} dx + 34x^{\frac{7}{2}} dx$, &c. fera (*) $\frac{4}{3} x^{\frac{3}{2}} - x^2 + \frac{14}{5} x^{\frac{5}{2}} - \frac{13}{3} x^3$, &c.

De même l'intégrale de $\sqrt{aax+xx} \times dx = (*) adx + \frac{x^2}{2a} dx - \frac{x^4}{8a^2} dx + \frac{x^6}{16a^3} dx - \frac{5x^8}{128a^4} dx$, &c. (*) $ax - \frac{x^3}{6a} - \frac{x^5}{40a^2} + \frac{x^7}{112a^3} - \frac{5x^9}{1152a^4}$, &c.

Celle de $\frac{\sqrt{1+ax^2}}{\sqrt{1-bx^2}}$, fera $x + \frac{1}{6} b \left\{ x^3 + \frac{3}{40} b^2 \right\} + \frac{1}{6} a \left\{ + \frac{1}{20} ab - \frac{1}{40} a^2 \right\} x^5$, &c.

On peut trouver par les mêmes regles l'integrale de $\sqrt{dx^m \times e + f x^n} \times dx$, où dans cette expression d, e, f , sont des quantités données ou connues, & m, n, p , sont les exposans des quantités où ils sont attachés.

Faites $\frac{m+1}{n} = r, p+r=s, \frac{d}{nf} \times e + f x^n \frac{p+1}{n} = Q,$
 & $rn - n = s$: Alors l'integrale sera, $Q \times \frac{x^s}{s} - \frac{r-1}{s-1}$
 $\times \frac{eA}{fx^n} + \frac{r-2}{s-2} \times \frac{eB}{fx^n} - \frac{r-3}{s-3} \times \frac{eC}{fx^n} + \frac{r-4}{s-4} \times \frac{eD}{fx^n} \text{ &c.}$

Les lettres $A, B, C, D, \text{ &c.}$ denotent les termes qui précèdent; par exemple, A , le terme $\frac{x^s}{s}$, B le terme $-\frac{r-1}{s-1} \times \frac{eA}{fx^n}$, &c. Ces series, quand r est une fraction ou un nombre négatif, ne sont point terminées, c'est-à-dire, que l'integrale consiste dans une serie d'une infinité de termes, Mais quand r est une grandeur entiere ou affirmative, pour lors l'integrale sera composée d'un nombre fini de termes; par exemple, autant qu'il y aura d'unités dans r .

AUTREMENT.

Cette dernière differentielle & son integrale peuvent servir de formule generale pour trouver les integrales de toutes sortes d'expressions differentielles, pourvu qu'elles soient binomes: pour cet effet, on n'a qu'à leur donner la même forme qu'à l'expression differentielle, & ensuite les substituer, comme vous pourrez voir dans les exemples suivans.

E X E M P L E I.

Trouver l'integrale de $\sqrt{ax} \times dx$; réduisez cette expression à la forme ci-devant; alors $1x^0 \times 0 + ax^{\frac{1}{2}} \times dx$
 $= Dx^m \times e + f x^n \times dx$, dans laquelle $D=1, m=0,$
 $f=a,$

DES INFINIMENT PETITS. 25

$f=a$, $n=1$, $p=\frac{1}{2}$, $Q=\frac{1}{a} \times ax^{\frac{1}{2}}$, $t=0$, $r=1$, $s=\frac{1}{2}$; & en substituant ces valeurs dans l'intégrale générale ci-devant, on aura $\frac{1}{a} \times ax^{\frac{1}{2}} \times \frac{1}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3} x \sqrt{ax}$, pour l'intégrale cherchée, & en général l'intégrale de $cx^n dx$, est $\frac{c}{n+1} x^{n+1}$.

E X E M P L E I I.

$\frac{a^4 x}{e^4 - 1 - c c x - x^2} dx$ étant réduite à la forme générale de l'expression différentielle binome, donnera $a^4 x \times c c - x x$, ou $a^4 x^{-1} \times -1 + c c x^{-2} = D x^m \times e^{-f x^n}$. Dans le premier cas $D=a^4$, $m=1$, $e=c c$, $f=-1$, $n=2$, $p=-2$. D'où $r=1$, $s=-1$, $Q=-\frac{a^4}{2} \times \frac{1}{c c - x x}$; c'est-à-dire, $-\frac{a^4}{2 c c - 2 x x}$, $t=0$. Alors l'intégrale est $Q \times -\frac{x^r}{1}$, c'est-à-dire, $=\frac{a^4}{2 c c - 2 x x}$. Dans le second cas $D=a^4$, $m=-3$, $e=-1$, $f=c c$, $n=-2$, $p=-2$, $r=1$, $s=-1$, $Q=-\frac{a^4}{2 c c} \times -1 + c c x^{-2}$; c'est-à-dire, $-\frac{a^4 x x}{2 c^4 - 2 c c x x}$, $t=0$; & l'intégrale sera $Q \times -\frac{x^r}{1} = \frac{a^4 x x}{2 c^4 - 2 c c x x}$.

E X E M P L E I I I.

$\frac{a^4}{x^4} \sqrt{b x + x x} dx$ réduit à la forme générale, sera $a^4 x^{-\frac{7}{2}}$ $\times$ $b + x^{\frac{1}{2}} \times dx$, ou $a^4 x^{-4} \times \frac{1}{1 + b x^{-1}} \times \frac{1}{2} \times dx$. Dans le premier cas $D=a^4$, $m=-\frac{7}{2}$, $e=b$, $f=1$, $n=p=\frac{1}{2}$, & de même $r=-\frac{7}{2}$ &c. Maintenant, supposant r négatif, j'écrite l'autre cas; alors $D=a^4$, $m=-4$, $e=1$, $f=b$,
D

$n = -1$, $p = \frac{1}{2}$. De même $r = 3$, $s = 3\frac{1}{2}$, $Q = -\frac{a'}{b} \times \frac{1}{1+bx} \times \frac{1}{2}$ ou $-\frac{a'x+a'b}{bxx} \sqrt{xx+bx}$, &c $t = -2$: d'où l'intégrale est $Q \times \frac{x^{-2}}{3\frac{1}{2}} - \frac{2}{2\frac{1}{2}} \times \frac{x^{-1}}{3\frac{1}{2}b} + \frac{1}{1\frac{1}{2}} \times \frac{2}{2\frac{1}{2}} \times \frac{x^2}{3\frac{1}{2}bb}$, c'est-à-dire, $-\frac{30bb^2+24bx-16xx}{103bbxx} \times \frac{a'x+a'b}{bxx} \sqrt{xx+bx}$.

E X E M P L E I V.

$\frac{bx^{\frac{1}{3}}}{\sqrt[3]{c^3-3acx^{\frac{1}{3}}+3a^2cx^{\frac{2}{3}}-a^3xx}} dx$ étant réduit à la forme générale comme ci-dessus, donnera $bx^{\frac{2}{3}} \times c - ax^{\frac{1}{3}}$, $\times dx$, ou $D=b$, $m=\frac{1}{3}$, $e=c$, $f=-a$, $n=\frac{2}{3}$, $p=-\frac{3}{5}$, $r=2$, $s=\frac{7}{5}$, $Q=-\frac{ab}{a^2} \times c - ax^{\frac{1}{3}}$, $t=\frac{2}{3}$: Alors l'intégrale sera $Q \times \frac{5x^{\frac{2}{3}}}{7} - \frac{5}{2} \times -\frac{5c}{7a}$, qui est la même chose que $-\frac{30abx^{\frac{2}{3}}+75bc}{28aa} \times c - ax^{\frac{1}{3}}$.

S C H O L I E I.

8. On peut trouver, par la formule précédente, une formule générale pour les expressions différentielles trinomes ou plus composées, qui servira très-utilement pour trouver les intégrales des différentielles proposées, qui par-là sont moins compliquées, & peuvent être réduites à la même forme que ces formules. Mais comme cette voye est extrêmement longue, il vaut mieux chercher ces intégrales, par la première méthode du troisième cas, en réduisant ces expressions composées en des séries infinies ; ce qui les simplifie.

DES INFINIMENT PETITS. 27

On ne doit point réduire en séries infinies ces expressions composées, qu'on n'ait auparavant essayé par addition, soustraction, multiplication, division, &c. les quantités changeantes; car souvent on les réduit, par cette voye, à des formes simples, comme au second cas ci-dessus, où par ce moyen on trouve en termes finis leurs integrales.

Il est nécessaire d'observer ici que lorsqu'une expression différentielle & radicale se trouve de façon que la partie hors du signe est la différentielle de ce qui est sous le signe, ou est dans un rapport quelconque avec elle; alors l'intégrale se trouvera toujours en termes finis par substitution, suivant le second cas ci-dessus.

E X E M P L E I.

L'intégrale de $adx\sqrt{ax-aa}$, ou $\sqrt{ax-aa}^{\frac{1}{2}} \times a\,dx$, où adx , est la différentielle de $\sqrt{ax-aa}$, ou de $\sqrt{ax-aa}^{\frac{1}{2}}$, sera suivant le second cas, $\frac{2}{3}\sqrt{ax-aa}^{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3}ax-aa\sqrt{ax-aa}$.

E X E M P L E II.

L'intégrale de $2xdx\sqrt{xx+aa}$, ou $\sqrt{xx+aa}^{\frac{1}{2}} \times 2xdx$, où $2xdx$, est la différence de $\sqrt{xx+aa}^{\frac{1}{2}}$, sera, $\frac{2}{3}\sqrt{xx+aa}^{\frac{3}{2}} = \frac{2xx+3aa}{3}\sqrt{xx+aa}$.

E X E M P L E III.

L'intégrale de $a+x^{\frac{m}{n}} \times dx$, sera $\frac{n}{m+n}a+x^{\frac{m+n}{n}}$.

E X E M P L E IV.

L'intégrale de $xdx\sqrt{xx+aa}$, dont la différentielle xdx hors du signe, est à celle qui y est comprise $2xdx$, comme 1 à 2; l'intégrale donc sera $\frac{1}{3}xx+\frac{1}{3}a\sqrt{xx+aa}$.

D ij

$\sqrt{xx+aa}$. Car faisant $\sqrt{xx+aa}=z$, alors $2zdz=2xdx$, & $\sqrt{xx+aa} \times xdx=z^2dz$, dont l'integrale, suivant le second cas, $=\frac{1}{3}z^3$, par la substitution à la premiere integrale déjà trouvée; de cette maniere l'integrale du second exemple peut se trouver en mettant $xx+aa=z^2$.

E X E M P L E V.

L'integrale de $\sqrt{x^m+a^2} \times x^{m-1}dx$, dont la differentielle $x^{m-1}dx$ hors du signe, est à la difference de la quantité qui y est comprise; par exemple, $mx^{m-1}dx$, étant comme 1 à m , donnera pour integrale $\frac{1}{m+1} \sqrt{x^m+a^2}$; car si on fait $x^m+a^2=z$, alors $x^m+a^2=z^2$, & $x^m+a^2=z^{n-1}$, de même $mx^{m-1}dz = nm x^{m-1}dx \times \sqrt{x^m+a^2} = nm x^{m-1}dx \times z^{n-1}$; & divisant par nz^{n-1} , on aura $dz = mx^{m-1}dx$, ou $x^{m-1}dx = \frac{dz}{m}$; d'où on tire $x^{m-1}dx \times \sqrt{x^m+a^2} = \frac{z^n dz}{m}$; & vous aurez pour integrale $\frac{1}{nm+1} z^{n+1} = \frac{1}{nm+1} \sqrt{x^m+a^2}^{n+1}$.

Il est à propos de donner ici de simples differences tirées des *Quadratures des courbes* de M. le Chevalier Neuvion, dont les integrales se trouvent à côté en termes finis. Par ce moyen à la premiere inspection on trouve l'integrale d'une difference, lorsque cette difference se trouve conforme à la table, ou par le moyen d'une substitution facile. Dans cette table x est la quantité variable & D, e, f, g, h, n , sont des quantités constantes ou données.



FORMES DES DIFFERENCES.		INTEGRALES.
I.	$Dz^1 - 1dz$	$\text{Integ.} = \frac{D}{1} z^2.$
II.	$\frac{Dz^{1-n-1}dz}{z^2 + 2zfz^2 + f^2z^{2n}}$	$\text{Integ.} = \frac{Dz^1}{n^2 + 2nfz^2}, \text{ ou } \frac{-D}{nf + f^2z^2}.$
III.	1. $Dz^{2n-1}dz \times \sqrt{e+fz^2}$	$\text{Integ.} = \frac{1D}{15f} R^1, R \text{ étant } = \sqrt{e+fz^2}.$
	2. $Dz^{2n-1}dz \times \sqrt{e-fz^2}$	$\text{Integ.} = \frac{-4e + 6fz^2}{15f^2} DR^1.$
	3. $Dz^{2n-1}dz \times \sqrt{e+fz^2}$	$\text{Integ.} = \frac{16e^2 - 24efz^2 + 30f^2z^{2n}}{105f^3} DR^1.$
	4. $Dz^{2n-1}dz \times \sqrt{e-fz^2}$	$\text{Integ.} = \frac{-96e^2 + 144efz^2 - 180f^2z^{2n} + 210f^3z^{2n}}{945f^3} DR^1.$
IV.	1. $\frac{Dz^{1-n-1}dz}{y^1 - fz^2}$	$\text{Integ.} = \frac{1D}{y^1} R.$
	2. $\frac{Dz^{1-n-1}dz}{y^1 + fz^2}$	$\text{Integ.} = \frac{-4e + 5fz^2}{3yf^2} DR.$
	3. $\frac{Dz^{1-n-1}dz}{y^1 - fz^2}$	$\text{Integ.} = \frac{16e^2 - 8efz^2 + 6f^2z^{2n}}{105f^3} DR.$
	4. $\frac{Dz^{1-n-1}dz}{y^1 + fz^2}$	$\text{Integ.} = \frac{-96e^2 + 48efz^2 - 36f^2z^{2n} + 30f^3z^{2n}}{105f^3} DR.$

S C H O L I E.

Je vais , avant que de finir cette section , ajouter un mot

sur l'excellente méthode de feu *M. Cotes*, Professeur d'Astronomie & de Philosophie expérimentale dans l'Université de Cambridge, publiée après sa mort sous le titre de *Harmonia Mensurarum*, par son successeur *M. Smith*, touchant la manière de trouver les integrales des différentielles par les mesures des rapports & des angles.

On évite par cette méthode la peine de réduire les quantités en séries infinies, qui se trouvent très-incommodes en bien des occasions; souvent même à cause de leur lenteur à converger on ne s'en sert pas. Mais la bonne façon pour intégrer les différences, est de les trouver géométriquement, à l'aide des amples tables de Logarithmes de Briggs; de même que pour trouver la mesure des raisons & des rapports, on se sert d'une grande table de sinus & tangentes pour la mesure des angles. De-là on peut tirer un merveilleux moyen pour résoudre tout problème quelque composé qu'il soit, comme la quadrature d'une espace curviligne, la rectification des courbes, la cubation des solides, &c. dans lesquels les integrales des différentielles données sont employées. Je donnerai plusieurs exemples à ce sujet.

Dans le livre que je viens de citer, il y a deux séries ou tables, où à la tête de chaque page se trouvent plusieurs formes de différences avec leurs integrales qui sont exprimées au-dessous par la mesure des raisons ou des angles. Une de ces deux séries est composée par *M. Cotes* lui-même, & l'autre par le *Docteur Smith*. Dans les tables de *M. Cotes*, auxquelles je me bornerai, comme étant suffisantes pour ce que nous nous proposons, & même pour ce qui se présente ordinairement, x est la quantité variable; D , e , f , sont des quantités constantes; n est un exposant général d'une puissance quelconque de x , p un nombre quelconque affirmatif ou négatif, & les quantités R , S , T , sont toujours les trois côtés d'un triangle rectangle, dont les valeurs placées au bas de chaque page, expriment le rapport ou l'angle; & c'est par leurs mesures qu'on a les integrales des différences données. Si R est la racine quarrée d'une quantité affirmative, elle exprime une raison, étant toujours comme $R \rightarrow T$, à S . Mais si R est la racine quarrée d'une quantité négative, elle dénote un angle qui sera toujours comme la tangente & la secante sont au rayon, ou comme

DES INFINIMENT PETITS. 31

T & S est à R , où la quantité négative est changée en affirmative. Dans les colonnes de chaque page des tables, où θ est à la tête, sont une partie des valeurs affirmative & négative de θ , vis-à-vis lesquelles se trouvent les integrales des différences, comme dans la seconde forme $\frac{Dz^{\theta+1-\frac{1}{2}}}{e+fz^{\frac{1}{2}}} dz$;

quand $\theta=1$, l'integrale est $\frac{2Dz^{\frac{1}{2}}}{3f} - \frac{2Dez^{\frac{1}{2}}}{fff} + \frac{2e}{fff} DR \left| \frac{R+T}{S} \right|$; quand $\theta=0$, l'integrale est $\frac{1}{n} DR \left| \frac{R+T}{S} \right|$; & quand $\theta=-1$, l'integrale est $\frac{-1D}{ne z^{\frac{1}{2}}} + \frac{1}{n} DR \left| \frac{R+T}{S} \right|$; ainsi des autres.

Mais on ne peut bien déterminer ces integrales que lorsqu'on a la quantité $R \left| \frac{R+T}{S} \right|$ est connue, qu'on appelle la mesure du rapport, ou raison de $R+T$ & S au module R , quand R est affirmatif, ou jusqu'à ce que la quantité $\frac{2e}{fff} DR \left| \frac{T+R}{S} \right|$ ou $\frac{1}{n} DR \left| \frac{R+T}{S} \right|$ ou $\frac{1}{n} DR \left| \frac{r+t}{s} \right|$, soit trouvée dans plusieurs integrales, dont le premier est la mesure ou rapport de $R+T$, & de S au module $\frac{2e}{fff} DR$: le second est la mesure du rapport de $R+T$ & de S au module $\frac{1D}{n} R$; & le troisième de $R+T$, & de S au module $\frac{1}{n} DR$. Or quand R est négatif, la quantité $R \left| \frac{R+T}{S} \right|$ est = à la mesure d'un angle dont le rayon, la tangente, & la secante, sont les valeurs respectives de R , T & S au rayon R , comme à un module. Je donnerai bientôt la manière de trouver la mesure d'un rapport ou d'un angle à un module donné; mais il est à propos de donner auparavant quelques définitions ou explications des termes, pour se rendre plus claires, & afin qu'une personne puisse entendre avec ordre l'usage de ces excellentes tables, sans être obligé de lire les propositions de la première partie de *harmonia mensurarum*, qui sont traitées trop généralement pour être conçues par une médiocre capacité, & sans beaucoup d'application.

DEFINITION I.

La raison d'un rapport est une quantité quelconque proportionnelle à ce rapport ; c'est-à-dire , si M , est la mesure du rapport de A , à B , ou de $\frac{A}{B}$; & m , la mesure du rapport de a à b , ou de $\frac{a}{b}$; alors on aura $M : \frac{A}{B} :: m : \frac{a}{b}$. Ainsi les raisons égales ont les mêmes mesures : si un rapport est le double de l'autre , la mesure du premier sera double de celui du second ; si le premier est triple du second , la mesure du premier sera triple de celle du dernier ; si la moitié , la moitié , &c. de sorte que si on augmente ou diminue par composition ou résolution , la mesure sera également & proportionnellement augmentée ou diminuée.

Il faut observer que la mesure d'un rapport d'égalité est 0 , & si la mesure d'un rapport d'une quantité plus grande à une moindre , est supposée positive , alors la mesure du rapport d'une quantité petite comparée à une grande , sera négative.

DEFINITION II.

La mesure numérique d'un rapport , est l'excès du logarithme d'un nombre marquant l'antecedent au-dessus du logarithme d'un nombre exprimant le consequent ; c'est-à-dire , le logarithme du quotient de la division de l'antecedent par le consequent , est la mesure numérique d'un rapport numérique.

DEFINITION III.

La mesure trigonometrique d'un angle , est la quantité de degrés , de minutes , de secondes , &c. compris dans cet angle.

DEFINITION IV.

Le module des logarithmes de Briggs , Vlaque , &c. est 0 , 434294481903 , &c. par lequel l'unité étant divisée , le quotient 2 , 302585092994 , &c. sera le module réciproque du logarithme déjà cité , c'est-à-dire , le quotient de la division d'une quantité quelconque par le premier module , est égale au produit de cette quantité multipliée par le module réciproque. Cette

DES INFINIMENT PETITS. 33

Cette définition, ou plutôt cette description de la quantité du module des logarithmes, est suffisante pour ce que je me propose. Ceux qui n'en seront pas satisfaits, pourront consulter la *premiere proposition*, les corollaires & les scholies de la premiere partie de *harmonia mensurarum*. On peut en user de la même façon pour les définitions suivantes, qui sont des conséquences de la *proposition*. Voyez les Notes de l'ingénieur M. Smith, page 94, à la fin de ses *harmonia mensurarum*.

DEFINITION V.

Le module trigonometrique, ou le nombre de degrés contenus dans un arc de cercle égal au rayon, est à 180 degrés, comme le rayon du cercle est à la demie circonférence, est $57^{\circ} 17' 44''$, ou 57, 2957795130; par lequel l'unité étant divisée, le module réciproque de la règle trigonometrique est 0, 0174532925.

PROPOSITION I.

9. Trouver la mesure d'un rapport donné, à un module donné; ou trouver la quantité de l'expression $R \sqrt{\frac{R+T}{S}}$, R étant la racine quarrée d'une quantité affirmative, & R, T, S , les trois côtés d'un triangle rectangle.

Formule. Comme le module du logarithme 0, 434294481903, &c. est au module R du rapport $R+T$ à S ; ainsi le logarithme de ce rapport est à sa mesure, ayant R pour module qui est égal à $R \sqrt{\frac{R+T}{S}}$ ou bien multipliez le produit du logarithme du rapport proposé $R+T$ à S , & de la quantité R comme module, par le module réciproque 2, 302585092994, &c. ce second produit est la mesure du rapport $R+T$ à S avec R , qui en est le module, & il est égal à la valeur de $R \sqrt{\frac{R+T}{S}}$ quantité cherchée.

Voici un exemple numérique; soit $R=8$, $T=6$, $S=10$.

Le module du logarithme 0, 434294481903 : 8 :: le logarithme (de $\frac{14}{10}$) 0, 1461280 : 2, 6916777 = à la mesure

E

du raport de 14 & 10 au module 8, égal à $8 \left| \frac{8+6}{10} \right|$.

Qu pour abreger, 1: *recip. mod. log.* 2, 302585092994 :: le logarithme (de $\frac{14}{10}$) 0, 1461280 $\times$ 8: module donné, 2, 6916777 mesure du raport comme ci-devant.

Fig. 1.

Ce probleme peut être résolu sans calcul, par le moyen du secteur d'une hyperbole, de la maniere suivante. Que *AG* soit une hyperbole, *CA* la moitié de son diametre, *CB*, la moitié du conjugué, & *CE*, une asymptote. Tirez *AQ*, parallele à *CB*, ensuite faites *R:T :: AQ:AD*, & si *CA $\times$ CB* est $= 2R$, le secteur *CAM* $= R \left| \frac{R+T}{S} \right|$; le triangle *CAD* étant égal à *T*, quand *T* est moindre que *R*, & le triangle *CBE*, égal à *T*, quand *T* est plus grand que *R*.

COROLLAIRE I.

10. Il suit de-là que si *m* est un module constant du logarithme, & *l* le logarithme du raport $\frac{R+T}{S}$, pour lors on aura $R \left| \frac{R+T}{S} \right| = R \times \frac{l}{m}$.

COROLLAIRE II.

11. Il suit encore que $\frac{nR}{m} \left| \frac{T^n}{S^n} \right| = R \left| \frac{T}{S} \right| : m$ étant un nom-

bre entier quelconque, & *n* un autre, cette forme suit la nature des logarithmes.



PROBLEME II.

12. *Trouver la mesure d'un angle, dont le rayon est comme R , la tangente comme T , & la sécante comme S , à la quantité R , comme module : ou trouver la valeur de cette expression $R \sqrt{\frac{R+T}{S}}$, R étant la racine quarrée d'une quantité négative, par conséquent impossible ; toutes étant des quantités données.*

Formule. Dites premicrement, comme la valeur de R est à la valeur de T , ou comme la valeur de R est à la valeur de S , ainsi dans les tables les rayons des tangentes & secantes, sont aux tangentes ou secantes de l'angle à mesurer, vis-à-vis desquels se trouve la valeur de cet angle en degrés ou minutes, &c. en étant la mesure trigonometrique : ensuite dites comme le module trigonometrique $57^{\circ}, 17', 44''$, ou $57, 2957795130$. est à la mesure trigonometrique juste de l'angle, ainsi le module de cet angle ; par exemple, R est à la mesure dudit angle, ayant R pour module égal à la quantité $R \sqrt{\frac{R+T}{S}}$; ou bien multipliez le produit de la mesure trigonometrique de l'angle par le module R , par le module réciproque logarithmique $0, 0174532925$, &c ce second produit est la mesure de l'angle au module donné R .

En voici un exemple numerique ; que $R=16$, $T=12$, $S=20$, on a $16 : 12$, comme le rayon $10000000 : 7500000 =$ à la tangente, & $16 : 20 ::$ le rayon $10000000 : 12500000 =$ à la sécante.

Vous trouverez vis-à-vis dans les tables $36^{\circ}, 52', 6''$, pour la mesure trigonometrique de l'angle.

Ou bien ; le module trigonometrique $57, 2957795130$: à la mesure trigonometrique $36, 86833331$: le module $16 : 10.4330985 =$ à la mesure de l'angle, dont le rayon est comme 16 , la tangente comme 12 , & la sécante comme 20 , au module 16 ; ou égal à $16 \sqrt{\frac{16+12}{20}}$.

Observez qu'on abrege bien plus en se servant du module

réciproque 0174532925. qu'en se servant du directe, & les opérations sont bien plus courtes, en se servant des logarithmes pour trouver le quatrième terme de la proportion dans les problèmes précédens comme dans celui-ci.

On peut résoudre également ce problème, ou par le moyen d'un secteur de cercle, ou par celui d'un élipse, de la manière suivante. Que CA , CB , soient les rayons d'un quart de cercle, ou demies axes d'un élipse AB ; tirez l'une sur l'autre égal à $2R$; tirez AQ , parallèle à CB , & BG , parallèle à CA ; faites ensuite $R:T::CB:AD$; tirez la ligne droite $CMDG$; alors le secteur CAM est égal à $R \sqrt{\frac{R+T}{S}}$ quand R est plus grand que T au triangle CAD , & le secteur $CBM = R \sqrt{\frac{R-T}{S}}$, quand R est moindre que T au triangle CBG .

Remarquez que quand par hazard S , se trouve la racine quarrée d'une quantité négative, & par conséquent impossible, vous pouvez changer le signe, & vous parviendrez également bien à la solution.

COROLLAIRE.

13. Si a est un angle dont les rayons, tangentes & sécantes, soient R , T , S , & que m soit un module constant, alors $R \sqrt{\frac{R+T}{S}} = \frac{aR}{m}$.

SCHOLIE.

14. R , T , S , étant toujours les trois côtés d'un triangle rectangle; donc $R \sqrt{\frac{R+T}{S}} = R \sqrt{\frac{S}{T-R}}$, suposant T l'hypothénuse; car par la propriété du triangle rectangle $T = \sqrt{RR+SS}$; & de même $R \sqrt{\frac{R-T}{S}} = R \sqrt{\frac{R+\sqrt{RR+SS}}{S}}$, & $R \sqrt{\frac{S}{T-R}} = R \sqrt{\frac{S}{\sqrt{RR+SS}-R}}$; & multipliant en croix, vous trouverez $\sqrt{RR+SS}+R \times \sqrt{RR+SS}-R=SS$; la somme de deux nombres multipliés par leurs différences étant égale

DES INFINIMENT PETITS

37


la différence de leurs quarrés ; ainsi $\frac{R+\sqrt{RR+SS}}{S}$ est =


$\frac{S}{R+\sqrt{RR+SS}}$; c'est-à-dire $\frac{R+T}{S} = \frac{S}{T-R}$; conséquemment

$$R \left| \frac{R+T}{S} = R \right| \frac{S}{T-R}.$$

Ceci paroît évident par la figure 83 ; car que l'hypothénuse $AB=T$, la perpendiculaire $CB=R$, & la baze $AC=S$, continuë AB , jusqu'à ce que $BD=BC=R$, faites $BE=BC$; alors vous aurez $AD=R+T$, & $AE=T-R$: si l'on décrit un cercle autour de B , de l'intervale BC , comme rayon, il passera par E & par D , & AC le touchera au point C ; par conséquent par la trente-sixième proposition, liv. troisième

$$d'Eucl. $\frac{AC}{R+T} (SS) = AD \times AE = \overline{R+T} \times \overline{T-R}$; donc $\frac{S}{S} = \frac{T-R}{T-R}.$$$





SECTION III.

*Usage de la methode des integrales pour la quadrature
des espaces curvilignes.*

P R O B L E M E.

15. . *Quarrer un espace curviligne.*

Fig. 1.

Ayant trouvé l'équation qui exprime le rapport d'une abscisse quelconque $AP (x)$ à son ordonnée correspondante $PM (y)$ qui la coupe à angles droits, cherchez d'abord la valeur de y qu'il faut multiplier par dx ; l'intégrale de ce produit exprimera la quadrature de l'espace mixtiligne indéterminé, compris par l'abscisse AP , l'ordonnée PM , & la courbe AM ; & si l'abscisse AP est déterminée, par Ex : égale à une grandeur donnée a , la courbe conséquemment le sera aussi; ainsi en substituant a pour x dans l'intégrale déjà citée, il en résultera une expression qui sera la quadrature de l'espace mixtiligne déterminé. Les exemples suivans rendront ceci plus intelligible.

Fig. 4.

Mais si l'aire $CDEF$ est contenuë entre deux courbes ou lignes droites DE , CF , la ligne droite CD , & la partie d'une droite EF d'une ligne quelconque AE , tirée d'un point donné A , pris dans la droite CD ; alors tirez Afe , infiniment proche de AFe , & du centre A décrivez les petits arcs Fp , Eq ; ensuite par la nature de la courbe, trouvez l'aire de l'espace quadrilatère $FEqp$, qui est égal à la différence des petits secteurs AFp , AEq , ou égal à $\frac{1}{2} AE \times Eq - \frac{1}{2} AF \times Fp$, égale à l'espace $FEef$, différence de l'aire $CDEF$, dont l'intégrale sera égale audit aire, Je donnerai dans la suite des exemples de ceci.

E X E M P L E I.

16. Trouver l'aire d'un triangle ABC .

Tirez AD , perpendiculaire à un des côtés, comme BC , dans laquelle prenez entre le point A & D le point P , sur lequel tirez la ligne MN perpendiculaire à AD ; que mn soit infiniment proche & parallèle à MN , & tirez Mp , Nq , perpendiculaires à MN ; alors le rectangle $MNqp$, compris par Mp & Nq , ou Pp , & l'ordonnée MN , est l'élément de l'aire indéterminée AMN , qu'on trouvera ainsi.

Fig. 5.

Que la quantité variable AP soit appelée x , PM , y , les constantes & données AD , a ; CB , b , & parce que MN est parallèle à BC , on aura $AD(a) : CB(b) :: AP(x) : MN(y)$, d'où on tire $y = \frac{bx}{a}$; mais $Pp (=Mp=Nq)=dx$; ainsi

l'élément de l'aire indéfinie AMN , est $\frac{bx}{a} dx$, dont l'intégrale est, selon le second cas, $\frac{bx^2}{2a}$, qui est égale à l'aire AMN ; maintenant si au lieu de $AP(x)$ vous substituez $AD(a)$ vous aurez $\frac{bx^2}{2a} (= \frac{1}{2} ab) = \frac{1}{2} AD \times CB$, aire totale de tout le triangle ACB ; ce que nous savons d'ailleurs être vrai par les élémens de géométrie.

Nous n'oublions point ici de donner la manière de trouver, par les intégrales, l'aire d'un trapèze $GPCB$ ayant deux côtés PC , GB , parallèles, & les angles B , C , droits: il est vrai qu'on les trouve plus promptement par les élémens communs de la géométrie, mais il est agréable de découvrir la vérité par plusieurs points de vûe.

Fig. 6.

Pour y parvenir, continuez CB & PG , jusqu'à leurs rencontres en A , du point A tirez Amp , infiniment proche de AGP , & des distances Am , Ap ; décrivez du centre A les arcs semblables mr , pn , ensuite faites $AB=a$, $BC=b$, $EG=x$, $AG=y$. Maintenant à cause de la similitude des triangles ACP , pPn , qui ont les angles C , & n droits, & l'angle P commun, on aura $AG(y) : AB(a) :: Gm(dx) : mr = \frac{adx}{y}$, qui étant multiplié par $\frac{1}{x} Ar (= \frac{1}{2} AG = \frac{1}{2} y)$

donnera pour produit $\frac{adx}{a}$, égale à l'aire du petit triangle Arm , ou AGm , qui ne diffère seulement que du triangle Gmr , infiniment plus petit qu'aucun d'eux.

Les triangles ABG , ACP , étant semblables, on aura $AB(a) : AG(y) :: BC(b) : GP = \frac{by}{a}$; & par conséquent $AP = \frac{by}{a} + y$, & parce que Am , AG , & AP , Ap diffèrent seulement les uns des autres d'une grandeur infiniment petite; ainsi on peut prendre Am , pour AG , & Ap , pour AP , ce qui étant accordé, & les triangles Amr , Apn , pris pour semblables, on aura $AG(y) : rm(\frac{adx}{y}) :: AP(\frac{by}{a} + y) : pn = \frac{bdx}{y} + \frac{adx}{y}$, qui étant multiplié par $\frac{1}{a} AP(\frac{by}{a} + \frac{y}{a})$ donnera pour produit $\frac{bbdx}{2a} + bdx + \frac{1}{2} adx$, égale à l'aire du triangle Apn , ou APP , duquel retranchant l'aire du triangle $AmG(\frac{adx}{a})$ trouvée ci-devant; le reste $bdx + \frac{bb}{2a} dx$, est l'aire du trapeze $mpnr$, qu'on peut regarder pour l'aire du trapeze $mpPG$, qui est l'élément du trapeze $BCPG$; mais l'intégrale de cet élément est $bx + \frac{bbx}{2a} = \frac{2abx + bbx}{2a} = \frac{2ax + bx}{a} \times \frac{b}{2}$; mais $\frac{ax + bx}{a} = PC$, ainsi puisque par la similitude des triangles ABG , ACP . $AB(a) : BG(\lambda) :: AC(a+b) : CP = \frac{ax + bx}{a}$; donc $GB + PC \times \frac{1}{a} BC =$ l'aire du trapeze $GPCB$; ce que nous savions déjà être vrai par les éléments ordinaires de la géométrie.

E X E M P L E I I.

17. Trouver l'aire, ou quarrer l'espace parabolique ordinaire ABD .

Fig. 1.

Nommez les quantités connues AD , a ; BD , b , l'abscisse invariable AP , x , l'ordonnée correspondante PM , y , faites $Pp = dx$. Maintenant l'équation qui exprime le rapport de chaque AP , x , à PM , y , est $px = yy$; d'où on tire y

DES INFINIMENT PETITS. 41

$=\sqrt{px} = p^{\frac{1}{2}} x^{\frac{1}{2}}$: Ainsi le petit rectangle $PMnp$, qui est égal à l'élément de l'espace indéfini AMP , sera $\sqrt{px} \times dx$; c'est-à-dire, $ydx = p^{\frac{1}{2}} \times x^{\frac{1}{2}} dx$, dont *selon le second cas*, l'intégrale est $= (\frac{2}{3} p^{\frac{1}{2}} x^{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3} \sqrt{px^3} = \frac{2}{3} \sqrt{x^3 y^2}) \frac{1}{2} xy$, égale à l'espace indéterminée AMP , en substituant a pour x , & b , pour y , dans cette intégrale; on aura $\frac{2}{3} ab = \frac{2}{3} AP \times PM$; c'est-à-dire, que l'espace parabolique est au rectangle formé par la moitié de l'ordonnée & par l'abscisse, comme $\frac{1}{2} xy$ est à xy , ou comme 2 est à 3.

EXEMPLE III.

18. Quarrer les paraboles de tous les genres.

Si $AP(x)$ est l'abscisse, & $PM(y)$ l'ordonnée correspondante, alors le rapport qui est entre les abscisses & les ordonnées d'une parabole telle qu'elle soit, s'exprimera par cette

Fig. 1.

équation générale $pm x^m = y^n$; donc $p^{\frac{m}{n}} x^{\frac{m}{n}} = y$; ainsi l'élément de l'aire sera $ydx = p^{\frac{m}{n}} x^{\frac{m}{n}} dx$; & son intégrale, *suivant le second cas, section 2*, sera $\frac{q}{n+q} p^{\frac{m}{n}} x^{\frac{n+q}{n}} = \frac{q}{n+q}$

xy ; car $p^{\frac{m}{n}} x^{\frac{n}{n}} = y$. Donc tout paraboloïde est au rectangle formé par l'ordonnée & par l'abscisse, comme $\frac{q}{n+q}$ est à xy , ou, comme q est à $n+q$.

EXEMPLE IV.

19. Quarrer le segment de l'espace parabolique PMN , compris par les ordonnées PM , NQ , par la partie PQ de l'abscisse, & la partie MN de la courbe.

On suppose ici $AP=a$, invariable, P l'origine des quantités changeantes, $PQ=x$. De même $QN=y$, & le paramètre $=p$; alors $AQ=a+x$, tirez nq , parallèle & infiniment proche à NQ .

Fig. 7.

Maintenant par la propriété de la courbe $AP+PQ \times p = NQ$, $= pa+px=yy$, & $\sqrt{pa+px}=y$, donc QN
F

$\times \mathcal{Q}g = ydx = dx \sqrt{pa+px} = 1x^0 \times pa+px^{\frac{1}{2}} dx$, qui est l'élément de l'aire, dont on trouvera par la dernière manière du second cas, section deuxième, l'intégrale; mais on le fera plus aisément si on suppose $\sqrt{pa+px} = z$; car alors $pa+px = zz$, & $pdz = z dz$ & $dx = \frac{z dz}{p}$; donc $ydx = \frac{z^2 dz}{p}$, & alors l'intégrale sera $\frac{1}{3} \frac{z^3}{p} = \frac{1}{3} \frac{pa+px \times \sqrt{pa+px}}{p} = \frac{1}{3} a+px \times \sqrt{pa+px} = \frac{1}{3} A\mathcal{Q} \times N\mathcal{Q}$.

Mais parce que dans le point P , $x=0$, l'espace $PMN\mathcal{Q}$, s'évanouit; ainsi, faisant $x=0$ dans l'intégrale déjà trouvée, les termes x & px , s'évanouiront; de façon que l'intégrale sera $\frac{1}{3} a\sqrt{pa}$, qui indique ce qu'on doit ajouter à l'intégrale, afin que l'espace $PMN\mathcal{Q}$, soit nulle ou 0, dans le point P , ce qui donnera la quadrature cherchée; en ce cas $\frac{1}{3} a\sqrt{pa}$, doit être retranché; ainsi l'aire de $PMN\mathcal{Q} = \frac{1}{3} a+px \sqrt{pa+px} - \frac{1}{3} a\sqrt{pa} = \frac{1}{3} A\mathcal{Q} \times N\mathcal{Q} - \frac{1}{3} AP \times PM$.

AUTREMENT.

Tirez mp , infiniment proche de MP ; faites $A\mathcal{Q}=a$, invariable; que l'origine de x soit en $\mathcal{Q}$, & que $\mathcal{Q}P=x$, $PM=y$, ce qui donnera $AP=a-x$.

Maintenant par la propriété de la courbe $A\mathcal{Q}-\mathcal{Q}P \times p = PM$; c'est-à-dire, $pa-px=yy$; ce qui donne $\sqrt{pa-px} = y$. Ainsi $MP \times Pp$, élément de l'aire, est $ydx = dx \sqrt{pa-px}$; dont on peut trouver l'intégrale de cette façon: Faites $pa-px=zz$, vous aurez $-pdz = z dz$, & conséquemment $dx = -\frac{z dz}{a}$, & $ydx = -\frac{z^2 dz}{a}$, dont l'intégrale est $-\frac{1}{3} \frac{z^3}{a} = -\frac{1}{3} \frac{a-px \times \sqrt{pa-px}}{a} = \frac{1}{3} x-a \times \sqrt{pa-px}$.

Présentement pour trouver ce qu'on doit ajouter à l'intégrale pour avoir la quadrature de l'espace $PMN\mathcal{Q}$, faites comme auparavant $x=0$ dans l'intégrale, & vous aurez

DES INFINIMENT PETITS. 43

— $\frac{1}{3} a \sqrt{pa}$, d'où il est évident que si $+\frac{1}{3} a \sqrt{pa}$, est ajouté à l'intégrale, l'espace $PMN \mathcal{Q} = \frac{1}{3} a \sqrt{pa} + \frac{2}{3} \frac{x-a}{x-a} \times \frac{pa-px}{x-a}$.

COROLLAIRE I.

20. L'espace $PMN \mathcal{Q} = AN \mathcal{Q} - AMP$; mais dans la première manière $AN \mathcal{Q} = \frac{2}{3} A \mathcal{Q} \times \mathcal{Q}N = \frac{1}{3} \frac{a+x}{a-x} \times \frac{pa-px}{x-a}$; & $AMP = \frac{1}{3} AP \times PM = \frac{2}{3} a \sqrt{pa}$; donc $PMN \mathcal{Q} = \frac{1}{3} A \mathcal{Q} \times \mathcal{Q}N - \frac{2}{3} AP \times PM$.

Il faut observer que dans la dernière manière $AN \mathcal{Q} = \frac{2}{3} A \mathcal{Q} \times \mathcal{Q}N = \frac{1}{3} a \sqrt{pa}$, & $AMP = \frac{2}{3} AP \times PM = \frac{2}{3} \frac{a-x}{a-x} \times \frac{pa-px}{x-a}$; donc $\mathcal{Q}NMP = \frac{2}{3} A \mathcal{Q} \times \mathcal{Q}N - \frac{1}{3} AP \times PM$, comme nous avons trouvé auparavant.

COROLLAIRE II.

21. Si la courbe n'est point décrite, & que l'équation qui l'exprime soit seulement donnée, alors étant incertain de l'origine de x , il est évident, selon la solution précédente, qu'on doit substituer 0 pour x , dans l'intégrale; ce qui effacera ou fera disparaître tous les termes affectés de x ; alors ce qui restera doit s'ajouter à l'intégrale en changeant le signe, & le tout sera la quadrature requise.

EXEMPLE V.

22. *Quarrer une courbe exprimée par cette équation*
 $x^5 + ax^4 + a^2x^3 + a^3x^2 + a^4 = a^4y$.

Puisque $y = \frac{x^5}{a^4} + \frac{x^4}{a^3} + \frac{x^3}{a^2} + \frac{x^2}{a} + a$, l'élément de l'aire sera $y dx = \frac{x^5}{a^4} + \frac{x^4}{a^3} + \frac{x^3}{a^2} + \frac{x^2}{a} + a \times dx$, & l'intégrale sera $\frac{x^6}{6a^4} + \frac{x^5}{5a^3} + \frac{x^4}{4a^2} + \frac{x^3}{3a} + ax$.

F ij

E X E M P L E V I.

23. *Quarrer une courbe quelconque dont la nature est exprimée par cette équation, $y = x \sqrt{x+a}$.*

Parce que $y = x \times x+a^{\frac{1}{m}}$, il s'enfuit que l'élément de l'espace cherché est $ydx = xdx \times x+a^{\frac{1}{m}}$, dont on trouvera facilement l'intégrale, en faisant $x+a = z^m$: car alors $x+a = z^m$, & différentiant chaque membre de cette équation, on aura $dx = mz^{m-1}dz$, d'où $ydx = mz^m dz$ & l'intégrale $= \frac{mz^{m+1}}{m+1} = \frac{m}{m+1} x+a \times \sqrt[m]{x+a}$.

Maintenant pour sçavoir si c'est la même intégrale, je suppose $x=0$, alors cette dernière expression est $\frac{m}{m+1} a \sqrt[m]{a}$, qui, suivant le second corollaire, exemple second, doit être retranchée de l'intégrale ; de manière que la véritable intégrale ou quadrature sera $\frac{m}{m+1} x+a \times \sqrt[m]{x+a} - \frac{m}{m+1} a \sqrt[m]{a}$.

E X E M P L E V I I.

- Fig. 8. 24. *Quarrer les hyperboles de tous les degrés par rapport à leurs asymptotes ; on, ce qui est la même chose, trouver l'aire de l'espace indéterminé HMPAS ou hMPs ; le premier contenu sous l'abscisse AP, l'ordonnée PM, l'asymptote AS, & la partie MH, de la courbe hyperbolique ; & le dernier sous l'ordonnée PM, la partie restante Ps de l'asymptote, & sous la partie Mb de la courbe hyperbolique.*

Le rapport qui est entre les AP (x) & les PM (y), s'exprime en général dans ces courbes par l'équation suivante $a^{m+n} = y^m x^n$.

D'où on tire $a^{m+n}x^{-n} = y^m$, & $a^{\frac{m+n}{n}}x^{-\frac{n}{m}} = y$;

donc $PM \times Pp = y dx = a^{\frac{m+n}{n}}x^{-\frac{n}{m}}dx$, dont l'intégrale est $(\frac{m}{m-n} a^{\frac{m+n}{n}} \times x^{-\frac{n}{m}})^{\frac{m}{m-n}} = \frac{m}{m-n} \sqrt[m]{a^{m+n}x^{m+n}} = \frac{m}{m-n} \sqrt[m]{y^m x^n} = \frac{m}{m-n} xy$.

Si m est plus grand que n , alors la quadrature de l'espace indéterminée $HMPAS$ est toujours $= \frac{m}{m-n} AP \times PM$; mais si m est moindre que n , alors $\frac{m}{m-n} xy$, est une quantité négative qui donne la quadrature de l'espace indéterminée $hMPs$ du côté opposé à l'ordonnée PM : mais quand $m=n$, alors aucun des deux espaces ne peuvent se quarrer, puisque dans ce cas l'un & l'autre sont infinis; car si $xy^2=a^3$, ce qui fait $m=2$, $n=1$, & ainsi $HMPAS = \sqrt{a^3x} = (\sqrt{x^3y^2}) = xy$. Si $xy^4=a^5$, par conséquent vous aurez $m=4$, $n=1$; ainsi $HMPAS = \frac{4}{3} xy$. Si $x^3y=a^5$, alors $m=1$, $n=2$; en ce cas $-xy$ sera la quadrature de l'espace $hMPs$; si $x^4y=a^5$, ce qui donne $m=1$, $n=4$, & par conséquent $-\frac{1}{3}xy$, c'est-à-dire $\frac{1}{3}xy = hMPs$; mais quand $m=n$, alors $\frac{m}{m-n} = \frac{1}{0}$; ainsi le numérateur est infini par rapport au dénominateur.

E X E M P L E V I I I.

25. *Quarrer l'hyperbole ordinaire avec ses asymptotes, ou, ce qui est la même chose, trouver l'aire ou l'espace $CcMP$, compris par les ordonnées Cc , PM , la partie CP , de l'asymptote & par la partie cM de la courbe hyperbolique.* Fig. 8.

Soit la quantité donnée $AC=b$ & soit C l'origine de x .
L'équation qui exprimera le rapport de AP ($b+x$) à PM

(*y*) fera $a^2 = by + xy$; ainsi $\frac{a^2}{b+x} = y$ & $y dx$ élément de l'aire, fera $\frac{a^2}{b+x} dx$.

Maintenant, *suivant le troisième cas, section première*, son integrale sera $\frac{a^2}{b} x - \frac{a^2}{2b^2} x^2 + \frac{a^2 x^3}{3b^2} - \frac{a^2 x^4}{4b^2} + \dots$, & c. = à l'aire $CcMP$; & si vous supposez $a=b=1$, alors $x - \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{4} x^4$, & c. = à l'aire dont on a déjà parlé.

Autrement.

Par la mesure d'un rapport ou d'un angle.

La différentielle $\frac{a^2}{b+x} dx$, peut se rapporter à la première forme dans les Tables de M. *Cotes*; car faisant $z=x$, $a=1$, $b=1$, $D=a^2$, $c=b$, $f=1$, on aura $\frac{Dz^{b-1}}{c+fz^c} dz = \frac{a^2}{b+x} dx$, & l'integrale qui répond à $b=1$, est $\frac{D}{cf} \left| \frac{z+fz^c}{c} \right| = a^2 \left| \frac{b+x}{b} \right| = AC \Big|_{AC}^{AP}$ égale à la mesure du rapport de AP & AC , à AC , comme au module que vous trouverez, *article 9*, égal à l'aire de l'espace $CcMP$; & si l'asymptote AS n'est point perpendiculaire à As , & que l'ordonnée PM , qui lui est parallèle, ne soit point perpendiculaire à l'abscisse AP , la mesure du rapport de AP à PM , avec le parallélogramme ACc , comme module, donnera l'aire de l'espace $CcMP$.

Ceci est démontré par synthèse, *page 12, partie première de harmonia mensuratum.*



E X E M P L E I X.

26. Trouver l'aire ou espace *ACMP*, contenu par la partie *AP* (*x*) d'une ligne droite infinie & perpendiculaire à l'axe de l'hyperbole, par la ligne *AC*, (*a*) continuation du même axe, & par une ligne quelconque ou ordonnée *PM* (*y*) parallèle à *AC*.

Ici $aa+xx=yy$; donc $y=\sqrt{aa+xx}$ & $ydx=dx$ Fig. 9.
 $\sqrt{aa+xx}$, différentielle dont, suivant le troisième cas, section première, l'intégrale $=ax+\frac{x^3}{6a}-\frac{x^5}{40a^3}+\frac{x^7}{112a^5}-\frac{5x^9}{1152a^7}$ &c. = à l'aire *ACMP* cherchée, qui donne la quadrature du segment hyperbolique *DCM*, en le soustrayant du rectangle *ADMP* (ydx); & si $a=1$; alors la série est $x+\frac{x^3}{6}-\frac{x^5}{40}+\frac{x^7}{112}-\frac{5x^9}{1152}$, &c.

Autrement.

Par la mesure d'un rapport ou d'un angle.

La différentielle $dx\sqrt{aa+xx}$ se rapporte à la quatrième forme des Tables de M. *Cotes*: Car si $z=x$, $u=z$, $\theta=0$, $D=1$, $e=aa$, $f=1$, vous aurez $Dz \frac{dz\sqrt{e+fz^2}}{19+\frac{1}{2}z^2-1} = dx\sqrt{aa+xx}$, dont l'intégrale est $\frac{z^2}{9}DP+\frac{z}{9}DR \Big|_{\frac{R+T}{S}}$; & faisant $P(=\frac{\sqrt{e+fz^2}}{z^2})=\frac{1}{x}\sqrt{aa+xx}$, $R(=\sqrt{f})=1$, $T(=\frac{\sqrt{e+fz^2}}{z^2})=\frac{1}{x}\sqrt{aa+xx}$, $S(=\frac{z^2}{e})=\frac{a}{x}$. Alors l'intégrale deviendra $\frac{x}{2}\sqrt{aa+xx}+\frac{aa}{2} \Big|_{\frac{x+\sqrt{aa+xx}}{a}} = \frac{1}{2}AP \times PC + \frac{1}{2}AC \Big|_{\frac{AP+PC}{AC}} =$, à l'aire *ACPM*; c'est-à-dire, $\frac{1}{2}AP \times PC$ plus la mesure du rapport de $AP+PC$, &c de *AC* à $\frac{1}{2}AC$, comme module, sera l'aire.

La quadrature de l'espace hyperbolique *AMP* peut se trouver comme M. *Cotes* le dit dans son *harmonia mensurarum* de cette façon.

Fig. 10.

Faites le demi-diamètre conjugué $CB=b$, le demi-transverse $CA=a$, $CF=x$, $PM=y$; ensuite par la propriété de la courbe on a $\frac{b}{a} \sqrt{xx-aa} = y$, ainsi $\frac{b}{a} dx \sqrt{xx-aa} =$ à l'élément de l'espace AMP .

Maintenant faisant $D = \frac{b}{a}$, $x=x$, $\theta=0$, $r=2$, $e=-aa$, $f=1$, la différentielle de la quatrième forme dans les Tables de M. Cotes, par exemple, $Dz \sqrt{e+fx^r}$ deviendra $\frac{b}{a} dx \sqrt{xx-aa}$, & son intégrale qui répond à $\theta=0$, donnera $\frac{x^2}{2} Df + \frac{e}{f} DR \Big|_{\frac{R+1}{S}}$, & faisant $P (= \sqrt{\frac{e+fx^r}{x^2}}) = \frac{1}{x} \sqrt{xx-aa}$, $R (=f)=1$, $T (= \sqrt{\frac{e+fx^r}{x^2}})$ $= \frac{1}{x} \sqrt{xx-aa}$, $S (= \sqrt{\frac{e}{x^2}}) = \frac{a}{x}$; cette intégrale viendra, $\frac{bx}{2a} \sqrt{xx-aa} - \frac{ab}{2} \Big|_{\frac{x-\sqrt{xx-aa}}{a}} = \frac{xy}{2} - \frac{ab}{2} \Big|_{\frac{x-\frac{ay}{b}}{a}}$, en sub-

stituant pour y sa valeur $\frac{b}{a} \sqrt{xx-aa}$. Et par l'article quatorzième, quand le rapport de $x + \sqrt{xx-aa}$ à a , est égal au rapport de a , à $x - \sqrt{xx-aa} =$ à $x - \frac{ay}{b}$; c'est pourquoi $\frac{xy}{2} - \frac{ab}{2} \Big|_{\frac{x-\frac{ay}{b}}{a}}$, est l'intégrale de la

différentielle $\frac{b}{a} dx \sqrt{xx-aa}$ qu'on peut construire ainsi.

Faites $CF : CA (a) :: PM (y) : CB (b)$; c'est-à-dire, faites $CF = \frac{ay}{b}$; faites ensuite $CG : CA (a) :: CB (b) : PM (y)$, c'est-à-dire, $CG = \frac{ab}{y}$; ensuite si CH , est pris égal au rapport de $CA (a)$ & $FP (= x - \frac{ay}{b})$ au module $\frac{ab}{y}$, c'est-à-dire, si on prend $CH = \frac{ab}{y} \Big|_{\frac{x-\frac{ay}{b}}{a}}$, & tirant la ligne droite MH , le triangle rectiligne HMP est égal à l'espace AMP . Car il est $= \frac{y}{2} \times x - \frac{ab}{y} \Big|_{\frac{x-\frac{ay}{b}}{a}} = \frac{yx}{2} - \frac{ab}{2} \Big|_{\frac{x-\frac{ay}{b}}{a}}$; ainsi pour trou-

ver

DES INFINIMENT PETITS. 49

ver la quadrature de l'espace hyperbolique extérieure *CAMP*, Fig. 11.
de la même manière, il faut s'y prendre ainsi.

Que *AC*, *CB*, soient les deux demi-diamètres conjugués
AC=a, *CB=b*, *PM=x*, *CF=y*; ce qui donne $\frac{b}{a} \sqrt{xx-aa}$
 $=y$, par la propriété de la courbe.

Differentiant cette équation, vous aurez $\frac{bx}{ay} dx = dy =$
 $\frac{b^2x}{a^2\sqrt{xx-aa}} dx = \frac{bx}{a\sqrt{xx-aa}} dx$; mais $dy \times x = \frac{bx^2}{a\sqrt{xx-aa}} dx$
 $=$ à l'élément de l'espace hyperbolique *CAMP*.

Maintenant faisant $D = \frac{b}{a}$, $z=x$, $z=1$, $\theta=1$, $e=$
 $-aa$, $f=1$; la différentielle $\frac{Dz^{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}e-1}}{\sqrt{1-fz^2}} dz$ de la sixième
forme dans les tables, deviendra $\frac{bx^2}{a\sqrt{xx-aa}} dx$, dont l'inté-
grale θ étant $=1$, donne $\frac{z^2}{f} DP - \frac{e}{f} DR \Big|_{\frac{R}{S}}$: d'où
faisant $P (= \sqrt{\frac{e+fz^2}{z^2}}) = \frac{1}{x} \sqrt{xx-aa}$, $R (= \sqrt{f}) = 1$,
 $T (= \sqrt{\frac{e+fz^2}{z^2}}) = \frac{1}{x} \sqrt{xx-aa}$, $S (= \sqrt{\frac{e}{z^2}}) = \frac{a}{x}$;
ladite intégrale fera $\frac{bx}{2a} \sqrt{xx-aa} - \frac{ab}{2} \Big|_{\frac{x+\sqrt{xx-aa}}{a}} = \frac{ay}{2} +$
 $\frac{ab}{2} \Big|_{\frac{a}{x-\frac{ay}{b}}}$, (substituant y pour $\frac{b}{a} \sqrt{xx-aa}$, art. 14.) $=$

à l'intégrale de la différentielle $\frac{bx^2}{a\sqrt{xx-aa}} dx$ qu'on peut con-
struire de cette manière.

Prenez $CF : CB (b) :: PM (x) : AC (a)$; c'est-à-dire, fai-
tes $CF = \frac{bx}{a}$; & $CG : CB (b) :: AC (a) : PM (x)$; ou ce qui
est le même $CG = \frac{bx}{x}$; ensuite si vous prenez *CH* égal à la
mesure du rapport de *BC (b)* & *PF* ($\frac{bx}{a} - y$), (égal
au rapport de *a*, à $x - \frac{ay}{b}$), au module CG ($\frac{bx}{x}$): le même
CH fera $= \frac{ba}{x} \Big|_{\frac{a}{x-\frac{ay}{b}}}$, & si vous tirez la ligne droite *MH*, le

G

triangle rectiligne est égal à l'espace $CAMP$: car il est =
 $\frac{x}{2} \times y + \frac{by}{x} \left| \frac{a}{x - \frac{ay}{b}} \right| = \frac{xy}{2} + \frac{by}{2} \left| \frac{a}{x - \frac{ay}{b}} \right|$, intégrale de la diffé-
 rentielle donné.

E X E M P L E X.

27. *Quarrer le cercle ; ou , ce qui est la même chose ,
 trouver l'aire d'un demi segment quelconque
 APM , de ce cercle.*

Fig. 12. Que $AB=1$, $AP=x$, $PM=y$. Par la propriété du cercle
 $AP \times PB = PM^2$; c'est-à-dire, $x - xx = yy$; donc $y =$
 $\sqrt{x - xx}$ & $y dx = dx \sqrt{x - xx} = PM \times Pp$, égal à l'élément
 de l'aire APM ; dont , par le troisième cas , section pre-
 mière , l'intégrale sera $\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{5} x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{28} x^{\frac{7}{2}} - \frac{1}{72}$
 $x^{\frac{9}{2}}$, &c. = à l'aire AMP , ou bien $x^{\frac{1}{2}} \times \frac{1}{3} x^2 -$
 $\frac{1}{5} x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{28} x^{\frac{7}{2}} - \frac{1}{72} x^{\frac{9}{2}}$, &c.

Autrement.

Si le rayon $CM=a$, & qu'on suppose $CF=x$, $PM=y$;
 par la propriété du cercle $CM = CP + PM$; c'est-à-dire,
 $aa = xx + yy$, $yy = aa - xx$, & $y = \sqrt{aa - xx}$; donc $y dx =$
 $dx \sqrt{aa - xx}$, qui sera l'élément de l'espace indéterminé
 $PMDC$, dont l'intégrale $ax - \frac{x^2}{6a} - \frac{x^3}{40a^2} - \frac{x^5}{112a^3} - \frac{5x^7}{1152a^4}$
 &c. est = à l'aire $PMDC$.

Maintenant si on suppose $a=1=x$, alors cette série de-
 viendra $1 - \frac{1}{6} - \frac{1}{40} - \frac{1}{112} - \frac{5}{1152}$, &c. = à l'aire du
 quart du cercle ADC ; & en le quadruplant vous aurez la
 quadrature de tout le cercle entier $ADBA$; ou si le diamètre
 est 1, la même série exprimera l'aire de tout le cercle.

Autrement.

Que AE , tangente de la moitié de l'arc AM , soit $=x$ le rayon $AC=1$: que AB , soit la tangente de l'arc AM . Tirez les sécantes CE , CB , & le sinus MP de l'arc AM : que pm , soit infiniment proche de PM , & du centre C , tirez la sécante Cb par le point m ; & du point M , tirez aussi la perpendiculaire Mt à pm , & tirez du point B perpendiculaire à Cb , la ligne Bt .

Fig. 13.

Comme on propose ici de trouver l'aire du secteur indéfini ACM , dont l'élément qui est le petit secteur MCm , doit premièrement être trouvé de la manière suivante :

Premièrement, la tangente AB de l'arc BM , sera $\frac{2x}{1-x^2}$; alors parce que l'angle ACB , est partagé en deux également par la ligne CE , on aura $AE(x) : AC(1) :: EB(\frac{x+x'}{1-x^2}) : CB = \frac{1+x'}{1-x^2}$. De même, à cause des triangles semblables, ACB , PCM ; $CB(\frac{1+x^2}{1-x^2}) : AB(\frac{2x}{1-x^2}) :: AC(1) : PM = \frac{2x}{1+x^2}$, & $CB(\frac{1+x^2}{1-x^2}) : AC(1) :: CM(1) : CP = \frac{1-x^2}{1-x^2}$, d'où on tire $AP = \frac{2x^3}{1+x^2}$; dont la différentielle est $\frac{4xdx}{1+x^2}$;

Pp , ou Mt .

De plus le petit triangle Mmt , rectangle en t , est semblable au triangle rectangle CMP , l'angle tMm étant égal à l'angle PMC , & l'angle tmM égal à l'angle PCM , comme il est facile de le prouver. Ainsi $MP(\frac{2x}{1+x^2}) : AC(1) ::$

$Mt(\frac{4xdx}{1+x^2}) : Mm = \frac{2dx}{1+x^2}$. Ainsi $\frac{1}{2} MC(1) \times Mm =$

$\frac{dx}{1+x^2}$ = à l'aire du petit secteur MCm , étant l'élément du se-

cteur AMC dont l'intégrale sera $x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \frac{1}{9}x^9$, &c. = à l'aire du secteur indéterminé AMC .

Quand la tangente $AE(x)$ de la moitié de l'arc AM , devient $=1$ = au rayon, alors le secteur ACM deviendra un quart de cercle ; & la série précédente qui en exprimoit

l'aire, sera $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{15} + \frac{1}{17} - \frac{1}{19}$, &c. & quand le diamètre du cercle = 1, l'aire entier du cercle sera exprimé par cette serie.

On trouve plus brièvement cette même serie de la manière suivante.

Si $AB = x$, alors $Eb = dx$, & $CB = \sqrt{1 - xx}$. Or le petit triangle BSb , droit en S , est semblable au triangle ABC , l'angle ABC ne différant de l'angle b , que d'un infiniment petit seulement; ainsi ils sont sensés égaux; donc $CB (\sqrt{1 - xx}) : AC (1) :: Bb (dx) : Bs = \frac{dx}{\sqrt{1 - xx}}$. De plus, parce que Bs est infiniment petit, CB & Cs , ne diffèrent entr'eux que d'un infiniment petit seulement; ainsi $CB (\sqrt{1 - xx}) : Bs (\frac{dx}{\sqrt{1 - xx}}) :: MC (1) : Mm = \frac{dx}{1 - xx}$; d'où

l'on tire le petit secteur $MCm = \frac{dx}{1 - xx} =$ à l'élément de l'aire du secteur AMC ; dont l'intégrale est $\frac{1}{2} x - \frac{1}{6} x^3 + \frac{1}{10} x^5 - \frac{1}{14} x^7 + \frac{1}{18} x^9$, &c. = à l'aire dudit secteur; de manière que quand le secteur ACM , est la huitième partie du cercle; par exemple, quand la tangente AB , (x) est = au rayon $AC = 1$; alors la même serie sera $\frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{10} - \frac{1}{14} + \frac{1}{18}$, &c. qui étant doublée donnera $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{15} + \frac{1}{17} - \frac{1}{19}$, &c. = à l'aire du quart du cercle, comme ci-devant.

E X E M P L E X I.

28. *Quarrer l'espace elliptique; ou, ce qui est la même chose, trouver l'aire d'un segment elliptique indéterminé $ACMP$, compris par le demi-diamètre conjugué AC , l'ordonnée PM , la partie de l'abscisse AP , & la partie de l'ellipse CM .*

Fig. 24. Nommez AC , a , AB , ou AD , b , AP , x , PM , y ; ensuite par la propriété de l'ellipse on aura $MP = \frac{b^2}{a^2} x$

$\overline{AB} - \overline{AP}$, ou ce qui est la même chose, $yy = \frac{bb \times aa - xx}{aa}$;
 donc $y = \frac{b}{a} \sqrt{aa - xx}$. Par conséquent $\frac{b}{a} dx \sqrt{aa - xx}$
 fera l'élément de l'espace $ACPM$, & son integrale sera
 $bx - \frac{bx^3}{6a^3} - \frac{bx^5}{40a^5} - \frac{bx^7}{112a^7}$, &c. = à l'aire $ACPM$.

Maintenant si vous substituez a pour x dans cette serie ,
 vous aurez $ab - \frac{1}{6} ab - \frac{1}{40} ab - \frac{1}{112} ab$, &c. = à l'aire du
 quart ACD de l'ellipse ; & si A est = à l'axe BD , alors cette
 dernière serie exprimera l'aire de toute l'ellipse, & si $\sqrt{aa} = 1$,
 on aura pour l'aire de l'ellipse $1 - \frac{1}{6} - \frac{1}{40} - \frac{1}{112} - \frac{1}{1152}$,
 &c. Ainsi une ellipse est égale à un cercle dont le diamètre
 est moyen proportionnel entre ses deux diamètres conjugués.
 Donc une ellipse est à un cercle, ayant pour diamètre le grand
 axe de l'ellipse, comme ab à a^2 , ou comme b à a , par
 exemple, comme le petit axe est au grand.

Autrement.

29. Trouver l'aire d'un secteur quelconque CAM , d'une ellipse.

Que CB soit le demi-diamètre conjugué, & CA la moitié Fig. 15.
 de son grand diamètre, MP , une demi-ordonnée :

Maintenant tirez mp infiniment proche de MP , joignez
 les points C, M & m , par les lignes droites CM, Cm ; & de m ,
 tirez la petite ligne mH , perpendiculaire à MP , coupant
 MP en I , CM en H , & la petite ligne mK , perpendiculaire
 à la ligne CM prolongée.

Cela fait que $AC = a$, $BC = 1$, $AP = x$, $PM (y) CM$
 $= u$ & $CP = z$.

Or la première chose qu'il faut trouver est l'aire du pe-
 tit triangle CMm . Parce que les triangles CPM, HIM , sont
 semblables ; on aura $PM (y) : CP (z) :: MI (dy) : IH =$
 $\frac{xdy}{y}$; d'où on tire (à cause que $Pp = Im = dx = -dz$)
 $Hm = \frac{xdy}{y} - dz$. De plus, à cause des triangles semblables
 CMp, HKM ; $CM (u) : PM (y) :: Hm (\frac{xdy}{y} - dz) :$

$mK = \frac{x dy - y dx}{a}$, qui multiplié par la moitié de la base CM (n) ; alors l'aire du triangle différentielle Cmm , sera $= \frac{x dy - y dx}{2}$; & prenant la différence de l'équation de la courbe $\frac{ax - x^2}{aa} = yy$, on aura $-\frac{dx}{ay} = dy$. Substituant cette valeur de dy dans $\frac{x dy - y dx}{2}$, on aura $\frac{-x dx}{2ay} - \frac{y dx}{2} = \frac{-x dx - ayy dx}{2aay}$, & substituant dans cette dernière expression pour ayy , sa valeur $aa - x^2$, il viendra $-\frac{x dx - aadx + x^2 dx}{2aay}$
 $= \frac{-x dx}{2ay} = \frac{adx}{2ay}$; puisque $dx = -dz$: de plus substituant

Fig. 16.

$\sqrt{2ax - xx}$ pour ay ; le triangle Cmm sera $= \frac{adx}{2\sqrt{2ax - xx}}$
 $=$ à l'élément du secteur ACM , de l'ellipse. Et si vous faites $\sqrt{2ax - xx} = \frac{n}{x}$; alors $x = \frac{2ann}{1 + nn}$, & $dx = \frac{4andn}{1 + nn^2}$, & toutes substitutions faites on trouvera $\frac{adx}{2\sqrt{2ax - xx}} = \frac{adn}{1 + n^2/n}$, dont l'intégrale est $an - \frac{an^3}{3} + \frac{an^5}{5} - \frac{an^7}{7}$, &c. $=$ au secteur de l'ellipse.

Vous trouverez de la même manière que le secteur de l'hyperbole, (figure 16,) est $an + \frac{an^3}{3} + \frac{an^5}{5} + \frac{an^7}{7}$, &c. & le secteur du cercle sera $= n - \frac{n^3}{3} + \frac{n^5}{5} - \frac{n^7}{7}$, &c. qui devient $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7}$, &c. faisant $n=1$.

On peut résoudre ceci plus brièvement de la manière suivante.

Fig. 17.

Tirez la tangente AD , & continuez CM jusqu'à ce qu'elle coupe la même en D : tirez Cd , infiniment proche de CD , de C , décrivez les petits arcs Mn , De ; faites $CE=b$, $CA=s$, $AD=x$, $CD=y$, $CP=z$, à cause de la similitude des triangles CAD , De ; l'angle A différant seulement de l'angle D d'un infiniment petit, qu'on peut par conséquent négliger, & les angles en e , & en A , étant droits ; on aura $CD(y) : AC(s) :: Dd(dx) : DE = \frac{adx}{y}$; & par la simili-

DES INFINIMENT PETITS. 55

rude des triangles CPM , CAD ; $AC(a) : CD(y) :: CP(z) : CM = \frac{yz}{a}$, par la même raison les secteurs CDe , CMn , étant semblables, $CD(y) : De(\frac{adx}{y}) :: CM(\frac{yz}{a}) : Mn = \frac{zdx}{y}$; or $\frac{1}{2} CM \times Mn$; c'est-à-dire, $\frac{zdx}{2y} \times \frac{yz}{a} = \frac{zxdx}{2a} =$ à l'aire du triangle CMm , étant l'élément du secteur CAM .

De plus, par la nature de la courbe & la similitude des triangles CPM , CAD , dans l'ellipse, on aura $PM(\frac{b}{a} \sqrt{aa-zz}) : CP(z) :: AD(x) : AC(a)$; & dans l'hyperbole $PM(\frac{b}{a} \sqrt{-aa+zz}) : CP(z) :: AD(x) : AC(a)$, & multipliant les moyens & les extrêmes, on aura $zx = b \sqrt{aa+zz}$, dans l'ellipse, & $zx = b \sqrt{-aa+zz}$ dans l'hyperbole; par conséquent $zx = \frac{abbb}{bb+xx}$ dans l'ellipse, & $zx = \frac{abbb}{bb-xx}$ dans l'hyperbole, qui étant substitué dans $\frac{zxdx}{2a}$, donnera $\frac{abbdx}{2bb+2xx}$ dans l'ellipse, & $\frac{abbdx}{2bb-2xx}$ dans l'hyperbole = à l'élément de l'aire du secteur CAM , dont l'intégrale fera $\frac{ax}{2} - \frac{ax^3}{6bb} + \frac{ax^5}{10b^3} - \frac{ax^7}{14b^5}$, &c. dans l'ellipse, & $\frac{ax}{2} - \frac{ax^3}{6bb} + \frac{ax^5}{10b^3} - \frac{ax^7}{14b^5}$, &c. dans l'hyperbole = à l'aire du secteur CAM ; & faisant $CB(b) = 1$, la même intégrale se changera en celle-ci $\frac{1}{2} ax - \frac{1}{6} ax^3 + \frac{1}{10} ax^5 - \frac{1}{14} ax^7$, &c. dans l'ellipse, & $\frac{1}{2} ax - \frac{1}{6} ax^3 - \frac{1}{10} ax^5 - \frac{1}{14} ax^7$, &c. dans l'hyperbole. Dans l'ellipse si $x=b$, l'aire du secteur CAM , sera $\frac{1}{2} ab - \frac{1}{6} ab + \frac{1}{10} ab - \frac{1}{14} ab$, &c. & quand $x=a$, l'aire du secteur CEM , sera de même $= \frac{1}{2} ab - \frac{1}{6} ab + \frac{1}{10} ab - \frac{1}{14} ab$, &c. dont la somme, par exemple, $ab - \frac{1}{3} ab + \frac{1}{5} ab - \frac{1}{7} ab$, &c. sera l'aire du quart de l'ellipse ABC .

COROLLAIRE.

Il suit que si $a=b$, par exemple, quand l'ellipse est à un cercle; l'aire de ce quart de cercle, dont le rayon est a , sera $aa - \frac{1}{3}aa + \frac{1}{5}aa - \frac{1}{7}aa$, &c. & si $a=1$, l'aire de ce quart de cercle sera $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11}$, &c.

On peut trouver l'intégrale de l'élément $\frac{abbdz}{zbb-xx}$ du secteur hyperbolique en la mesure d'un rapport, en la rapportant à la seconde forme dans les Tables de M. Cotes; car faisant $z=x$, $D=abb$, $\theta=0$, $\psi=2$, $e=2bb$, $f=-2$, la différentielle dans la seconde forme $\frac{Dz}{e+zf^2} dz = \frac{abbdz}{zbb-xx}$, & son intégrale répondant dans les Tables à $\theta=0$, est $\frac{1}{\psi} DR \left| \frac{R+\tau}{S} \right|$. Or $R (= \sqrt{\frac{e}{f}}) = b$, $\tau (= z^{\frac{1}{\psi}}) = x$, & $S (= \sqrt{\frac{e+fz}{f}}) = \sqrt{bb-xx}$, d'où $\frac{1}{\psi} DR \left| \frac{R+\tau}{S} \right| = \frac{1}{2} ab \left| \frac{b+x}{\sqrt{bb-xx}} \right| = \frac{1}{2} AC \times CB \left| \frac{CB+AD}{\sqrt{CB^2-AD^2}} \right|$; c'est-à-dire que l'aire du secteur hyperbolique CAM , est égal à la mesure du rapport de $CB+AD$, à $\sqrt{CB^2-AD^2}$ le triangle ACB en étant le module.

EXEMPLE X I.

30. *Quarrer l'espace AMP , appelé la figure des tangentes.*

La propriété de cette figure est telle, qu'une abscisse quelconque AP , est égale à un arc quelconque (AP) d'un cercle, & l'ordonnée correspondante PM , qui la coupe à angles droits, est égal à la tangente correspondante AT de cet arc.

Fig. 19. 10. Tirez la sécante CT , & la sécante Ct infiniment proche de la première; & de C , comme centre, & de l'intervalle CT ,

DES INFINIMENT PETITS. 57

CT , décrivez le petit arc Tc . Faites le rayon $AC=a$, l'arc AP ($=$ à l'abscisse AP) $=x$, & la tangente correspondante AT ($=$ à l'ordonnée correspondante pM) $=y$. Maintenant à cause que les triangles ATC , Ttc , sont semblables, les angles T, t , ne différant entr'eux que d'un angle infiniment petit seulement, & les angles en A & en C , étant droits; on aura $TC (\sqrt{aa+yy}) : AC (a) :: Tt (dy) : Tc = \frac{ady}{\sqrt{aa+yy}}$.

De plus, à cause des triangles semblables CPp , CTc , on aura $CT (\sqrt{aa+yy}) : Tc (\frac{ady}{\sqrt{aa+yy}}) :: CP (a) : Pp (=dx)$; multipliant les extrêmes & les moyens, on aura $dx \sqrt{aa+yy} = \frac{aady}{\sqrt{aa+yy}}$; & divisant par $\sqrt{aa+yy}$, on aura $dx = \frac{aady}{aa+yy}$ $=$ à la différentielle de l'abscisse Ap ; & multipliant par y , on aura $ydx = \frac{aaydy}{aa+yy}$ $=$ à l'élément de l'espace AMP ; dont l'intégrale fera $yy - \frac{y^3}{4a^2} + \frac{y^5}{6a^4} - \frac{y^7}{8a^6} + \dots =$ à l'aire cherchée.

Autrement.

Par la mesure d'un rapport.

La différentielle $\frac{aaydy}{aa+yy}$ peut être comparée à la première forme des Tables de M. Costes : car si $z=y$, $n=2$, $\theta=1$, $D=aa$, $e=aa$, $f=1$; la première forme qui est $\frac{Dz^{n-1}}{e+fx^2} dz$ sera $= \frac{aaydy}{aa+yy}$ & l'intégrale, répondant à $\theta=1$, sera $\frac{D}{f} \left| \frac{e+fx^2}{e} \right|$ $= \frac{1}{2} aa \left| \frac{aa+yy}{aa} \right| = \frac{1}{2} AC \left| \frac{CT}{AC} \right|$, qui est égal à $AC \left| \frac{CT}{AC} \right|$.

Car mettant $2l$ pour le logarithme du rapport de $\frac{CT}{AC}$, & m , pour le module des logarithmes; on aura $\frac{1}{2} AC \left| \frac{CT}{AC} \right|$ $(*) = \frac{1}{2} AC^2 \times \frac{1}{m} = AC^2 \times \frac{1}{m}$. Mais par la nature

* art. 11.

H

des logarithmes, l est égale au logarithme du rapport $\frac{CT}{AC}$;

art. 11. ainsi $\overline{AC}^2 \times \frac{l}{m}$ est (*) = $\overline{AC}^2 \left| \frac{CT}{AC} \right| = \frac{1}{2} \overline{AC}^2 \left| \frac{CT}{AC} \right|^2$: c'est pour-
quoi l'aire ApM , est égal à la mesure du rapport de la secante
 CT , de l'arc $AP=Ap$, au rayon AC , ayant le carré du
rayon pour module.

EXEMPLE XIII.

31. *Quarrer l'espace $ABpM$, appelé la figure des secantes.*

Fig. 21. On fait ici l'abscisse Ap , égale à l'arc AP , comme dans
l'exemple précédent ; mais l'ordonnée correspondante pM ,
est égale à la secante CT , & l'ordonnée $AB=$ au rayon AC ,
tout le reste étant de même que dans l'exemple précédent
seulement que CT soit $=y$. Ensuite par la similitude des
triangles ACT , Ttc , on aura $AT (\sqrt{yy-aa}) : AC (a) ::$
 $tc (dy) : Tc = \frac{ady}{\sqrt{yy-aa}}$; & à cause des secteurs sembla-
bles CTc , CPp , on aura $CT (y) : Tc (\frac{ady}{\sqrt{yy-aa}}) :: CP (a) :$
 $Pp (dx)$, & multipliant les extrêmes & les moyens, il vien-
dra $y dx = \frac{ady}{\sqrt{yy-aa}} =$ à l'élément de l'espace $ABMp$; & son
intégrale se trouvera facilement par la mesure du rapport,
pouvant être réduite à la sixième forme des Tables de M.
Cotes ; car faisant $z=y$, $n=2$, $\theta=0$, $D=aa$, $e=-aa$,

$f=1$, on aura $\frac{Dz^{\theta+1} - 1}{\sqrt{e+fx^2}} dz = \frac{ady}{\sqrt{-aa+yy}}$. De même dans

cette forme $R(=\sqrt{f})=1$, $T(=\frac{fz^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{e+fx^2}})=\frac{y}{\sqrt{-aa+yy}}$,

& $S(=\sqrt{\frac{-ef}{e+fx^2}})=\frac{a}{\sqrt{-aa+yy}}$; d'où l'intégrale (θ étant

$=0$) $\frac{1}{2} DR \left| \frac{R+T}{S} \right|$, sera $aa \left| \frac{1+\sqrt{-aa+yy}}{a} \right| = \overline{AC}^2$
 $\left| \frac{CT+AT}{AC} \right|$.

DES INFINIMENT PETITS. 59

Par conséquent l'aire de l'espace $ABMp$, est égale à la mesure du rapport de la somme de la tangente & secante du même arc, & du rayon au carré du rayon comme module.

COROLLAIRE.

On peut calculer par ce moyen dans les Cartes de *Mer-cator*, les parties méridionales pour une latitude donnée quelconque AP . Il est bien démontré, (*) que les parties méridionales d'une latitude quelconque AP , sont à la longueur de l'arc AP , comme la somme des secantes de ces parties méridionales, est à la somme d'autant de demi-diamètres; c'est-à-dire, comme l'espace curviligne $ABMp$, est au rectangle de $BA \times pA$; ou comme $AC \left| \frac{CT+AT}{AC} \right|$ est à $AG \times AP$; ou, comme $AC \left| \frac{CT+AT}{AC} \right|$, est à AP . D'où il suit que les parties méridionales sont égales à $AC \left| \frac{CT+AT}{AC} \right|$ (*), ou $AC \left| \frac{AC}{CT-AT} \right|$.

* V. les Trans-
saits. Philosoph.
de Londres, n.
176.

* art. 14.

EXEMPLE XIV.

32. Trouver l'aire de l'espace $CPQc$, contenu sous les parties des conchoïdes de Nicomede CPD , cqd , la partie Cc , de la ligne droite AC tirée du pôle A , perpendiculaire à l'asymptote commune BG , & la partie Qp d'une ligne droite quelconque tirée du même pôle A , comprise entre les deux courbes.

Que $Ac = a$, $cB = CB = b$, $cC = 2b$, $AB = c$, $AG = y$, $BG = x$. Tirez Ap infiniment proche de AP ; & de A , comme centre, décrivez les petits arcs concentriques qs , mr , pn . Maintenant par la propriété de ces courbes BC , ou Bc , $= GP$, (pm) ou GQ (mq): parce que les triangles AGB , rGm , sont semblables, l'angle en G étant commun, & les angles en r & en B étant droits, (l'arc rm , pouvant être pris pour une ligne droite) on aura $AG(y) : AB(c) :: GM(dx) : rm = \frac{dx}{y}$. De plus, à cause des secteurs semblables

Fig. 22.

H ij

Arm, *Asq*, on aura $Am = AG(y) : rm(\frac{cdx}{y}) :: Aq = A\mathcal{Q} = AG - A\mathcal{Q}(y-b) : sq = \frac{cydx - cbdx}{y}$, & de même les seconds semblables *Arm*, *Anp*; donneront $AG(y) : rm(\frac{cdx}{y}) :: AP(y+b) : pn = \frac{cydx + cbdx}{y}$; par conséquent $pn + qs = \frac{2cdx}{y}$; ainsi $\frac{1}{x} pn + qs = p\mathcal{Q} = \frac{2cbdx}{y} =$ à l'aire du petit espace *sppq*, = à l'espace $\mathcal{Q}ppq =$ à l'élément de l'espace *CPQ*: & substituant $\sqrt{cc+xx}$ pour y , la différentielle sera $\frac{2cbdx}{\sqrt{cc+xx}}$, qui convient à la sixième forme des Tables de M. *Cotes*: car faisant $D = 2cb$, $z = x$, $\theta = 0$, $n = 2$, $e = cc$, $f = 1$, ladite sixième forme $\frac{Dz^{(n+\frac{1}{2}e-1)}}{\sqrt{e+fz^n}} dz$, deviendra $\frac{2cbdx}{\sqrt{cc+xx}}$, dont l'intégrale (θ étant $= 0$) sera $\frac{1}{f} DR \left| \frac{R+T}{S} \right.$: & faisant $R(=\sqrt{f}) = 1$, $T(=\sqrt{\frac{e+fz^n}{z}}) = \frac{x}{x}$, $\sqrt{cc+xx}$, & $S(=\sqrt{\frac{e}{z^n}}) = \frac{c}{x}$, la même intégrale deviendra $2bc \left| \frac{x+\sqrt{cc+xx}}{c} \right.$ = à l'intégrale de la différentielle donnéé égale à l'aire de l'espace *CPQ* = $Bc \times AB \left| \frac{BG+AG}{AB} \right.$, c'est-à-dire, que l'aire dudit espace est égale au rectangle de *Bc*, & de la mesure du rapport de *BG* + *AG*, & *AB* au module *AB*.

Mais pour trouver l'aire de l'espace CPGB, contenu par la partie PC, d'une des conchoïdes de Nicomède, BE étant l'asymptote, A le pôle, & ABC perpendiculaire à BE.

Fig. 23. Nommez *AB*, *a*, *BC*, *b*, *AG*, *y*, *AB*, *x*: tirez *Ap*, infiniment proche de *AP*, & de *A* décrivez les petits arcs *mr*, *pn*; ensuite raisonnant comme ci-dessus, on aura $\frac{abbdx}{2aa+xx} + \frac{abdx}{\sqrt{aa+xx}} =$ à l'aire du petit espace *GPpm* = à l'élément de l'espace *CPGB*. La première partie de cette différentielle se réduit à la seconde forme des Tables de M. *Cotes*,

cat faifant $D=abb$, $z=x$, $\theta=0$, $n=2$, $e=2aa$, $f=2$;

la différentielle de cette feconde forme qui eft $\frac{Dz}{\frac{e+fz^2}{2aa+1xz}}$

dz , deviendra $\frac{abdz}{2aa+1xz}$; dont l'integrale fera $\frac{2}{a} DR \Big|_{\frac{R-T}{S}}$;

dans laquelle fubftituant pour $R (= \sqrt{\frac{e+fz^2}{f}})$ $\sqrt{aa}$, pour

$T (= z^{\frac{1}{2}}) x$, & pour $S (= \sqrt{\frac{e+fz^2}{f}})$ $\sqrt{aa+xx}$, on

aura $\frac{1}{2} bb \Big|_{\sqrt{aa+xx}}$ pour l'integrale de la premiere partie

$\frac{abdz}{2aa+1xz}$; de même la feconde partie de la différentielle,

qui eft $\frac{abdz}{\sqrt{aa+xx}}$, peut fe comparer à la fixième forme des

Tables de M. *Cotes*, en faifant $D=ab$, $z=x$, $\theta=0$, $n=2$,

$e=aa$, $f=1$; dont l'integrale eft (θ étant $=0$) $\frac{1}{f} DR$

$\Big|_{\frac{R-T}{S}}$, laquelle faifant $R=1$, $T=\frac{1}{x} \sqrt{aa+xx}$, & $S=$

$\frac{a}{x}$, deviendra $ab \Big|_{\frac{x+\sqrt{aa+xx}}{a}}$. Ainfi la fomme de ces in-

tegrales $\frac{1}{2} bb \Big|_{\sqrt{aa+xx}} + ab \Big|_{\frac{x+\sqrt{aa+xx}}{a}}$ fera l'integrale de

toute la différentielle ; confiftant en deux parties , dont la

premiere eft la mefure d'un angle quelconque , parce que

$R=\sqrt{aa}$; & la feconde celle d'un raport , à caufe que

$R=\sqrt{1}=1$.

La conftruétion de cette integrale peut fe faire ainfi : ti-

rez CF , perpendiculaire à AC , prenez BH , égale à la me-

fure du raport de $BG+AG$, & AB à AB pris pour module,

c'eft-à-dire, faites $BH=a \Big|_{\frac{x+\sqrt{aa+xx}}{a}}$.

De plus prenez BI , égale à la mefure de l'angle GAB ,

au même module AB , c'eft-à-dire $=a \Big|_{\sqrt{aa+xx}}$, dont le

rayon, tangente & fecante, font toujours comme a , x , &

$\sqrt{aa+xx}$, ou comme AB , BG , AG . Cela fait, tirez AIE ,

& HD , parallele ; vous aurez par-là le trapeze $BHDC$, égal

à toute l'integrale, & par conféquent égal à l'efpace $CPGB$:

Fig. 24.

car puisque les triangles ABH , ACD , sont semblables, on aura $AB(a) : BI(a \sqrt{\frac{a+x}{aa+xx}}) :: AC(a+b) : CE= a \sqrt{\frac{a+x}{aa+xx}} + b \sqrt{\frac{a+x}{aa+xx}}$; & $\frac{CE+IB}{1} \times BC = \frac{ab}{1} \sqrt{\frac{a+x}{aa+xx}} + \frac{bb}{2} \sqrt{\frac{a+x}{aa+xx}} =$ au trapeze $BIEC$. De plus, $HI (= BH - BI) = a \sqrt{\frac{x+\sqrt{aa+xx}}{a}} - a \sqrt{\frac{a+x}{aa+xx}}$; qui multiplié par $BC(b)$, & le produit $ab \sqrt{\frac{x+\sqrt{aa+xx}}{a}} - ab \sqrt{\frac{a+x}{aa+xx}}$ (= au parallelograme $HDEI$) qui étant ajouté au trapeze $BIEC$, donnera $\frac{ab}{1} \sqrt{\frac{a+x}{aa+xx}} + \frac{bb}{2} \sqrt{\frac{a+x}{aa+xx}} - \frac{ab}{2} \sqrt{\frac{a+x}{aa+xx}} + ab \sqrt{\frac{x+\sqrt{aa+xx}}{a}} = \frac{bb}{2} \sqrt{\frac{a+x}{aa+xx}} + ab \sqrt{\frac{x+\sqrt{aa+xx}}{a}} =$ à l'integrale qu'il falloit construire égale au trapeze $BHDC$.

Fig. 2).

Si la conchoïde CPD , est de telle nature, que $AB \times BC(ab) = AG \times GP(yb)$; en suivant le même raisonnement qu'on a déjà fait, on aura $\frac{aby^{-1}dy}{y\sqrt{y-aa}} + \frac{a^2by^{-1}dy}{2y\sqrt{y-aa}}$, pour l'aire du petit espace $GPPm$ = l'élément de l'espace $GPCB$; & les integrales de chaque partie de cette differentielle, peuvent se trouver comme l'on a trouvé celles de la differentielle qui se rapporte à la 5^e forme des Tables de M. Cotes.

Car faisant $D=aab$, $z=y$, $\theta=0$, $n=2$, $e=-aa$, $f=1$, la differentielle de cette cinquième forme, par exemple,

$\frac{Dz}{\sqrt{e+fz^n}} dz$ deviendra $\frac{aaby^{-1}dy}{\sqrt{y-aa}}$ pour la premiere

partie de la differentielle, & faisant $D=\frac{a^2bb}{1}$, $z=y$, $\theta=1$,

$n=2$, $e=-aa$, $f=1$, on aura suivant ladite forme $\frac{a^2bb^{-1}dy}{2y\sqrt{y-aa}}$,

pour la seconde & dernière partie de la differentielle; &

l'integrale dans le premier cas qui répond à $\theta=0$, sera $\frac{-2}{\theta}$

$\sqrt{\frac{R+T}{S}}$, & dans le dernier cas répondant à $\theta=1$, l'in-

DES INFINIMENT PETITS. 63

tegrale fera $\frac{-1}{ax^2} DP + \frac{f}{x^2} DR \Big|_{\frac{R}{S}}^{\frac{R+T}{S}}$. Par conséquent met-
tant à la place de $P (= \sqrt{e+fx^2}) \sqrt{yy-aa}$, pour R
($= \sqrt{e}$) $\sqrt{-aa}$, pour $T (= \sqrt{e+fx^2}) \sqrt{yy-aa}$, &
pour $S (= \sqrt{fx^2}) y$, la premiere integrale deviendra $\frac{ab}{y}$
 $\Big|_{\frac{a+\sqrt{yy-aa}}{y}}^{\frac{a+\sqrt{yy-aa}}{y}}$, & la derniere fera $\frac{abb}{4y} \sqrt{yy-aa} + \frac{bb}{4} \Big|_{\frac{a+\sqrt{yy-aa}}{y}}^{\frac{a+\sqrt{yy-aa}}{y}}$;
& la somme de ces integrales $\frac{abb}{4y} \sqrt{yy-aa} + ab + \frac{bb}{4}$
 $\Big|_{\frac{a+\sqrt{yy-aa}}{y}}^{\frac{a+\sqrt{yy-aa}}{y}} =$ à l'integrale de toute la differentielle susdite,
qu'on peut construire de cette maniere.

Faites $AG(y) : \frac{1}{2} AB (\frac{1}{2} a) :: \frac{1}{2} BC (\frac{1}{2} b) : BN = \frac{ab}{4y}$, & Fig. 24.
 $AG(y) : GB (\sqrt{yy-aa}) :: BN (\frac{ab}{4y}) : BM = \frac{ab}{4y} \sqrt{yy-aa}$,
& si ensuite à BM vous ajoutez $MO =$ à la mesure de
l'angle BAG , dont le rayon, tangente & secante sont com-
me $AB(a)$, $BG(\sqrt{yy-aa})$ & $AG(y)$ au module $AB +$
 $\frac{EC}{4} (a + \frac{b}{4})$, le rectangle $CB \times BO$, sera égal à l'integrale
 $\frac{abb}{4y} \sqrt{yy-aa} + ab + \frac{bb}{4} \Big|_{\frac{a+\sqrt{yy-aa}}{y}}^{\frac{a+\sqrt{yy-aa}}{y}} =$ à l'espace $GPCB$.

E X E M P L E X V.

33. Soit $DPEBQD$ la moitié de la lunule d'Hypocrate,
 A étant le centre de l'arc DQB , & C le centre de l'arc
 DPE ; il faut trouver l'aire de l'espace $QPEB$, compris
par BE , partie de la ligne $ACEB$, qui joint les deux
centres A, C ; & par les parties QB, PE , des arcs
qui forment la moitié de la lunule; & la partie QP
d'une ligne quelconque AQ tirée du centre A du
plus grand arc, compris entre lesdits arcs.

Que DCF soit perpendiculaire à ACE . Tirez $Agqp$, in-
finiment proche de AGQ , & du centre A , décrivez les Fig. 25.
petits arcs Gr, ps , & joignez les points P & E .

Cela fait, soit $AC=a$, $CG=x$, $AG=y$. A cause des
triangles semblables AGC, rgG , on aura $AG(y) : AC(a) ::$

$Gg(dx) : Gr = \frac{adx}{y}$, & parce que les triangles AGC , AEP , sont aussi semblables, l'angle A , étant commun à tous deux, & l'angle APE , dans la demie-circonférence étant égal à l'angle droit ACG ; on aura $AG(y) : AC(a) : AE(2a) : AP = \frac{2aa}{y}$. De même à cause des secteurs semblables AGr , Asp , on aura $AG(y) : Gr(\frac{adx}{y}) : AP(\frac{2aa}{y}) : sp = \frac{2a'dx}{y}$, qui étant multiplié par $\frac{1}{2} AP(\frac{aa}{y})$ le produit $\frac{2a'dx}{y}$ = à l'aire du petit secteur Asp = au petit triangle App , car ils ne diffèrent seulement que du petit triangle pPs , qui est infiniment plus petit que le triangle Asp . De plus à cause des secteurs semblables AGr , Asp , on aura $AG(y) : Gr(\frac{adx}{y}) :: A\mathcal{Q}(a\sqrt{2}) : \mathcal{Q}g = \frac{adx\sqrt{2}}{y}$, qui multiplié par $\frac{1}{2} A(\frac{a}{2}\sqrt{2})$ & le produit $\frac{a'dx}{y}$, sera égale au petit secteur ou triangle $A\mathcal{Q}g$, qui étant soustrait de $\frac{2a'dx}{y}$, aire du triangle App , le reste $\frac{2a'dx}{y} - \frac{a'dx}{y}$ sera = à l'aire du trapeze $\mathcal{Q}ppg$, élément de l'espace $EP\mathcal{Q}B$ de la lunule.

De plus, à cause que $yy = aa + xx$; ce qui donne $xx = yy - aa$: prenant la différentielle de cette équation, on aura $x dx = y dy$ & $dx = \frac{y dy}{x} = \frac{y dy}{y - aa}$, en mettant pour x , sa valeur $\sqrt{yy - aa}$; maintenant si on substitue cette dernière valeur de dx dans la différentielle de l'espace de la lunule cherchée, on aura $\frac{2a'y dy}{y\sqrt{y-aa}} - \frac{a'dy}{y\sqrt{y-aa}} = \frac{2a'y - a'dy}{y\sqrt{y-aa}}$, dont chaque partie se rapporte à la cinquième forme des Tables de M. Costes. Car dans la première partie, faisant $D = 2a^1$, $z = y$, $\theta = -1$, $\theta = 2$, $\epsilon = -aa$, $f = 1$, on aura la différentielle de cette forme $\frac{Dz}{\sqrt{\epsilon + fz^2}}$ $dz = \frac{2a'y - a'dy}{y\sqrt{y-aa}}$; de même dans la seconde partie, faisant $D = -a^1$,

DES INFINIMENT PETITS. 65

$Dz = -a^2$, $z=y$, $t=0$, $u=z$, $e=-aa$, $f=1$, on aura

$$\frac{Dz}{\sqrt{e+fz^2}} dz = \frac{-a^2 y^{-1} dy}{\sqrt{yy-aa}}; \text{ \& l'integrale r\^epondant \^a}$$

$$t=-1, \text{ fera } \frac{-1}{u^2} DP + \frac{f}{u} DR \Big|_{\frac{R+T}{S}} = \frac{a^1}{y} \sqrt{yy-aa} + aa$$

$$\Big|_{\frac{a+Y\eta-aa}{y}}, \text{ en substituant } \sqrt{yy-aa} \text{ pour } P(\sqrt{e+fz^2}),$$

a pour $R(\sqrt{e})$, $\sqrt{yy-aa}$ pour $T(\sqrt{yy-aa})$, & y pour $S(\sqrt{fz^2})$. Celle qui r\^epond dans les Tables \^a $t=0$, est

$$\frac{-1}{u} DR \Big|_{\frac{R+T}{S}} = -aa \Big|_{\frac{a+Y\eta-aa}{y}}, \text{ en substituant les m\^emes}$$

valeurs. C'est pourquoi la somme de ces integrales $\frac{a^1}{y}$

$$\sqrt{yy-aa} + aa \Big|_{\frac{a+Y\eta-aa}{y}} - aa \Big|_{\frac{a+Y\eta-aa}{y}} = \frac{a^1}{y} \sqrt{yy-aa},$$

(puisque les mesures du m\^eme angle au module aa , sont l'une affirmative, & l'autre n\^egative, par consequent se d\^e-truisent), = \^a l'integrale de l'\^element de l'espace $EPQ\beta$ = $EPQ\beta$ de la lunule.

On peut construire plus ais\^ement cette integrale; car si on tire une ligne droite du centre C au point P , le triangle isoc\^ele CPE est = \^a l'integrale $\frac{a^1}{y} \sqrt{yy-aa} = \frac{a^1}{y} x$ (puisque $x = \sqrt{yy-aa}$) = \^a l'espace $EPQ\beta$ de la lunule, comme nous allons le d\^emontrer.

Tirez PH parall\^ele \^a GC , ce qui donnera, \^a cause des triangles semblables AGC , APH ; $AG(y) : AP(\frac{y}{a}) :: GC$

$$(x) : PH = \frac{y}{a} \cdot \text{Ainsi } \frac{1}{2} PH(\frac{ax}{y}) \times CE(a) = \frac{a^1 x}{y} = \^a$$

l'integrale qu'il falloit construire = \^a l'aire du triangle CPE , ce qui donne pour l'aire de la demie-lunule $CE \times \frac{1}{2} DC = \frac{1}{2} aa$. De cette maniere on parvient \^a la quadrature de cet espace par le calcul differentiel; ce qu'on peut v\^eritablement d\^emontrer plus bri\^evement par la g\^eometrie ordinaire.



E X E M P L E X V I.

34. *Quarrer l'espace cycloïdale ; on , ce qui est la même chose , trouver l'aire d'un segment quelconque AMG.*

Fig. 26.

Que APB soit le cercle generateur ; AP une ordonnée quelconque , PM , l'abscisse correspondante ; que mp soit infiniment proche de MP ; que PM touche le cercle generateur en P , & MT la cycloïde en M . Maintenant par la propriété de la cycloïde , la soutangente $PT = PM =$ à l'arc AP . Tirez AG perpendiculaire à AB , & des points M , m , tirez MG , mg , perpendiculaire à AG .

Présentement que $AQ = x$, $AB = 1$: parce que $TP = PM$, l'angle $MTP = PMT$; par conséquent l'angle $TPQ = 2TMP$. Mais la mesure de l'angle APQ est la moitié de l'arc AP , qui est aussi la mesure de l'angle TPA ; donc $APQ = TMP = Mms$. Par conséquent les triangles APQ , Mms , étant semblables ; $AQ(x) : QP(\sqrt{x-xx}) :: MS(dx) : ms = dx \frac{\sqrt{x-xx}}{x}$, mais $dx \frac{\sqrt{x-xx}}{x}$, réduit en une série infinie , sera $x^{-\frac{1}{2}} dx - \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}} dx + \frac{1}{8} x^{\frac{3}{2}} dx - \frac{1}{16} x^{\frac{5}{2}} dx$ &c. = à l'élément de l'ordonnée QM , & l'intégrale de cette différentielle ; sçavoir $2x^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{20} x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{16} x^{\frac{7}{2}}$ &c. sera l'ordonnée MQ . Par conséquent , $QM \times dx =$ à la différentielle de l'espace cycloïdale $AMQ = 2x^{\frac{1}{2}} dx - \frac{1}{2} x^{\frac{3}{2}} dx + \frac{1}{20} x^{\frac{5}{2}} dx - \frac{1}{16} x^{\frac{7}{2}} dx$ &c. dont l'intégrale sera $\frac{4}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{14} x^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{70} x^{\frac{7}{2}} - \frac{1}{224} x^{\frac{9}{2}}$ &c. = à l'aire de l'espace indéfini de la cycloïde AMQ .

Maintenant si $ms = gG = \frac{dx\sqrt{x-xx}}{x}$, est multiplié par $GM = AQ = x$; alors l'élément $GMSG$ de l'aire AMG sera $= dx \sqrt{x-xx}$. Or puisque cette dernière différentielle égale à l'élément du segment du cercle APQ , l'espace AMG sera égal au même segment du cercle APQ ; & par conséquent l'aire $ADBC$ de toute la cycloïde ADB , est égal à l'aire du demi-cercle APB .

COROLLAIRE.

Parce que BD est égal à la demie-circonférence du cercle; si vous l'appellez p , & AB , a ; alors le rectangle $ABDE = ap =$ à l'aire du demi-cercle APB . D'où il suit que l'espace extérieur de la cycloïde $AEDMA = \frac{1}{2} ap$. C'est pour-quoi l'aire de la demie-cycloïde $ADB = \frac{1}{2} ap$, $AMDPA = \frac{1}{2} ap$. Par conséquent l'aire de la cycloïde est triple de son cercle générateur.

EXEMPLE XVII.

35. *Quarrer la cissoïde de Diocles; ou, trouver l'aire d'un segment quelconque APM de cette courbe.*

Que ADB soit le cercle générateur, BH l'asymptote de la courbe (AI) cissoïdale, coupant à angles droits le diamètre AB du cercle; supposons ce diamètre $AB=1$, l'abscisse $AP=x$, & l'ordonnée correspondante PM de la cissoïde $=y$. Fig. 17.

Maintenant l'équation qui exprimera la nature de cette courbe, sera $PB \times PM = AP$; c'est-à-dire, $y^2 - xy = x^3$; ainsi $y^2 = \frac{x^3}{1-x}$; d'où on tire $y = \sqrt{\frac{x^3}{1-x}} = \frac{x\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} = x^{\frac{1}{2}} \times \frac{1}{1-x}^{-\frac{1}{2}}$; & $y dx = x^{\frac{1}{2}} \times \frac{1}{1-x}^{-\frac{1}{2}} dx =$ à l'élément de l'aire APM ; dont l'intégrale sera $\frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} + \frac{2x^{\frac{7}{2}}}{3 \cdot 7} + \frac{1 \cdot 3 x^{\frac{9}{2}}}{4 \cdot 9} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 x^{\frac{11}{2}}}{4 \cdot 6 \cdot 11} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 x^{\frac{13}{2}}}{4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 12} \text{ &c.} = \sqrt{x}$, multiplié par $\frac{2}{5} x^4 + \frac{2}{7} x^6 + \frac{1 \cdot 3 x^8}{4 \cdot 9} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 x^{10}}{4 \cdot 6 \cdot 11} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 x^{12}}{4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 13} \text{ &c.} =$ à l'espace APM ; & quand $x=1$, alors la série se changera en celle-ci $\frac{2}{5} + \frac{2}{7} + \frac{1 \cdot 3}{4 \cdot 9} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{4 \cdot 6 \cdot 11} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 13} =$ à l'aire de l'espace infini $ABHIA$.

Autrement.

Que AB soit $=a$, & $PN=z$. Mais par la nature de la courbe $ay^2 - xy^2 = x^3$, & différenciant l'équation, on aura

I ij

$2xydy - 2x^2dy - y^2dx = 3x^2dx$, & $2x - 2x \times dy = ydx = \frac{3x^2dx}{y}$. Mais par une autre propriété de la courbe $x' = zy$, ainsi $\frac{x'}{y} = z$. Présentement faisant $a - x = PB = u$; ce qui donnera $2udy - ydx = 3zdx$; ainsi l'intégrale de l'une est égale à l'intégrale de l'autre : mais zdx est l'élément $PNNp$ du segment ANP du cercle; & à cause que $u = PE = OM$, & $dy = mR = oO$; $mMOo$, est l'élément de l'aire $AMOB$, & ydx , l'élément de l'aire AMP . Quand l'intégrale de udy exprime l'aire de tout l'espace cisloïdale $ABHIA$, l'intégrale de $x dy$ sera le même aire; ainsi l'intégrale de $2udy - ydx =$ l'intégrale de udy . Par conséquent, puisque dans le même cas l'intégrale de zdx est l'aire du demi-cercle ANB , & que l'intégrale de $udy = 3zdx$, tout l'espace cisloïdale $ABHIA$, sera triple du demi-cercle générateur ANB .

EXEMPLE XVIII.

36. *Quarrer un espace infini HPMT, compris par l'asymptote PH, par l'ordonnée PM, & par la partie MSI de la courbe logarithmique MI.*

Fig. 11. Nommez la soutangente PT , a , (parce qu'elle est une quantité constante par la nature de cette courbe) & l'ordonnée PM , y . Tirez l'ordonnée pm infiniment proche, & de M tirez la perpendiculaire Mq à mq . Maintenant à cause des triangles semblables MTP , mMq ; $MP(y) : TP(a) :: mq(dy) : Mq = \frac{ady}{y}$; ce qui donne $MP \times Mq = y \times \frac{ady}{y} = ady$, pour l'élément de l'aire $IMPH$, dont l'intégrale sera ay ; c'est-à-dire, l'aire de l'espace infini $IMPH = MP \times PT$.

COROLLAIRE.

Si l'ordonnée $QS = z$; alors l'espace infini $ISQH = az$, & par conséquent $SMP.QS = ay - az = a \times y - z$; c'est-à-dire, l'espace compris entre deux demies-ordonnées MP , $S.Q$, la partie de l'abscisse $P.Q$, & celle de la courbe MS est égale à $TP \times PM - S.Q$; ainsi l'espace $BAPM$ est à l'es-

DES INFINIMENT PETITS. 69

pace $BMSQ$, comme la différence des ordonnées AB , PM , est à la différence des ordonnées PM , QS .

E X E M P L E X I X.

37. *Quarrer tout espace spirale.*

Que le rayon du cercle soit $AC=a$, la circonférence $=b$, & un arc quelconque $AB=x$, & l'ordonnée correspondante $CM=y$. Concevez le rayon Cb infiniment proche de CB , & tirez le petit arc ME . Fig. 19.

La propriété de la spirale d'*Archimède*, est que $AC \times AB =$ à la circonférence b multiplié par CM ; c'est-à-dire, $ax=by$. Ceci étant accordé, le petit arc $ME=\frac{ydx}{a}$, puisque $CB:Cb::CM:ME$. Ainsi $\frac{1}{2} CM \times ME =$ l'aire du petit secteur $MCE =$ au petit espace triangulaire CMm , élément de l'espace spirale $=\frac{y^2 dx}{2a}$; mais par la nature de la courbe $ax=by$; par conséquent $\frac{a^2 x^2}{b^2} = yy$. Donc substituant $\frac{a^2 x^2}{b^2}$ pour yy , dans l'expression différentielle, on aura $\frac{ax^2 dx}{2b^2}$; dont l'intégrale sera $\frac{ax^3}{6b^2}$ pour l'aire du segment de l'espace spirale; & si au lieu de x on met b , égal à toute la circonférence, tout l'espace spirale $=\frac{1}{6} ab$.

De plus, la nature de tous les espaces spirales circulaires peuvent s'exprimer par cette équation générale $a^m x^n = b^n y^m$,

ainsi $\frac{a^m x^n}{b^n} = y^m$, & $\frac{a x^{\frac{n}{m}}}{b^{\frac{n}{m}}} = y^2$; donc $\frac{y^2 dx}{2a} = \frac{ax^{\frac{2n}{m}} dx}{2b^{\frac{2n}{m}}}$ Dont

l'intégrale sera $\frac{m a x^{\frac{2n}{m} + 1}}{4n + 2m \times b^{\frac{2n}{m}}}$; ainsi mettant b pour x , tout

l'espace spirale sera $\frac{mab}{4n + 2m}$.

Il faut remarquer, que si l'arc AB est à BM , comme

l'abscisse à l'ordonnée, dans quelques courbes géométriques que ce soit, l'espace spirale peut être quarré par les mêmes moyens que nous avons suivis ci-devant. *Par exemple*; que AB soit à BM , comme l'abscisse d'une parabole est à son ordonnée; & que prenant p pour le parametre $px = a^2 - 2ay + yy$, & $dx = \frac{2ydy - 2ady}{p}$, ce qui donne $\frac{y^2dx}{2a} = \frac{y^2dy - ay^2dy}{ap}$, dont l'intégrale sera $\frac{y^3}{\frac{4ap - y^2}{3}}$.

On peut de la même manière trouver l'aire de l'espace compris par l'arc AB , & la spirale AM ; dont l'élément & le trapeze $BMmb = Bb + Mm \times \frac{x}{2} mb$. Mais $Bb = dx$, $Mm = \frac{ydx}{a}$, $mb = a - y$; par conséquent $BMmb (dx + \frac{ydx}{a} \times \frac{1}{2} a - y) = \frac{a^2dx - y^2dx}{2a}$.

Maintenant que la courbe soit une spirale parabolique, substituez $\frac{2ydy - 2ady}{p}$ pour son égal dx ; ce qui donne $\frac{a^2dy - a^2dy - y^2dy - a^2dy}{ap}$ pour l'élément de l'espace ABM , dont l'intégrale $\frac{y^3}{\frac{3p - ay^2}{2p - y^2}}$ sera égal à l'aire de cet espace.

EXEMPLE XX.

38. *Quarrer un espace quelconque ACMP, de la quadratrice, compris entre la baze AC, l'abscisse AP, l'ordonnée correspondante PM, & la partie CM de la même quadratrice.*

Fig. 30.


Que Cc soit le quart du cercle générateur, A le centre; tirez AmM , & des points m, M , abaissez les perpendiculaires me, ME .

Faites $AC = 1$, $AP = x$, $PM = y$. Ensuite par la propriété de cette courbe, $AP(x) = EM =$ l'arc Cm , du quart du cercle. Ainsi, par la scholie première, exemple 4 de la

DES INFINIMENT PETITS. 71

dernière section, le sinus *em*, $= 1 + x - \frac{1}{6} x^3 + \frac{1}{120} x^5$
 $\&c.$ & le sinus du complement *Ae* $= 1 - \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{24} x^4 -$
 $\frac{1}{720} x^6 \&c.$ Mais à cause des triangles semblables *Ame*,
APM, on aura *me* $(1 + x - \frac{1}{6} x^3 + \frac{1}{120} x^5 \&c.) : Ae (1$
 $- \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{24} x^4 - \frac{1}{720} x^6 \&c.) :: AP (x) : PM (y) =$
 $1 - \frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{45} x^5 - \frac{2}{945} x^7 \&c.)$ d'où il suit que $y dx =$
 $dx - \frac{1}{3} x^3 dx - \frac{1}{45} x^5 dx - \frac{2}{945} x^7 dx \&c. =$ à l'élément
 de l'aire *ACMP*, dont l'intégrale $= x - \frac{1}{9} x^3 - \frac{1}{225} x^5 -$
 $\frac{2}{6615} x^7 \&c. =$ à l'aire *ACPM*.





SECTION IV.

Usage du calcul integral pour trouver la rectification des courbes.

PROBLEME.

39. *Rectifier une courbe quelconque ; ou , trouver une ligne droite qui lui soit égale.*

Fig. 31.

PUisque'on peut concevoir une courbe comme formée par un nombre infini de petites lignes droites ; ainsi une de ces lignes étant trouvée par le calcul différentiel ordinaire , c'est-à-dire , l'élément de la courbe étant trouvé ; alors la somme des éléments , ou , ce qui est la même chose , l'intégrale de cette expression différentielle , sera la longueur d'une ligne droite égale à la ligne courbe.

Maintenant , que PM (y soit l'ordonnée , coupant à angles droits l'abscisse AP (x) d'une courbe quelconque AM ; & que TM soit tangente à la courbe en M . Tirez Pm parallèle & infiniment proche de PM , & du point M , tirez Mm perpendiculaire à pm , ce qui donne Pp ($= Mn$) $= dx$, & nm , $= dy$, & Mm , pour la différentielle ou partie infiniment petite de la courbe AM , qu'il faut premièrement trouver ; ce qui se fait ou en trouvant les valeurs de Mn (dx^2) , ou de mn , (dy^2) par l'équation de la courbe différentiée ; parce que $dx^2 + dy^2 = Mm$. Ou bien en faisant comme la sous-tangente TP , ou l'ordonnée PM (dy) est à la tangente TM ; ainsi la différentielle de l'abscisse Mn , (dx) ou mn , (dy) est à une quatrième proportionnelle qui $= Mm$, différentielle de la courbe AM . Car le petit triangle rectangle Mmn , est semblable au triangle rectangle TMP , & l'intégrale

grale de cette différentielle fera l'arc cherché. Quelques exemples rendront ceci évident.

COROLLAIRE.

Il suit de ce que nous venons de dire que si on tire PQ perpendiculaire à la tangente TM ; PQ ou $QM : PM (y) :: Mn (dx)$ ou $nm (dy) : Mm$, différentielle de la courbe AM .

EXEMPLE I.

40. Trouver la longueur d'un arc quelconque AM , de la parabole ordinaire.

En ce cas on a $AP \times a = \overline{PM}^2$, c'est-à-dire, $ax = yy$; différentiant chaque membre de l'équation, on aura $adx = 2ydy$, & quarrant chaque membre $aadx^2 = 4y^2dy^2$, & $dx^2 = \frac{4y^2dy^2}{aa}$, & ajoutant dy^2 , à cette dernière expression, il viendra $\sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{dy^2 + \frac{4y^2dy^2}{aa}} = \frac{dy}{a} \sqrt{aa + 4yy}$ Fig. 31.
 $= Mm$, différentielle de la courbe AM , dont l'intégrale fera $y + \frac{2y^2}{3a^2} = \frac{2y^2}{3a^2} + \frac{4y^2}{7a^2} - \frac{10y^2}{9a^2} \&c. =$ à l'arc AM .

Autrement.

Par la mesure d'un rapport.

Cette même différentielle de la parabole $\frac{dy}{a} \sqrt{aa + 4yy}$ peut se rapporter à la quatrième forme des Tables de M. Cotes. Faites $z = y$, $n = 2$, $\theta = 0$, $D = \frac{1}{a}$, $e = aa$, $f = 4$; ce qui donne $Dz^{\theta + \frac{1}{n} - 1} dz \sqrt{e + fz} = \frac{dz}{a} \sqrt{aa + 4yy}$, & l'intégrale de cette forme, qui répond à $\theta = 0$, fera $\frac{z^2}{4} DP + \frac{e}{y} DR \Big|_{\frac{R+T}{S}}$, & faisant $P (= \sqrt{\frac{e+fz}{z^2}}) = \frac{1}{y} \sqrt{aa + 4yy}$, $R (= \sqrt{f})$
 $= 2$, $T (= \sqrt{\frac{e+fz}{z^2}}) = \frac{1}{y} \sqrt{aa + 4yy}$, $S (= \sqrt{\frac{e}{z^2}}) =$
K

$\frac{a}{y}$, la même intégrale sera $\frac{1}{2a} \sqrt{aa+4yy} + \frac{a}{4} \left| \frac{\sqrt{aa+4yy}+2y}{a} \right|$ qu'on peut construire de cette manière.

Fig. 32.

Du sommet A , tirez AB , coupant l'ordonnée PM (y) en B ; ce qui donne $AB (= \sqrt{AP+PB}) = \frac{1}{2a} \sqrt{aa+4yy}$, & multipliant le numérateur & le dénominateur du rapport $\frac{\sqrt{aa+4yy}+2y}{a}$ par $\frac{1}{2a}$, elle se changera en celle-ci $\frac{\frac{1}{2a} \sqrt{aa+4yy} + \frac{1}{2a}}{\frac{1}{2a}}$, c'est-à-dire, $\frac{a}{4} \left| \frac{\sqrt{aa+4yy}+2y}{a} \right| = \frac{a}{4}$

Mais $\frac{1}{2a} \sqrt{aa+4yy} + \frac{1}{2a} = AB + PB$, & $\frac{1}{2a} = PB$, ainsi $\frac{a}{4}$ est égal à la distance du foyer, suivant la nature de la parabole. C'est pourquoi $\frac{a}{4} \left| \frac{\sqrt{aa+4yy}+2y}{a} \right| = AF \left| \frac{AB+AP}{PB} \right| =$ à la mesure du rapport de $AB+AP$ & PB , à la distance du foyer AF , comme module. Ce qui étant ajouté à AB , le tout sera $\frac{1}{2a} \sqrt{aa+4yy} + \frac{a}{4} \left| \frac{\sqrt{aa+4yy}+2y}{a} \right| =$ à l'intégrale de la différentielle $\frac{dy}{a} \sqrt{aa+4yy} =$ à la longueur de l'arc AM de la parabole, d'où on tire cette règle pour trouver la longueur de la courbe de la parabole ordinaire.

Soit A le sommet, F le foyer, AP l'axe, & PM une ordonnée à cet axe. Tirez AB coupant l'ordonnée PM au point B ; prolongez-la jusqu'en C ; en sorte que BC soit la mesure du rapport de $AB+AP$, & PB , au module AF ; ce qui donne AC , pour la longueur de l'arc AM de la parabole. C'est-là la construction que M. Cotes donne dans son *Harmonia mensurarum*, page 12.

Dans cette courbe la sous-tangente $TP=2AF=2x$, d'où $TM = \sqrt{4xx+ax}$. C'est pourquoi $TP(2x) : TM (\sqrt{4xx+ax}) :: Mn(dx) : Mm = \frac{\sqrt{4xx+ax}}{2x} \times dx =$ à l'élément de la courbe. Or puisque $ax=yy$, donc $x = \frac{y}{a}$ & $2x$

DES INFINIMENT PETITS. 75

$$= \frac{2y}{a}, \& 4xx = \frac{4y^2}{aa}. \text{ Par conséquent } \frac{\sqrt{4y^2+4y}}{aa} = TM.$$

$$\text{Maintenant } PM(y) : TM \left(\frac{\sqrt{4y^2+4y}}{aa} + yy \right) : nm(dy) : Mm =$$

$$dy \frac{\frac{\sqrt{4y^2+4y}}{aa} + yy}{y} = dy \frac{\sqrt{4y^2+4y}}{a}, \text{ comme ci-devant; } \& \text{ l'intégrale de } dx \frac{\sqrt{4xx+aa}}{2x}, \text{ supofant } a=1, \text{ fera } x^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{3} \sqrt{x} - \frac{1}{5} \sqrt{x^3} + \frac{4}{7} \sqrt{x^7} - \frac{10}{9} \sqrt{x^9} \&c.$$

COROLLAIRE. *

Si AC , DC font deux demies axes conjugués d'une hyperbole équilaterale, & qu'on supofe $AC (= DC) = a$, parametre de la parabole; foit l'ordonnée $PM=2y$, l'abfciffe $QM=x$: ce qui donne $AP=x-a$, & parce que $PC \times AP = PM^2$; c'eft - à - dire, $xx - aa = 4yy$; donc $xx = 4yy + aa$. Par conséquent $x = \sqrt{4yy + aa}$. Et si on tire qm infiniment proche de QM , on aura $Qq=dy$; ainfi la différentielle $Qqmm$ de l'aire hyperbolique $CQMA$ fera $dy \sqrt{aa+4yy}$ = à l'élément de la parabole. Par conséquent la rectification de la parabole dépend de la quadrature de cet espace hyperbolique: & de même la rectification d'une courbe quelconque peut fe rapporter à fa quadrature, en supofant la différentielle, ou l'élément de la courbe qu'il faut rectifier, comme une ordonnée, & la quantité changeante de cette différentielle comme une abfciffe à cette ordonnée. Par conséquent on peut quelquefois rectifier les courbes d'une manière plus abrégée lorsqu'on connoît d'avance la quadrature de la courbe à laquelle on peut la rapporter.

Fig. 31.

EXEMPLE II.

41. Rectifier une parabole du fecond degré; dont l'équation eft $ax^2=y^2$ (supofant $a=1$,) $x^2=y^2$.

Puifque $x^2=y^2$, donc $2xdx = 2ydy$, & $4x^2dx^2=2y^2dy^2$, & $dx^2 = \frac{y^2dy^2}{4x^2} = \frac{y^2dy^2}{4y^2}$ (fubftituant y^2 pour ax^2)

K ij

$= \frac{2}{4} y dy^2$; c'est pourquoi $\sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{\frac{2}{4} y dy^2 + dy^2}$,
 (ajoutant dy^2 à chaque membre de l'équation $dx^2 = \frac{2}{4} y dy^2$) $=$
 $\frac{1}{2} \sqrt{2y dy^2 + 4 dy^2} = \frac{1}{2} dy \sqrt{2y + 4} =$ à l'élément de la courbe,
 dont l'intégrale est $\frac{1}{\frac{2}{3}} \times 2y + 4 \times \sqrt{2y + 4} =$ à l'élément de la courbe,
 Mais pour savoir s'il n'y a rien à ajouter ou à retrancher de cette inte-
 grale , faites $y=0$; alors ce qui reste est $\frac{4}{\frac{2}{3}} \sqrt{4} = \frac{8}{\frac{2}{3}}$; par
 conséquent la longueur de cette courbe sera (*) $\frac{1}{\frac{2}{3}} \times 2y + 4$
 $\times \sqrt{2y + 4} = \frac{8}{\frac{2}{3}}$.

* art. 19.

* COROLLAIRE.

Fig. 31. Soit le parametre de la parabole ordinaire égal 1 , $AP=1$,
 $PQ = \frac{2}{4} y$; ce qui donne $AQ = \frac{2}{4} y + 1$, & à cause que
 le parametre est 1 , $QN' (= \frac{2}{4} y + 1) = \frac{2y+4}{4}$. Par con-
 séquent $QN = \frac{1}{2} \sqrt{2y+4}$; c'est pourquoi $QNNq$, éle-
 ment ou différentielle de l'espace parabolique PMN $Q = \frac{1}{2}$
 $dy \sqrt{2y+4}$. Ainsi l'on voit que la longueur de la courbure
 parabolique du second degré , exprimée par cette équation
 $dx^2 = y^2$ dépend de la quadrature de la parabole simple ,
 ayant la même différentielle pour l'élément de son aire , &
 par conséquent cette rectification peut se trouver en termes
 finis.

● E X E M P L E I I I .

42. Rectifier les paraboles de tous les degrés.

Que le parametre soit $=1$; ensuite le nombre infini des
 paraboles de tous les degrés s'exprimera par cette équation
 $y^m = x$, dont la différentielle est $m y^{m-1} dy = dx$, & en
 quarrant chaque membre on aura $m^2 y^{2m-2} dy^2 = dx^2$, & si
 pour abréger vous faites $2m-1 = r$, vous aurez $m^2 y^r dy^2$
 $= dx^2$; ajoutant de part & d'autre dy^2 , & extrayant en-
 suite la racine quarrée de chaque membre , il viendra
 $\sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{m^2 y^r dy^2 + dy^2} = dy \sqrt{m^2 y^r + 1} =$ à
 l'élément de l'arc d'une parabole de quelque degré qu'elle
 soit , dont l'intégrale , par exemple ; $y + \frac{m^2 y^{r+1}}{2. r+1} =$

$$\frac{m^4 y^{1r+1}}{2.4.2r+1} + \frac{1.3m^6 y^{1r+1}}{2.4.6.3r+1} - \frac{1.3.5m^8 y^{1r+1}}{2.4.6.8.4r+1} \text{ &c. est la lon-}$$

gueur de cette courbe. Maintenant substituant $2m-2$ pour r , on aura pour le même arc, $y + \frac{m^4 y^{2m-1}}{2.2m-1} - \frac{m^4 y^{1m-3}}{2.4.4m-3}$

$$+ \frac{1.3m^6 y^{1m-5}}{2.4.6.6m-5} - \frac{1.3.5m^8 y^{1m-7}}{2.4.6.8.8m-7} \text{ &c.}$$

E X E M P L E I V.

43. Trouver la longueur d'une partie quelconque BC de la spirale équiangulaire ou logarithmique.

Suppose le rayon $AB=a$, $AC=b$; que BD (c) touche la spirale en B , & que AD soit perpendiculaire à BD . Nommez BD , p ; que PE touche de même la spirale en P , & que AE lui soit perpendiculaire. De plus, que Ap soit infiniment proche de AP ; du point A décrivez le petit arc Pm ; ensuite faites $AP-AB=FP$, y .

Fig. 13.

Or par la propriété de cette courbe, un rayon quelconque AB , la coupe toujours dans un même angle; c'est-à-dire, fait toujours un même angle ABD avec la tangente BD ; donc un triangle quelconque APE , est semblable au triangle donné ABD . Mais le petit triangle mpP est aussi semblable au triangle APE , l'angle en m étant droit $=E$, & l'angle en p étant commun aux deux triangles; d'où il suit que le petit triangle différentiel mpP est semblable au triangle ABD ; d'où on tire $BD(c) : AB(a) :: mp(dy) : Pp = \frac{ady}{c}$ $=$ à l'élément de la partie PB de la courbe; & l'intégrale $\frac{ay}{c}$ est la longueur de la partie PB ; & mettant $b-a$ pour y , on aura $\frac{b-a}{c} =$ à la longueur BC ; c'est-à-dire, que $BD(c) : AB(a) :: AC-AB : à la longueur BC$.

44. Trouver la longueur d'un arc quelconque AP , de la spirale APC d'Archimedes.

Fig. 34.

Que CAM soit le cercle generateur. Nommez AC a , la circonference b , l'arc CM x , l'ordonnée AP de la spirale y , & que PT touche la spirale en P ; coupant la ligne AT tirée du centre A de la spirale, perpendiculaire à AP dans le point T . De plus, que $Mm=dx$, tirez Am , & de la distance An , & du centre A , décrivez le petit arc np . Maintenant $ax=by$, exprime la nature de cette courbe. A cause des secteurs semblables AMm , Apn ; on aura $AM(a) : Mm(dx) :: AP=AP(y) : Pn=\frac{ydx}{a}$, & parce que les triangles ppn , PAT , sont aussi semblables; on aura $pP(dy) : pN(\frac{ydx}{a}) :: AP(y) : AT$ soutangente $=\frac{ydx}{ady}$. Mais $adx=bdy$; donc $dx=\frac{bdy}{a}$, en substituant cette valeur de dx , dans $\frac{ydx}{ady}$ on aura $AT=\frac{by}{aa}$. De plus, à cause que le triangle TAP est rectangle, $AT^2(\frac{b^2y^2}{a^2}) + AP^2(y^2) = TP^2 = \frac{a^2y^2+by^2}{a^2}$; ainsi $TP=\frac{y}{aa} \sqrt{a^4+bb}yy$; & $AP(y) : TP(\frac{y}{aa} \sqrt{a^4+bb}yy) :: pP(dy) : Pn=\frac{1}{aa} dy \sqrt{a^4+bb}yy$ à l'élément de la partie AP de la spirale, qui se rapporte à la quatrième forme des Tables de M. Cotes.

Car faisant $z=y$, $z'=z$, $\theta=0$, $D=\frac{1}{aa}$, $e=a^4$, $f=bb$, on a $Dz^{(n+1)-1} dz \sqrt{e+fz^n} = \frac{1}{aa} dy \sqrt{a^4+bb}yy$, dont l'integrale est $\frac{z^2}{2} DP + \frac{e}{f} DR \Big|_{\frac{R+T}{S}}$, & mettant pour P , R , T , S ; ou pour $\sqrt{\frac{e+fz^n}{z^2}}$, $\sqrt{f}$, $\sqrt{\frac{e+fz^n}{z^2}}$, $\sqrt{\frac{e}{z^2}}$, leurs valeurs $\frac{1}{2} \sqrt{a^4+bb}yy$, b , $\frac{1}{2} \sqrt{a^4+bb}yy$, $\frac{a^2}{y}$; alors il viendra $\frac{y}{2aa} \sqrt{a^4+bb}yy + \frac{aa}{2b} \Big|_{\frac{y a^4+bb yy+yb}{aa}} =$ à l'integrale de la différentielle dont nous venons de parler.

On peut construire ainsi cette integrale : coupez $AP(y)$

DES INFINIMENT PETITS. 79

dans le point L , & tirez DL , parallèle à la tangente PT , coupant la soutangente en D ; ce qui donne $DL = \frac{r}{2aa}$

$\sqrt{a^4 + bbyy}$, puisqu'il est égal à $\frac{1}{2} FT = \frac{r}{2aa} \sqrt{a^4 + bbyy}$.

De plus le module $\frac{aa}{2b}$ se trouve en faisant $AD (\frac{by}{2aa}) : AL$

$(\frac{r}{2}) :: AL (\frac{r}{2}) : AF = \frac{aa}{2b}$, & le rapport $\frac{\sqrt{a^4 + bbyy} + yb}{aa}$

$= \frac{r}{2aa} \sqrt{a^4 + bbyy} + \frac{by}{2aa}$, comme l'on trouvera en divi-

fant le numérateur & le dénominateur de cette dernière

expression par $\frac{r}{2}$; ainsi ce rapport $= \frac{LD + AD}{AL}$. De même, si

à DL , vous ajoutez LQ , qui est la mesure du rapport de $LD + AD$ à AL , la ligne DF en étant le module; toute la ligne DQ est égale à la longueur AP de la spirale.

De cette manière vous pouvez trouver la longueur de toute la spirale, en faisant $y = s$, qui est le rayon du cercle generateur.

E X E M P L E V I.

45. Trouver la longueur d'un arc quelconque CP de la spirale réciproque APC .

Autour du centre A , & de la distance AC , décrivez le quart de cercle $BCMH$, & continuez AP en M . Or par la nature de cette courbe un de ses rayons quelconque AC est réciproquement comme l'angle BAC qu'il fait avec le premier rayon AB , ou comme l'arc BC ; c'est-à-dire, que $AP : AC :: BC : BM$; ainsi $AP \times BM = AC \times BC$.

Maintenant faites AB ou $AC = a$, & l'arc $Bc = b$, l'arc $BM = x$, & $AP = y$; & l'on aura $ab = xy$. Tirez PG jusqu'à ce qu'elle touche la courbe en P , & tirez aussi AG perpendiculaire à AP . Supposez Ap infiniment proche de AP , & continuez-la jusqu'à ce qu'elle coupe l'arc du cercle en m , & de A , & de la distance Ap , décrivez le petit arc pn ; à cause des secteurs semblables Anp , AMm ; $AM (a) : Mm (dx) :: AP (y) : pn = \frac{ydx}{a}$; & de même à cause de la similitude des triangles APG , nPp , on a $Pn (dy) : pn (\frac{ydx}{a}) ::$

Fig. 35.

$AP(y) : AG = \frac{y' dx}{ady}$; différentiant l'équation de la courbe $ab = xy$; on aura $dx = \frac{ab dy}{y}$, qui étant substitué pour dx dans $\frac{y' dx}{ady}$, viendra $AG = b$; c'est-à-dire, égale à la ligne tirée du centre A , perpendiculaire à un rayon quelconque AP de la spirale, qui coupe sa tangente à l'extrémité du rayon, sera une grandeur constante, par exemple, $=$ à l'arc BC , qui est égal à une ligne droite, perpendiculaire au premier rayon AB , quand le point C est à une distance infinie, & l'angle BAC infiniment petit; c'est-à-dire, égale à AD distance de l'asymptote DE du centre A . Ainsi $AP(y) : GP(\sqrt{bb+yy}) : nP(dy) : Pp = \frac{dy}{y} \sqrt{bb+yy} =$ à l'élément de la courbe AP .

Cet exemple peut être rapporté à la troisième forme des Tables de M. Costes. Car faisant $z=y$, $n=2$, $\theta=0$, $D=1$, $e=bb$, $f=1$, on a $Dz^{n-1} dz \sqrt{e+fz} = \frac{dz}{y} \sqrt{bb+yy}$, & son intégrale $\frac{1}{y} DP - \frac{2}{y} DR \Big|_{\frac{R+T}{S}}$, en substituant pour $P(\sqrt{e+fz}) \sqrt{bb+yy}$, pour $R(=\sqrt{e})b$, pour $T(=\sqrt{e+fz}) \sqrt{bb+yy}$, & pour $S(=\sqrt{fz})y$, sera $= \sqrt{bb+yy} - b \Big|_{\frac{b+\sqrt{bb+yy}}{y}}$; & si AC , supposé invariable $=z$, alors l'intégrale $\sqrt{bb+yz} - b \Big|_{\frac{b+\sqrt{bb+yz}}{z}}$ = l'arc APC ; & la différence de ces intégrales, par exemple, $\sqrt{bb+yz} - \sqrt{bb+yy} + b \Big|_{\frac{b+\sqrt{bb+yz}}{z}} - b \Big|_{\frac{b+\sqrt{bb+yy}}{y}} = CF - PG + AF \Big|_{\frac{AF+PG}{AP}} - AF \Big|_{\frac{AF+CF}{AC}} =$ à la longueur de la partie PC de la courbe; c'est-à-dire, que si à la différence $CF - PG$ des tangentes, vous ajoutez la différence des mesures du rapport de $AF + PG$ & AP , au module AF , & du rapport de $AF + CF$ & AC , au même module AF , le tout sera la longueur de la partie PC de la courbe.

Or parce que $AF \Big|_{\frac{AF+PG}{AP}} = AF \Big|_{\frac{AP}{PG-AF}}$, & $AF \Big|_{\frac{AF+CF}{AC}} = AF \Big|_{\frac{AC}{CF-AF}}$, (par la scholie, art. 14.) par consé-

quent

DES INFINIMENT PETITS. 81

quent si LM est la mesure du rapport de AC & $CF - AF$, au module AF , & de même lm , la mesure du rapport de AP & $PG - AF$, au module AF ; la somme des différences des tangentes $CF - PG$, & la différence des mesures $lm - LM$, sera = à la longueur de la partie PC de la spirale.

EXEMPLE VII.

46. Trouver la longueur de l'arc CP de la courbe logarithmique CPG .

Que AC , aP soient les ordonnées perpendiculaires à l'asymptote Af , & que CF , Pf , soient les tangentes : de même que n soit infiniment proche de P , tirez np parallèle à af . Fig. 36.

Nommez AC , z , aP , y , & la soutangente invariable AF , ou af , b . Maintenant à cause de la similitude des triangles aPf , npp , on a $AP(y) : fp(\sqrt{bb+yy}) :: np(dy) :$

$Pp = \frac{dy}{\sqrt{bb+yy}}$ = l'élément de la partie infinie PG de la courbe, qui étant comparé à la troisième forme des Tables de M. *Cotes*, donne pour intégrale (comme dans le dernier problème) $\sqrt{bb+yy} - b \left| \frac{b+y\sqrt{bb+yy}}{y} \right|$. De la même manière

on trouvera que l'élément de la partie infinie CPG , est $\frac{dz}{\sqrt{bb+zz}}$; & pour son intégrale $\sqrt{bb+zz} - b \left| \frac{b+\sqrt{bb+zz}}{z} \right|$;

& la différence de ces intégrales, par exemple, $\sqrt{bb+zz} - \sqrt{bb+yy} + b \left| \frac{b+\sqrt{bb+zz}}{z} - \frac{b+\sqrt{bb+yy}}{y} \right| = CF -$

$Pf + AF \left| \frac{AF+Pf}{AP} - \frac{AF}{AC} \right| \frac{AF+CF}{AC}$, ou (*) = $CF - Pf + AF \left| \frac{aP}{Pf - AF} - AF \left| \frac{AC}{CF - AF} \right| \right|$.

Maintenant si on prend AL égal à $CF - AF$, & al égal $Pf - AF$, & que LM , lm , soient tirés parallèles à Af ; alors par la propriété de la courbe, LM (= l'abscisse An) sera le logarithme du rapport de l'ordonnée AC , à l'ordonnée Mn , c'est-à-dire, de AC à AL ; par conséquent LM , est le logarithme de $\frac{AC}{CF - AF}$. De même lm est le logarithme de

L

* art. 14.

* art. 14. $\frac{AP}{PF-AP}$, & suposant la soutangente invariable AF , ou af (b) égal au module des logarithmes, la ligne LM (*) $= AF$ $\left| \frac{AF+CF}{AC} = AF \right| \frac{AC}{CF-AP}$; & $lm = AF \left| \frac{AF+Pf}{AP} = AF \right| \frac{AP}{Pf-Af}$; c'est pourquoi si à $cf-Pf$, différences des tangentes, vous ajoutez $lm-LM$, différences des parallèles, le tout fera égal à la longueur CP de la courbe.

EXEMPLE VIII.

47. Le sinus PM d'un arc quelconque PM d'un cercle, étant donné avec le rayon, trouver la longueur de cet arc.

Fig. 11. Que $AP=x$, le rayon $AC=1$, & le sinus ou l'ordonnée $PM=y$; par la propriété du cercle on a $AP \times PB = PM^2$, en retiens algébriques $2x-xx=yy$. Differentiant, on aura $2dx-2xdx=2ydy$ & $dx = \frac{ydy}{1-x}$, & quarrant viendra $dx^2 = \frac{y^2dy^2}{1-2x+xx} = \frac{y^2dy^2}{1-y^2}$; car par l'équation de la courbe $2x-xx=yy$; donc $\sqrt{dx^2+dy^2} = \sqrt{\frac{y^2dy^2}{1-y^2} + dy^2} = \sqrt{\frac{y^2dy^2+dy^2-yy^2}{1-y^2}} = \sqrt{\frac{dy^2}{1-y^2}} = \frac{dy}{1-y^2} = \frac{1}{1-y^2} dy$, élément de l'arc AM ; dont l'inregrale est $y + \frac{y^3}{3} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 5} y^5 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7} y^7 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 9} y^9 \&c.$ = à la longueur de l'arc AM .

Maintenant si l'on nomme le premier terme A , le second B , le troisième C , le quatrième D , &c. & que le second terme soit multiplié par $\frac{1}{3}$, le troisième par $\frac{1}{5}$, le quatrième par $\frac{1}{7}$ &c. la serie déjà trouvée se changera en celle-ci $y + \frac{1}{3} Ay^3 + \frac{3}{4 \cdot 5} By^5 + \frac{5}{6 \cdot 7} Cy^7 + \frac{7}{8 \cdot 9} Dy^9 \&c.$

Autrement.

Tirez le rayon CM , achevez le rectangle infiniment petit

DES INFINIMENT PETITS 83

PMnp, faites $AB=1$; & comme ci-devant $AP=x$, $PM=y$; alors $x-xx=yy$, & à cause que le petit triangle rectangle *Mmn* est semblable au triangle *PMC*, on aura $PM(\sqrt{x-xx})$: $MC(\frac{1}{2})$: : *Pp* ou *Mn(dx)* : $Mm = \frac{1}{2\sqrt{x-xx}} dx = \frac{\sqrt{x-xx}}{2x-2xx}$

$\times dx$ = à l'élément de l'arc *AM* ; dont l'intégrale sera $x^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{5} x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{40} x^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{112} x^{\frac{7}{2}} + \frac{1}{112} x^{\frac{9}{2}} \phi c.$ = $x^{\frac{1}{2}}$ multiplié par $1 + \frac{1}{5} x + \frac{1}{40} x^2 + \frac{1}{112} x^3 + \frac{1}{112} x^4 \phi c.$

Si le sinus du complément *PC*, est égal à x , & le rayon *Ac*=1 ; alors l'élément *Mm*, de l'arc *CD*, étant le complément de *AM*, au quart de cercle, sera $\frac{1}{\sqrt{x-xx}} dx$, ou $\frac{\sqrt{x-xx}}{x-xx} dx$; car puisque par la propriété du cercle $1-yy=xx$, qui étant différentié sera $-2ydy=2xdx$, & divisant chaque membre de l'équation par 2, on aura $ydy=x dx$, & $dy=\frac{x dx}{y}$, & $dy'=\frac{x' dx'}{y}=\frac{x' dx'}{1-xx}$; par conséquent $\sqrt{dx'+dy'}=\frac{\sqrt{x' dx'}}{1-xx}+dx' = dx\sqrt{\frac{1}{1-xx}}$, dont l'intégrale est $x+\frac{1}{5} x^3+\frac{1}{40} x^5+\frac{1}{112} x^7+\phi c.$ = à la longueur de l'arc *CD*.

S C H O L I E I.

Si l'arc *AM* (x) est donné dans les séries déjà trouvées, & qu'il faille trouver le sinus versé ou baze *AP* (x) ou le sinus *MP*. Pour trouver le sinus versé, extrayez la racine quarrée

de cette équation (*) $z=x^{\frac{1}{2}}+\frac{1}{5} x^{\frac{3}{2}}+\frac{1}{40} x^{\frac{5}{2}}+\frac{1}{112} x^{\frac{7}{2}} \phi c.$ * art. 1.
AP étant = x , & pour trouver le sinus *Pm* ; extrayez la racine quarrée de $z=xx+\frac{1}{5} x^3+\frac{1}{40} x^5+\frac{1}{112} x^7 \phi c.$ dans laquelle $PM=x$.

S C H O L I E II.

Cet exemple nous donne l'éclaircissement du theoreme de M. *Hugens* pour trouver la longueur d'un arc quelconque *AM* d'un cercle, ayant la corde *AM* de cet arc, & la corde *Am*, d'un arc égal à la moitié de la donnée. Voici

L ij

Fig. 37.

le theoreme $\frac{8Am-AM}{3} =$ l'arc AM à peu près.

Nommez le rayon AC, a , l'arc AM, z , la corde AM, A , & la corde Am de l'arc AM, B . Ce qui donne A ($=mp =$ à deux fois le sinus de $Am = \frac{1}{2}z$) $(*) = z - \frac{z^3}{4.6aa} + \frac{z^5}{4.4.12.aa^3} - \phi c$. & $B = \frac{1}{2}z - \frac{z^3}{2.16.6aa} + \frac{z^5}{2.16.16.120aa^3} - \phi c$. Maintenant multipliant B , par un nombre quelconque supposé n , & du produit soustrayés en A , & afin que le second terme $-\frac{nz^3}{2.16.6a} + \frac{z^5}{4.6aa}$ s'évanouisse, faites-le $= 0$; ce qui donnera $n=8$, ainsi $8B - A = 3z * - \frac{3. z^5}{64.120a^4} + \phi c$. c'est-à-dire, $\frac{8B-A}{3} = z$, l'erreur étant seulement de $\frac{z^5}{7680a^4} - \phi c$. de trop.

SCHOLIE III.

Fig. 38.

Si la perpendiculaire AP d'un arc MAm , est prolongée, & qu'il faille trouver dans cette ligne le point F , tel qu'ayant mené les lignes FME , & Fme , elles renferment la partie Ee de la tangente du cercle en A , à peu près égale à la longueur de l'arc Mm .

Que C soit le centre, le diametre $AG=a$, & la perpendiculaire $AP=x$; ce qui donne $PM (= \sqrt{ax-xx}) =$

$$a^{\frac{1}{2}}x^{\frac{1}{2}} - \frac{x^{\frac{3}{2}}}{2a^{\frac{1}{2}}} - \frac{x^{\frac{5}{2}}}{8a^{\frac{3}{2}}} - \frac{x^{\frac{7}{2}}}{16a^{\frac{5}{2}}} - \phi c. \text{ \& } AE (= \text{l'arc } AM) \\ = a^{\frac{1}{2}}x^{\frac{1}{2}} + \frac{x^{\frac{3}{2}}}{6a^{\frac{1}{2}}} + \frac{3x^{\frac{5}{2}}}{40a^{\frac{3}{2}}} + \frac{5x^{\frac{7}{2}}}{112a^{\frac{5}{2}}} + \phi c. \text{ Mais à cause de}$$

la similitude des triangles FMP, FEA ; on a $AE - PM$
 $(\frac{1x^{\frac{1}{2}}}{4a^{\frac{1}{2}}} + \frac{1x^{\frac{3}{2}}}{12a^{\frac{3}{2}}} + \frac{3x^{\frac{5}{2}}}{64a^{\frac{5}{2}}} \phi c.) : AP(x) :: AE(a^{\frac{1}{2}}x^{\frac{1}{2}} + \frac{x^{\frac{3}{2}}}{64a^{\frac{5}{2}}}$

$$+ \frac{3x^{\frac{5}{2}}}{40a^{\frac{3}{2}}} + \frac{5x^{\frac{7}{2}}}{112a^{\frac{5}{2}}} + \phi c.) : AF = \frac{3}{2}a - \frac{1}{2}x - \frac{12xx}{175a} - \text{ou} + \phi c.$$

DES INFINIMENT PETITS. 85

Supposons maintenant $AF = \frac{1}{2}a - \frac{1}{2}x$; ensuite faisant $AH = \frac{1}{2}AP$, (x) & $GF = HC$, une ligne droite tirée de F par M , & un autre par m , couperont la partie Ee , à peu de chose près égale à la longueur de l'arc MAm , l'erreur étant seulement de $\frac{2 \times 16a^3}{325a^3} \sqrt{ax} +$ ou $- \phi c$.

SCHOLIE IV.

Si l'on veut l'aire d'un segment MAm , d'un cercle dont on a besoin, le plus exactement qu'il soit possible; réduisez-la en une serie infinie, *par exemple*, que le segment MAm soit $= \frac{1}{2}a^{\frac{1}{2}}x^{\frac{1}{2}} - \frac{2x^{\frac{3}{2}}}{5a^{\frac{1}{2}}} - \frac{x^{\frac{5}{2}}}{14a^{\frac{1}{2}}} - \frac{x^{\frac{7}{2}}}{36a^{\frac{1}{2}}} \phi c$. à peu près égale à $\frac{1}{2}AM + PM \times \frac{1}{2}AP$, l'erreur étant seulement de $\frac{x^{\frac{1}{2}}}{70a^{\frac{1}{2}}} \sqrt{ax} + \phi c$. de moins.

Fig. 39.

EXEMPLE IX.

48. Rectifier l'élipse; ou, trouver la longueur d'une partie quelconque AM de cette courbe.

Que le demi grand axe AC soit a , son demi conjugué $Cc = b$, $AP = x$, & $PM = y$; par la propriété de la courbe on aura $\frac{AP \times Pa \times Cc^2}{AC^3} = PM^3$; c'est-à-dire, $\frac{bb}{aa} \times 2ax - xx = yy$; & prenant la difference de chaque membre de l'équation, on aura $2adx - 2xdx = \frac{2a^3}{b^3} \times ydy$, ou $adx - xdx = \frac{a^3}{b^3} \times ydy$, donc $dx = \frac{a^3}{b^3} \frac{ydy}{a-x}$, & quarrant chaque membre $dx^2 =$

Fig. 40.

$\frac{a^6 y^2 dy^2}{a^6 b^3 - 2ab^3x + b^3xx}$; & puisque par la propriété de la courbe $bb \times 2ax - xx = aayy$, & $b^4 \times 2ax - xx = aabyyy$; si on substitue $aabyyy$ pour son égal dans le dénominateur, on aura $dx^2 = \frac{a^6 y^2 dy^2}{a^6 b^3 - a^2 b^3 y^2} = \frac{a^4 y^2 dy^2}{b^3 - b^3 y^2}$, & ajoutant de part &

d'autre dy^2 ; on aura $dx^2 + dy^2 = \frac{a^2 y^2 dy^2}{b^4 - b^2 y^2} + dy^2 =$
 $\frac{a^2 y^2 dy^2 + b^4 dy^2 - b^2 y^2 dy^2}{b^4 - b^2 y^2} = \frac{b^4 + a^2 - b^2 \times y^2}{b^4 - b^2 y^2} \times dy^2$; & par consé-
 quent $\sqrt{dx^2 + dy^2} = \frac{dy}{b} \sqrt{\frac{b^4 + a^2 - b^2 y^2}{b^2 - y^2}}$ = à l'élément Mm ,
 de l'arc AM de l'ellipse ; & suposant $b=1$, $a^2 - bb$ ($=a^2 - 1$)
 $=c$; alors l'élément Mm de cet arc sera $dy \frac{\sqrt{1+c-y^2}}{1-y^2}$; & son
 integrale sera , suposant $n=1+c$; $y + \frac{n y^2}{3.1} + \frac{n^2 y^4}{5.1} - \frac{n^3 y^6}{7.3.1.1} -$
 $+ \frac{n^4 y^8}{7.1} - \frac{n^5 y^{10}}{7.3.1.1} + \frac{n^6 y^{12}}{7.3.1.1.1} \text{ &c.}$

Mais pour trouver la longueur de l'arc MC de l'ellipse , on
 peut s'y prendre de cette maniere ; soit $Pc=x$: & on aura
 $AC - PC \times \frac{Cc}{AC} = PM^2$, c'est-à-dire , $aa - xx \times \frac{bb}{aa} = yy$;
 donc $aa - xx \times \frac{bb}{aa} = yy$, differentiant chaque membre
 de l'équation , on aura $-2bbx dx = 2a^2 y dy$, ou $-bbx dx$
 $= a^2 y dy$, & $dx = \frac{a^2 y dy}{-bbx}$, & en quarrant chaque membre
 $dx^2 = \frac{a^4 y^2 dy^2}{b^4 x^2}$. Or par l'équation de la courbe on a $x^2 = aa -$
 $\frac{aa}{bb} y^2$; donc $b^4 x^2 = aab^4 - b^2 y^2$; & substituant $aab^4 - b^2 y^2$,
 pour $b^4 x^2$ dans le dénominateur ; & $dx^2 = \frac{a^4 y^2 dy^2}{aab^4 - a^2 b^2 y^2} =$
 $\frac{a^2 y^2 dy^2}{b^4 - b^2 y^2}$, ensuite ajoutant de part & d'autre dy^2 , on aura
 $dx^2 + dy^2 = (\frac{a^2 y^2 dy^2}{b^4 - b^2 y^2} + dy^2 = \frac{b^4 + a^2 y^2 - b^2 y^2}{b^4 - b^2 y^2} \times dy^2) =$
 $\frac{b^4 + a^2 - b^2 \times y^2}{b^4 - b^2 y^2} \times dy^2$; c'est pourquoi $\sqrt{dx^2 + dy^2} =$
 $\sqrt{\frac{b^4 + a^2 - b^2 y^2}{b^4 - b^2 y^2}} dy =$ à l'élément de l'arc MC , qui est le
 même que l'élément de l'arc AM , quand $AP=x$; ainsi
 l'integrale de celle-ci a la même expression que l'integrale
 de l'arc AM .

Si $aa=aa$, & $CP=x$, on aura la longueur de l'arc $MC =$
 $\frac{bb}{aa} \times \frac{x^3}{3a}$.

$$\begin{aligned}
& + \frac{\frac{bb}{aa} - \frac{b^2}{8a^2} \times \frac{x^2}{5a^2}}{\frac{1.2.3}{1.2.3} - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{b^2}{16a^4} \times \frac{x^2}{7a^2}} \\
& + \frac{\frac{bb}{aa} - \frac{b^2}{8a^2} + \frac{3b^2}{16a^4} - \frac{5b^2}{112a^6} \times \frac{x^2}{9a^2}}{\frac{1.2.3}{1.2.3} - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{b^2}{16a^4} \times \frac{x^2}{7a^2}}, \text{ \&c.}
\end{aligned}$$

Car $\frac{bb}{aa} \times aa - xx = yy$; & $\frac{b}{a} \times \frac{aa - xx}{a} = y$; donc $\frac{b}{a} \times \frac{aa - xx}{a} = y$; de même $\frac{bb}{aa} \times \frac{xx}{aa - xx} \times dx^2 = dy^2$, par conséquent $1 + \frac{bb}{aa} \times \frac{xx}{aa - xx} \times dx^2 = dx^2 + dy^2$; & l'élément de

l'arc MC , fera $1 + \frac{bb}{aa} \times \frac{xx}{aa - xx} \times dx^2$, qui étant réduit en une serie infinie, fera $1 + \frac{1}{2} \times \frac{bb}{aa} \times \frac{xx}{aa - xx} - \frac{1}{8} \times \frac{b^2}{a^2} \times \frac{xx}{aa - xx} + \frac{1}{12} \times \frac{b^2}{a^2} \times \frac{xx}{aa - xx} - \frac{1}{128} \times \frac{b^2}{a^2} \times \frac{xx}{aa - xx} \text{ \&c.} \times dx^2 =$

$$\begin{aligned}
& + \frac{1}{2} dx \times \frac{bb}{aa} \times \frac{x^2}{a^2} + \frac{x^2}{a^2} + \frac{x^2}{a^2} + \frac{x^2}{a^2}, \text{ \&c.} \\
& - \frac{1}{8} dx \times \frac{b^2}{a^2} \times \frac{x^2}{a^2} + \frac{1.2.3}{a^2} + \frac{x^2}{a^2}, \text{ \&c.} \\
& + \frac{1}{12} dx \times \frac{b^2}{a^2} \times \frac{x^2}{a^2} + \frac{3.2.3}{a^2}, \text{ \&c.} \\
& - \frac{1}{128} dx \times \frac{b^2}{a^2} \times \frac{x^2}{a^2}, \text{ \&c.}
\end{aligned}$$

& l'intégrale fera

$$\begin{aligned}
& + \frac{1}{2} \times \frac{bb}{aa} \times \frac{x^3}{3aa} + \frac{x^3}{3a^2} + \frac{x^3}{7a^2} + \frac{x^3}{9a^2}, \text{ \&c.} \\
& - \frac{1}{8} \times \frac{b^2}{a^2} \times \frac{x^3}{3a^2} + \frac{2.2.3}{7a^2} + \frac{x^3}{9a^2}, \text{ \&c.} \\
& + \frac{1}{12} \times \frac{b^2}{a^2} \times \frac{x^3}{7a^2} + \frac{3.2.3}{9a^2}, \text{ \&c.} \\
& - \frac{1}{128} \times \frac{b^2}{a^2} \times \frac{x^3}{9a^2}, \text{ \&c.}
\end{aligned}$$

étant égales aux series qu'on a proposées en premier lieu.

E X E M P L E X.

49. Rectifier l'hyperbole ; ou , trouver la longueur de l'arc *AM* de cette courbe.

Fig. 41.

Que le centre soit *C*, le grand axe *AA* (*2a*), son demi axe conjugué *Cc* (*b*), l'abscisse *AP* (*x*) & l'ordonnée correspondante *PM* (*y*). Maintenant la propriété de cette courbe est telle que $\frac{aP \times AP \times Cc}{aA} = PM$; c'est-à-dire, que $\frac{bb}{aa} \times 2ax - +xx$

$=yy$, différentiant chaque partie de l'équation, on aura

$$2adx + 2xdx = \frac{2a^2}{b^2} \times ydy, \text{ ou bien } adx + xdx = \frac{a^2}{b^2} \times ydy;$$

donc $dx = \frac{a^2 y dy}{b^2 \times a + x}$; & quarrant chaque membre de

l'équation $dx^2 = \frac{a^4 y^2 dy^2}{a^2 b^4 + 2ab^2 x + b^2 x^2}$. Or par la nature de la

courbe, $bb \times 2ax - +xx = ayy$, & $b^4 \times 2ax - +xx = a^2 b^2 y^2$; si on substitue $a^2 b^2 y^2$ pour $2ab^2 x - + b^2 x^2$, on aura $dx^2 =$

$$\frac{a^4 y^2 dy^2}{a^2 b^4 + a^2 b^2 y^2} = \frac{a^2 y^2 dy^2}{b^4 + b^2 y^2} ; \text{ ajoutant présentement de chaque}$$

côté dy^2 , vous aurez $dx^2 + dy^2 = \frac{a^2 y^2 dy^2}{b^4 + b^2 y^2} + dy^2 =$

$$\frac{b^4 + a^2 + b^2 \times yy}{b^4 + b^2 yy} \times dy^2. \text{ Par conséquent } \sqrt{dx^2 + dy^2} = \frac{dy}{b},$$

$$\frac{\sqrt{b^4 + a^2 + b^2 \times yy}}{b^4 + yy} = Mm, \text{ élément de la rectification de}$$

l'arc *AM* ; qui est tour-à-fait le même que celle de l'ellipse, dans le dernier exemple, excepté seulement que dans l'ellipse le signe du terme $b^2 yy$, est négatif, & qu'ici il est affirmatif ; par conséquent l'intégrale dans cet exemple est la même que celle de l'ellipse, ayant seulement les signes différens, comme par exemple dans ce cas-ci $a' + 1 = e$, & $e - 1 = n$.

Nota. Si l'hyperbole est équilaterale, alors $2ax - +xx = yy$, exprimera sa nature. Prenant sa différence on aura $2adx + 2xdx = 2ydy$, ou $adx + xdx = ydy$, & $dx =$

$$\frac{ydy}{a + x} ; \text{ quarrant chaque membre on aura } dx^2 = \frac{y^2 dy^2}{a^2 + 2ax + x^2} ;$$

& substituant yy ($= 2ax - +xx$) dans le dénominateur ; on

$$\text{aura } dx^2 = \frac{y^2 dy^2}{a^2 - yy}. \text{ Par conséquent, } \sqrt{dx^2 + dy^2} = dy$$

✓

DES INFINIMENT PETITS. 89

$\sqrt{\frac{a'-2y}{a'+y}}$ = l'élément de l'arc AM ; faisant $a=1$ =
 $dy\sqrt{\frac{1-2y}{1+y}}$; dont l'intégrale sera $y + \frac{y^2}{3.2} - \frac{y^3}{5.2} + \frac{y^4}{7.1.2.}$
 $-\frac{y^5}{7.1.2.1.2.}$, &c.

S C H O L I E.

Si dans l'élipse MAM , AG = au grand axe , & AQ = au Fig. 38.
 parametre , que QF soit pris = $\frac{1}{2} A Q \frac{19AG+21AQ}{10AG} \times AP$;
 & dans l'hyperbole , $QF = \frac{1}{2} A Q + \frac{19AG+21AQ}{10AG} \times AP$,
 & qu'on tire la sécante FME : alors la tangente AE est
 presque égale à l'arc AM de l'élipse ou de l'hyperbole , si
 elle n'est pas trop longue.

E X E M P L E X I.

50. Rectifier la cycloïde ; ou , trouver la longueur
 de l'arc AM de cette courbe.

Que $AQ=x$, $AB=1$; $Qq=MS=dx$, & par la pro- Fig. 16.
 priété du cercle $PQ=\sqrt{x-xx}$: ainsi $AP=\sqrt{x}=x^{\frac{1}{2}}$,
 & par la similitude des triangles APQ , Mms , on a AQ
 $(x) : AP (x^{\frac{1}{2}}) :: MS (dx) : Mm = x^{-\frac{1}{2}} dx$ = l'élément
 de l'arc AM , dont l'intégrale sera $2x^{\frac{1}{2}} = 2AP$ = à l'arc
 AM . Ainsi la longueur AD de la moitié de la cycloïde
 égale deux fois le diamètre AB du cercle generateur, ce que
 nous sçavons , par d'autres principes , être vrai.

E X E M P L E X I I.

51. Trouver la longueur d'un arc quelconque AM de la
 cissoïde de Diocles AMI .

Que AB diamètre du cercle generateur soit a , & nommé Fig. 42.
 PB , x , l'ordonnée PM , y , alors $AP=a-x$. Maintenant
 par la nature de la courbe $PM (y) = AP \times \sqrt{\frac{AP}{PB}}$, qui est
 $y = a-x \sqrt{\frac{a-x}{x}} = x^{-\frac{1}{2}} \times a-x$; & prenant la diffé-

M

rence de cette équation, viendra $dy = dx \times -\frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} \times \frac{1}{a-x} \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} \times a-x \right|^{\frac{1}{2}} = \frac{a-x}{2x} \sqrt{\frac{a-x}{x}} \times dx$; &c
 en le quarrant on aura $dy^2 = \frac{a^2 - 4ax + 4x^2}{4x^2} \times dx^2 = \frac{a^2 + 3ax - 4x^2}{4x^2} \times dx^2$. D'où il suit que $dx^2 + dy^2 = \frac{a^2 + 3ax}{4x^2} \times dx^2$; ainsi $\sqrt{dx^2 + dy^2} = \frac{adx}{2x} \sqrt{\frac{a+3x}{x}} = \frac{1}{2} ax^{-\frac{1}{2}} dx \times \sqrt{a+3x}$.

Présentement la comparant à la quatrième forme des Tables de M. Cotes $Dz^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{z^2}} dz \sqrt{e + f z^2}$, faisant $z=x$, $D=\frac{1}{2}a$, $e=-1$, $a=1$, $e=a$, $f=3$, on aura $P(\sqrt{\frac{e+fz^2}{z^2}}) = \sqrt{\frac{a+3x}{x}}$; $R(\sqrt{f}) = \sqrt{3}$; $T(\sqrt{\frac{e+fz^2}{z^2}}) = \sqrt{\frac{a+3x}{x}}$ & $S(\sqrt{\frac{e}{z^2}}) = \sqrt{\frac{a}{x}}$. Ainsi l'intégrale $-\frac{2}{9} DP + \frac{3}{9} DR \left| \frac{R+T}{S} \right|$, deviendra l'intégrale de la différentielle donnée $-\sqrt{\frac{a+3x}{x}} + a\sqrt{3} \left| \frac{\sqrt{3} + \sqrt{\frac{a+3x}{x}}}{\sqrt{\frac{a}{x}}} \right|$, ou $= -a$
 $\sqrt{\frac{a+3x}{x}} + 3\sqrt{\frac{1}{3}aa} \left| \frac{\sqrt{ax} + \sqrt{\frac{1}{3}aa} + \frac{1}{3}ax}{\sqrt{\frac{1}{3}aa}} \right|$.

Mais on doit changer cette intégrale pour qu'elle exprime l'arc AM .

Pour y parvenir, faites $x=a$, l'intégrale deviendra $-2a + 3\sqrt{\frac{1}{3}aa} \left| \frac{a + \sqrt{\frac{1}{3}aa}}{\sqrt{\frac{1}{3}aa}} \right|$, si maintenant on en retranche l'autre intégrale, on aura pour l'expression de la longueur de l'arc AM , $a\sqrt{\frac{a+3x}{x}} - 2a + 3\sqrt{\frac{1}{3}aa} \left| \frac{a + \sqrt{\frac{1}{3}aa}}{\sqrt{\frac{1}{3}aa} + \sqrt{ax}} \right|$, se ressouvénant que la soustraction du rapport $\frac{\sqrt{ax} + \sqrt{\frac{1}{3}aa} + \frac{1}{3}ax}{\sqrt{\frac{1}{3}aa}}$ du rapport $\frac{\sqrt{a+3x}}{\sqrt{\frac{1}{3}aa}}$ est une division de la dernière par la première.


DES INFINIMENT PETITS. 91

Pour construire présentement cette integrale ; tirez AC ($\sqrt{\frac{1}{3}aa}$) coupant l'asymptote en C , de maniere que CAB soit le tiers d'un angle droit ; que BD ($\sqrt{ax}$) soit moyen proportionnel entre AB (a) & PB (x) ; tirez ensuite CD , ($\sqrt{\frac{1}{3}aa - ax}$). De même tirez AE , coupant $PM = \frac{1}{3}a \sqrt{\frac{a+3x}{x}}$, & vous aurez l'arc AM de la cissoïde $= 2AE -$

$$2AB + 3BC \left| \frac{AB + AC}{BD + DC} = a \sqrt{\frac{a+3x}{x}} - 2a + 3\sqrt{\frac{1}{3}aa} \right|$$

$$\left| \frac{a + \sqrt{\frac{1}{3}aa}}{\sqrt{ax} + \sqrt{\frac{1}{3}aa - ax}} \right|$$





SECTION V.

*Usage du calcul integral dans la cubation des solides
& dans la quadrature de leurs surfaces.*

PROBLEME.

52. *Cuber ou mesurer la solidité d'un corps quelconque ,
formée par la révolution d'une figure plane
AMN , autour de l'axe AQ.*

Fig. 7.

Tirez l'ordonnée pm , infiniment proche de PM ; ensuite on peut prendre le parallelograme $PMmp$, pour le trapèze $PMmp$; par conséquent le cylindre formé par le petit parallelograme $PMmp$, pendant que la figure ANQ se meut autour de l'axe AQ , peut être pris pour l'élément de la portion du solide, formé par la circonvolution de la portion AMP de cette figure plane ; & l'intégrale de cet élément sera égal à la solidité de cette portion conçue , comme composée d'un nombre infini de cylindres , chacun d'une hauteur infiniment petite.

Faites $AM=x$, $PM=y$, & que le raport du rayon du cercle à la circonférence, soit exprimé par $\frac{r}{p}$. Alors la circonférence du cercle décrit par le rayon PM sera $=\frac{p}{r}$, & l'aire dudit cercle sera $\frac{p}{2r}y^2$, qui étant multiplié par $Pp(dx)$ deviendra $\frac{p}{2r}y^2 dx$ à la solidité dudit cylindre $PMgp$, ou ce qui est la même chose à l'élément de la portion du solide ; & si pour y^2 , vous substituez sa valeur prise dans l'équation de la courbe AMN , vous aurez une expression différentielle affectée d'une seule quantité inconnue x , dont l'intégrale exprimera la solidité cherchée.

E X E M P L E P R E M I E R.

53. *Cuber un cone droit.*

Un cône droit peut être formé par la révolution d'un triangle rectangle ABC , autour de son côté ou axe AB . Fig. 43.
 Supposons maintenant $AB=a$, $BC=r$, $AP=x$, $PM=y$,
 alors à cause des triangles semblables APM , ABC ; $AP(x)$:
 $PM(y) :: AB(a) : BC(r)$; donc $\frac{r}{a}x = y$; & quarrant cha-
 que membre $\frac{r^2 x^2}{a^2} = yy$. C'est pourquoi $\frac{p' dx}{2r}$ (= l'élément
 du (*) solide) = $\frac{p' x^2 dx}{2a^2 r} = \frac{p r x^2 dx}{2a^2}$, (substituant $\frac{r}{a}x$ pour y)
 = à l'élément de la solidité de la partie du cone formé par
 le triangle APM , dont l'intégrale = $\frac{p r x^3}{6a^2}$ = à la solidité de
 la partie du cone, & si vous substituez a pour x , la solidité
 de tout le cone sera $\frac{p r a^3}{6a^2} = \frac{1}{6} apr \times \frac{1}{3} a = \frac{1}{6} pr \times \frac{1}{3} a$, c'est-
 à-dire, qu'il faut multiplier la baze par $\frac{1}{3}$ de la hauteur.

E X E M P L E I I.

54. *Mesurer la solidité de la sphere, ou une portion
quelconque d'icelle.*

La sphere est formée par la révolution d'un demi-cercle ABa , autour de son axe ou diametre ACa , que le rayon $AC=r$, $AP=x$, $PM=y$, ensuite par la propriété du
 cercle generateur $yy=2rx-xx$, donc $\frac{p' dx}{2r} = \frac{2prx dx - px^2 dx}{2r}$
 = à l'élément du segment de la sphere formé par la revo-
 lution du demi segment du cercle APM , dont l'intégrale =
 $\frac{3prx^2 - px^3}{6r}$ = la solidité du segment AMm ; & si on substi-
 tué tout le diametre $2r$, à la place de x , la solidité de toute
 la sphere sera = $\frac{12pr^2 - pr^3}{6r} = 2pr^2 - \frac{1}{2} pr^2 = \frac{3}{2} pr^2 = 2pr$
 $\times \frac{1}{2} r$; c'est-à-dire, qu'il faut multiplier par $(\frac{1}{2} r)$ du
 rayon ou $\frac{1}{2}$ du diametre, le rectangle du diametre $2r$, &

Fig. 44.

de la circonference p ; & si le diametre $2r=1$, alors la solidité de la sphere $=\frac{1}{2}p$.

COROLLAIRE I.

Il suit de-là qu'une sphere est égale à une piramide quadrangulaire, dont la baze est le rectangle produit par le diametre de la sphere $2r$, & par la circonference du cercle, dont la hauteur est égale au tiers du demi-diametre de la sphere.

COROLLAIRE II.

Puisque la solidité d'un cylindre circonscrit à une sphere est pr^2 ; ainsi elle est à la sphere, comme pr^2 est à $\frac{1}{2}pr^2$, ou comme $3pr^2$ à $2pr^2$, ou comme 3. à 2.

EXEMPLE III.

55. Si $EDBF$ est un cylindre droit, & que la partie $DBMAF$, soit coupé par un plan DFA passant par le centre C de la baze inferieure, & par F extremité du diametre FD de la superieure; on demande à mesurer ou cuber cette partie $DBMAF$, qu'on appelle l'onglet.

Fig. 45.

Que AD , soit perpendiculaire à $BE=2r$, tirez CF , & d'un point quelconque P , dans AD , tirez PM , parallele à CB , & PN , parallele à CF , joignez les points M , N , & nommez la hauteur FB , a . Maintenant un triangle quelconque PMN , rectangle en M , formé comme nous venons de dire, est semblable au triangle rectangle CBF . Cela supposé, nommez CP , x ; ensuite on aura $\overline{PM} = \overline{rr - xx}$; & $CB(r):BF(a)::PM(\sqrt{rr-xx}):MN=\frac{a}{r}\sqrt{rr-xx}$; & l'aire du triangle PMN , est $\frac{1}{2}PM \times MN = \frac{a}{2r} \times \overline{rr - xx}$, qui étant multiplié par $Pp(dx)$ fera $\frac{ar dx - ax^2 dx}{2r}$ = l'element de la partie $APMN$ de l'onglet; dont l'integrale fera $\frac{arx}{2} - \frac{ax^3}{6r}$ = à la solidité de cette même p partie $APMN$ & lorsque $x=r$, alors cette dernière expression fera $\frac{1}{2}ar^2$ =

DES INFINIMENT PETITS. 95

à la solidité de la moitié de l'onglet, & par conséquent toute la solidité entière $= \frac{2}{3} ar^2$.

E X E M P L E I V.

56. *Mesurer un solide formé par la révolution de la partie FmM de la lunulle d'Hypocrate FAD, autour du rayon ED comme axe.*

Tirez la tangente Aa; nommez le rayon CE, 1; alors le rayon CA est $\sqrt{2}$: de même faites $EP=x$, l'ordonnée $PM=y$, & $Pm=z$; alors $\overline{CA}^2 - \overline{CP}^2 = \overline{PM}^2$; par la propriété du cercle; c'est-à-dire, en termes algebriques $2 - 1 - 2x - xx (= 1 - 2x - xx) = yy$; & $\overline{ED}^2 - \overline{EP}^2 = \overline{Pm}^2$, ou bien, $1 - xx = zz$, d'où l'aire du cercle décrit par PM, sera $\frac{1-xx-yy}{2r}$; & l'aire du cercle décrit par Pm sera $\frac{1-xx-zz}{2r}$, & la différence de ces aires sera $\frac{yy-zz}{r} =$ à l'anneau décrit par Mm; & multipliant cette expression par la différentielle dx , on aura $\frac{y^2 dx}{r} =$ à l'élément de la partie du solide décrit par la partie FmM de la lunulle; dont l'intégrale sera $\frac{y^2 x}{2r} =$ à la solidité de cette même partie.

Fig. 46.

E X E M P L E V.

57. *Cuber, ou mesurer un conoïde parabolique formé par la révolution d'un espace parabolique d'un ordre quelconque autour de son axe.*

Que le parametre $= 1$; que $AD=a$, $BD=r$, $AP=x$, $PM=y$. Maintenant la nature de toutes les paraboles s'exprime en general par $y^m=x$, d'où $y=x^{\frac{1}{m}}$; donc $yy=x^{\frac{2}{m}}$; par conséquent $\frac{y^2 dx}{2r} = \frac{y^2 x^{\frac{2}{m}} dx}{2r} =$ l'élément du solide formé par la révolution de la partie APM de la parabole; dont

Fig. 1.

l'intégrale sera $\frac{mp}{2m+4 \times r} \times \frac{m+1}{m}$; & substituant $y^1 x$ pour $x^{\frac{m+1}{m}}$ son égal , on aura $\frac{m p y^1 x}{4+2m \times r} =$ l'intégrale de ce même solide.

Si l'on substitue a , hauteur de tout le conoïde pour x ; & $2r$, diamètre de la baze pour $2y$; alors la solidité de tout le conoïde sera $\frac{m p r^1 a}{4+2m \times r} = \frac{m}{4+1 \times m} \times a p r = \frac{1}{2} p r \times \frac{m a}{2+m}$.

Il suit de-là que si la parabole ordinaire est la courbe generatrice du conoïde ; alors $m=2$, donc $\frac{m}{2+m} = \frac{2}{2+2} = \frac{1}{2}$. D'où il suit qu'il faut multiplier la baze par la moitié de la hauteur ; par conséquent le conoïde formé sera la moitié d'un cylindre de même baze & hauteur.

E X E M P L E V I.

58. *Cuber un spheroidé formé par le mouvement d'un espace semi-élliptique autour de son grand ou petit axe.*

Fig. 40.

Faites $AP=x$, $PM=y$ & $Aa=a$, que le parametre $=b$; après quoi vous aurez $PM^2 = AP \times b - \frac{AP^2 \times b}{Aa}$; c'est-à-dire , $yy = bx - \frac{b x^2}{a}$, pour exprimer la nature ou la pro-

priété de l'éllipse. Par conséquent (*) $\frac{p y^1}{2r} dx = \frac{p b x}{2r} - \frac{p b x^2}{2r a}$ $\times dx = \frac{p^1 b x}{2r} dx - \frac{p^1 b x^2}{2r a} dx$, élément du solide formé par la révolution de la partie de l'éllipse APM ; & l'intégrale de cet élément sera $\frac{p^1 b x^2}{4r} - \frac{p^1 b x^3}{6ar} =$ audit solide.

Si l'on substitue tout l'axe a , à la place de x , tout le spheroidé sera $\frac{p^1 b a^2}{4r} - \frac{p^1 b a^3}{6ar} = \frac{6 p^1 b a^2 - 4 p^1 b a^3}{24r} = \frac{p^1 b a^2}{12r}$.

D'où il suit que si l'axe conjugué $Cc=2r$, alors on aura $4r^2=ab$; ainsi la solidité de tout le spheroidé $= \frac{1}{12} p a r$; c'est-à-dire ,

à-dire, un sphéroïde elliptique est égal à un cône qui a pour sa hauteur le grand axe a de l'ellipse, & pour le diamètre de sa baze quatre fois l'axe conjugué, sçavoir $4r$; & parce que la hauteur d'un cylindre circonscrit à un sphéroïde étant a , le diamètre $= r$, la solidité de ce cylindre sera $\frac{1}{2} apr$; & par conséquent un sphéroïde, aussi-bien qu'une sphere, est les $\frac{2}{3}$ du cylindre circonscrit.

Autrement.

On peut abréger cet exemple ainsi; que $r=1$, l'expression generale (*) $\frac{p^2}{2r} dx$, deviendra $\frac{p^2}{2} dx$. * art. 52.

Faites $Cc=1$, $AC=a$, & $PC=x$, l'équation de l'ellipse sera $1 - \frac{x^2}{aa} = yy$; & substituant $1 - \frac{x^2}{aa}$ pour yy , dans cette même expression generale; on aura $\frac{p^2}{2} dx = \frac{p}{2} dx - \frac{px^2}{2aa} dx =$ l'élément de la partie du sphéroïde formé par la révolution de la partie $MPcC$ de l'ellipse, & pour son integrale on aura $\frac{px}{2} - \frac{px^3}{6aa} = \frac{p}{2} \times x - \frac{x^3}{3aa} =$ la solidité de ladite partie du sphéroïde; & substituant a pour x , on aura $\frac{p}{2} \times a - \frac{a^3}{3} = \frac{p}{2} \times \frac{3a-a}{3} = \frac{1}{3} a \times \frac{p}{2}$; mais $\frac{p}{2} =$ au cercle formé par la révolution de Cc ; par conséquent la solidité du sphéroïde $=$ au $\frac{2}{3}$ du cylindre de même baze & de même hauteur.

E X E M P L E V I I.

59. Cuber, ou mesurer la solidité d'un conoïde hyperbolique, formée par la révolution d'une demie hyperbole autour de son grand axe.

Que $AP=x$, $PM=y$, le parametre $=b$, & le grand axe $=a$. L'équation qui exprime la nature de la courbe, est $AP \times b + \frac{AP \times b}{Aa}$; c'est-à-dire, $y^2 = bx + \frac{bx^2}{a}$; ainsi $\frac{p^2}{2r} dx = \frac{pbx}{2r} + \frac{p^2 dx^2}{2ra} =$ à l'élément du conoïde formé par la révolution de la partie APM de l'hyperbole autour

N

Fig. 41.

de son axe Aa , dont l'intégrale sera $\frac{p^2 x^2}{4r} + \frac{p^2 x^2}{6ra} =$ à la solidité du même conoïde ; & quand la hauteur du conoïde $= a$, c'est-à-dire, quand $x=a$, on a pour la solidité du conoïde $\frac{6p^2 a^3 + 4p^2 a^3}{24r} = \frac{10p^2 a^3}{24r} = \frac{5p^2 a^3}{12r}$; & si l'axe conjugué $= 2r$, alors $2r = \sqrt{ab}$, & $4r^2 = ab$; & si vous substituez cette valeur dans la dernière expression, la solidité du conoïde sera $\frac{5}{12} par$ (*).

Quand l'hyperbole est équilaterale, son équation sera $y' = ax - \frac{1}{x}$, ce qui donne $\frac{py'}{2r} dx = \frac{apx dx - \frac{1}{x} dx}{2r}$; dont l'intégrale sera $\frac{apx^2}{4r} - \frac{p}{6r}$, & par la même raison $2r$ étant dans ce cas $= a$, & $b=a$, la solidité sera $\frac{5}{6} pa^2$.

Il suit de-là que la solidité du cylindre circonscrit est $\frac{1}{2} par$, qui par conséquent est à la solidité du conoïde, comme $\frac{1}{2} par$ est à $\frac{5}{6} par$, ou comme 3 à 10 ; & dans le conoïde formé par l'hyperbole équilaterale, le cylindre circonscrit est $\frac{1}{2} pa^2$; donc ce même cylindre est au conoïde comme $\frac{1}{4} pa^2$ est à $\frac{5}{6} pa^2$, ou comme 3 à 10.

Faites $PC=x$, & $Cc=1=r$, $Ac=a$, comme ci-devant dans l'ellipse, l'équation de l'hyperbole sera $yy' = \frac{xx}{aa} - 1$, d'où $\frac{py'}{2} dx = \frac{px^2}{2aa} - \frac{p}{2} dx$; dont l'intégrale sera $\frac{px^3}{6aa} - \frac{px}{2}$, & parce que x ne commence point à A , il faut faire $x=a$; alors cette intégrale se changera en celle-ci $\frac{pa^3}{6} - \frac{pa}{2}$, qui étant retranchée de la première, donnera $\frac{px^3}{6aa} - \frac{px}{2} + \frac{pa}{2} =$ le solide formé par la révolution de la partie AMP de l'hyperbole.

(*) Ce n'est que dans cette supposition ; car si on prend d'autres points dans la courbe, le rapport changera.



E X E M P L E V I I I.

60. *Cuber un solide formé par la révolution d'un espace hyperbolique infini CABED, autour d'une de ses asymptotes CD.*

Que $AB=a$, $AC=b$, $CP=x$, $PM=y$, & que $Pf=$ Fig. 47.
 dx ; ensuite que la circonférence du cercle décrit par le rayon $AC=p$, & celle que décrit le rayon $PC=\frac{p^2}{a}$, qui multiplié par PM (y) donne $\frac{p^2 y}{a}$, pour la superficie d'un cylindre formé par le parallélogramme $CPMR$, qui multiplié de nouveau par Pp (dx) donne la solidité du petit cylindre $Pp q M$, c'est-à-dire, $\frac{p^2 y}{a} dx =$ l'élément du solide; mais la nature de l'hyperbole par rapport à ses asymptotes, est exprimée par $xy=ab$, donc $y=\frac{ab}{x}$ & $\frac{p^2 y}{a} dx = \frac{p^2 ab x}{ax} dx = p b dx$; dont l'intégrale est $p b x =$ à la solidité de l'espace infini $CABED$; & si on substitue a pour x , toute la solidité entière sera $p b a$.

E X E M P L E I X.

61. *Cuber, ou mesurer la solidité d'un conoïde formé par la révolution de l'espace hyperbolique AMBDC, autour de CD, moitié de l'axe conjugué de l'hyperbole AMB.*

Nommez CA, a , CD, b , CP, x , PM, y , BD, r ; Fig. 48..
 maintenant $\frac{r}{x}$ est le circuit décrit par le point M , & $\frac{r^2 y}{2x}$ est égal à tout le cercle qui a PM pour rayon; qui étant multiplié par dx , donne $\frac{r^2 y}{2x} dx$, pour l'élément du solide. Mais par la propriété de la courbe $yy = \frac{aaxx - + aabb}{bb}$; substituant la valeur de yy dans $\frac{r^2 y}{2x} dx$, on aura $\frac{aapaxdx - + aabbpdx}{2bbx}$ pour l'élément du conoïde, dont l'intégrale $= \frac{aapx^2}{6bbx} + \frac{aapx}{2x}$, & substituer N ij

tuant $\frac{bby}{xx+bb}$ pour aa , il viendra $\frac{px^2y}{6rxx+6bbr} + \frac{bpyy}{2rxx+2bbr}$
 $\equiv$ à la solidité du conoïde formé par l'espace $AMPQ$; &
 quand $x=b$, & $y=r$, alors tout le conoïde $\equiv \frac{bpr}{3}$.

COROLLAIRE.

Un cylindre formé par la révolution du parallélograme $ACSB$, autour de l'axe CS , est $\frac{1}{2} pba$; ainsi il est à ce solide hyperbolique comme $\frac{1}{2} pba$, est à pba , c'est-à-dire, comme $\frac{1}{2}$ est à 1, ou comme 1 à 2.

EXEMPLE X.

62. *Mesurer un solide formé par la révolution d'une parabole autour de sa demie-ordonnée CB.*

Fig. 49. Supposons $AB=r$, $BC=b$, $AP=x$, $PM=y$; ensuite si on suppose que le parametre $\equiv 1$, l'équation qui exprime la nature de la parabole, est $y^2=x$, & comme il est évident
 * art. 52. (*) que l'élément de ce solide est le cercle décrit par le rayon MD multiplié par $Dd=dy$. Que le rapport du rayon à la circonférence soit comme r à p ; mais $MD=PD=AB-AP=r-x$. La circonférence du cercle décrit par MD , est $\equiv p - \frac{px}{r}$, & l'aire de ce même cercle est $\frac{p^2}{2} - px + \frac{px^2}{2r}$, d'où l'élément ou la différence du solide est $\frac{p^2 dy}{2} - pxdy + \frac{px^2 dy}{2r}$.

Maintenant si au lieu de x & de x^2 , vous substituez leurs valeurs y^2 & y^4 , prises de l'équation de la courbe, vous aurez $\frac{p^2 dy}{2} - py^2 dy + \frac{py^4 dy}{2r} =$ l'élément de la partie indéfinie du solide formé par la révolution de la portion MCD , autour de l'axe BC ; dont l'intégrale sera $\frac{1}{2} pry - \frac{py^3}{3} + \frac{py^5}{10r} =$ à la solidité de ladite partie.

* art. 52. Mais si au lieu de y^2 vous substituez x , sa valeur dans l'expression générale (*) la même solidité donnera $\frac{1}{2} pry - \frac{px^2}{3} + \frac{px^3}{10r} = p \times \frac{1}{2} ry - \frac{x^2}{3} + \frac{x^3}{10r}$; & si vous substituez b ,

DES INFINIMENT PETITS. 101

pour y , & r pour x , tout le solide sera $p \times \frac{1}{2} br - \frac{1}{2} br + \frac{1}{10} br = 30 - 20 + 6 \times \frac{pbr}{60} = \frac{8}{10} pbr = \frac{1}{2} pr \times \frac{8}{10} b$; c'est-à-dire, que la baze, ou, ce qui est la même chose, le cercle décrit par le rayon AB , doit être multiplié par $\frac{8}{10}$ de la hauteur BC .

Or un cylindre de même baze & hauteur est $\frac{1}{2} pbr$, donc il est à ce solide parabolique comme $\frac{1}{2} pbr$ est à $\frac{1}{2} pbr \times \frac{8}{10}$; c'est-à-dire, comme 1 à $\frac{8}{10}$, ou comme 15 est à 8.

E X E M P L E X I.

63. *Cuber, ou, mesurer un solide formé par la révolution de la courbe logarithmique autour de son asymptote AH.*

Dans cette courbe la sous-tangente étant toujours invariable $= a$, $ydx = ady$; donc $dx = \frac{ady}{y}$. D'où il suit que $\frac{p^2 dx}{2r} = \frac{paydy}{4r}$ = l'élément d'une partie du solide formé comme il vient d'être dit, dont l'intégrale sera $\frac{pay^2}{4r}$; substituant $r = AB$, au lieu de y , on aura pour le solide entier $\frac{pay^2}{4r} = \frac{1}{2} apr$.

Il suit de-là que puisqu'un cylindre dont la hauteur $= a$, & dont le rayon de la baze $= r$, est $\frac{1}{2} apr$; par conséquent ce cylindre est au solide comme $\frac{1}{2} a$ est à $\frac{1}{2} a$, ou bien comme 2 est à 1.

E X E M P L E X I I.

64. *Cuber un solide formé par la révolution de la cissoïde autour de la ligne AB comme axe.*

Que $AB = 1$, $AP = x$, $PM = y$; par la nature de la courbe on aura $y' = \frac{x^2}{1-x}$, ainsi $\frac{p^2}{2r} dx = \frac{px^2}{2r \times 1-x} dx$; c'est-à-dire, (faisant $2r = AB = 1$) $= \frac{px^2}{1-x} dx$, dont l'intégrale sera $\frac{1}{2} px^4 + \frac{1}{2} px^5 + \frac{1}{6} px^6 + \frac{1}{2} px^7$ &c. = à la portion du solide décrit par APM ; & substituant $AB = 1$, pour x , il viendra

Fig. 12.

Fig. 17.

$\frac{1}{2}p + \frac{1}{2}p + \frac{1}{2}p + \frac{1}{2}p + \frac{1}{2}p$ &c. ou $p \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$, &c. mais cette série est infinie, comme il est aisé de le démontrer par la nature de l'hyperbole, donc le solide est infini par la même raison.

Autrement.

Par la mesure d'un rapport.

Si l'aire APM de la cissoïde de Diocles, se meut autour de la baze AB comme axe, on demande la mesure du solide qui en résultera.

Fig. 50. Par la propriété de la courbe, nommant AP , x , & PM , y , on aura $x\sqrt{\frac{x}{a-x}} = y$, d'où il suit que $\frac{y}{x} dx = \frac{p}{2r} dx$ $\frac{x^1}{a-x}$ = élément du solide requis, qui comparé à la première forme des Tables de M. Costes, faisant $D = \frac{p}{2r}$, $g = 4$, $n = 1$, $e = a$, $f = -x$; donnera $-\frac{px^1}{6r} - \frac{pax}{4r} - \frac{pax}{2r} - \frac{pa^1}{2r} \Big| \frac{a-x}{a}$ pour l'intégrale de la différentielle donnée; ou bien $\frac{px^1}{6r} - \frac{pax^1}{4r} - \frac{pax}{2r} + \frac{pa^1}{2r} \Big| \frac{a}{a-x}$; puisque le logarithme de a , à $a-x$, avec le signe affirmatif, est le même que celui du rapport de $a-x$ à a , avec le signe négatif.

On peut construire cette intégrale de la manière suivante :

Que $AP(x)$, $AB(a)$, $AR(\frac{aa}{x})$, $AS(\frac{a^1}{xx})$, $AT(\frac{a^1}{x^1})$ soient en proportion continuë. Ensuite au module $TS(\frac{a^1-a^1x}{x})$ prenez PX égal à la mesure du rapport qui est entre $AB(a)$ & $PB(a-x)$; c'est-à-dire, faites $PX = \frac{a^1-a^1x}{x} \Big| \frac{a}{a-x}$; & de X vers B , faites XZ égale à $SR + \frac{RB}{2} + \frac{BQ}{3} = \frac{a^1-a^1x}{xx} + \frac{aa-ax}{2x} + \frac{a-x}{3}$, & le solide sera égal à un cylindre dont la baze est PM , dont la valeur est $\frac{px^1}{2r \times a-x}$, & dont la hauteur PZ aura pour sa valeur $-\frac{a^1-a^1x}{xx} - \frac{aa-ax}{2x} - \frac{a-x}{3} +$

DES INFINIMENT PETITS. 103

$$\frac{a'-a''x}{x^2} \bigg| \frac{a}{a-x} ; \text{ par conséquent } \frac{p}{2r} \times \frac{x^2}{a-x} \times - \frac{a'-a''x}{xx} - \\ \frac{a''-a'''x}{2x} - \frac{a''-a'''x}{3} + \frac{a'-a''x}{x^2} \bigg| \frac{a}{a-x} = - \frac{px^2}{6r} - \frac{pax}{4r} - \frac{pax}{2r} + \\ \frac{p^2}{2r} \bigg| \frac{a}{a-x} , \text{ qui est l'intégrale qu'il falloit construire.}$$

SCHOLIE.

65. La valeur du solide infini formé par la révolution de la cissoïde *AMI*, autour de l'asymptote *BOH*, peut se trouver de cette façon : Que *ANB* soit le demi-cercle generateur, *AP*, *x*, *AB*, *a*, alors toutes les ordonnées *PM* décriront des surfaces cylindriques. Par conséquent *r* : *p* :: *PB* × *PM* (*x* √ *ax* − *xx*) : $\frac{px}{r} \sqrt{ax-xx} =$ à la surface décrite par *PM* ; lequel multiplié par *dx* deviendra $\frac{pdx}{r} \sqrt{ax-xx}$ qui sera l'élément du solide formé comme nous l'avons déjà expliqué.

Fig. 50.

Pour trouver présentement l'intégrale de cette différentielle, concevons que le demi-cercle generateur circule autour d'un axe parallèle à l'asymptote *BOH*, &c que dans ce mouvement il passe par le point *A* ; alors toutes les ordonnées *PN*, décriront aussi des surfaces cylindriques ; ainsi $\frac{p}{r} x dx \sqrt{ax-xx}$ sera l'élément du solide formé par ce mouvement, qui est égal à l'élément du premier solide qu'il falloit cuber ou mesurer ; dont le solide cissoïdale infini, formé suivant la révolution qui vient d'être dite, est égal au dernier solide formé par la révolution du demi-cercle generateur, autour d'une ligne droite parallèle à son asymptote, passant par le point *A*.

PROBLEME II.

66. Mesurer la superficie d'un solide formé par la révolution d'une figure *AMN* *Q*, autour de son axe *AQ*.

Que le raport de la circonference au diamètre d'un cercle quelconque soit $\frac{r}{p}$: que *AP* = *x*, *PM* = *y* ; ensuite vous

Fig. 7.

aurez $Pp=Mq=dx$, $qm=dy$; donc $Mm=\sqrt{dx^2+dy^2}$; la circonference décrite par le rayon $PM=\frac{p}{r}$, qui multiplié par Mm , est égal à $\frac{p}{r} \sqrt{dx^2+dy^2}$ = à l'élément d'une partie de la superficie du solide formé par la révolution de la partie AMP de la figure $AMN.Q$; substituant maintenant la valeur de dx^2 qu'on trouvera par l'équation de la courbe différenciée, l'intégrale de cette expression donnera la superficie cherchée.

S C H O L I E.

67. Si $\frac{p}{r} \sqrt{dx^2+dy^2}$ est l'élément d'une superficie formée par la révolution d'une figure plane autour de la ligne x , comme axe; & si $\frac{p}{r}$ exprime le rapport du rayon à la circonference du cercle, & que y représente une ordonnée quelconque perpendiculaire à l'abscisse décrivant un cercle pendant la révolution qui forme cette superficie; & si on suppose que $\frac{p}{r} z z$, est l'intégrale de cet élément, je veux dire égal à un cercle dont le rayon est z ; alors l'intégrale de $zy\sqrt{dx^2+dy^2}$ = $z z$, carré du rayon dudit cercle. Par conséquent, si au lieu de trouver l'intégrale de l'élément $\frac{p}{r} \sqrt{dx^2+dy^2}$, d'une superficie quelconque formée comme nous venons de dire, on trouve l'intégrale de $zy\sqrt{dx^2+dy^2}$; cette intégrale sera égale au carré du rayon du cercle égal à l'intégrale de l'élément $\frac{p}{r} \sqrt{dx^2+dy^2}$, ou à un cercle égal à cette superficie, dont cette dernière expression est l'élément.

E X E M P L E I.

68. *Trouver la superficie d'un cone droit.*

Fig. 43.

Un cone droit étant formé par la révolution d'un triangle rectangle ABC , autour de son axe AB , il faut d'abord trouver la valeur de dx^2 , par l'équation au triangle: ainsi soit $AB=a$, $BC=r$, $AP=x$, $PM=y$, & par la propriété des triangles rectangles $AP(x):PM(y):AB(a):BC(r)$;

par

DES INFINIMENT PETITS. 105

par conséquent $rx=ay$, qui étant différentiée, donne $r dx = a dy$, donc $dx = \frac{a dy}{r}$, & $dx^2 = \frac{a^2 dy^2}{r^2}$; substituant à present $\frac{a^2 dy^2}{r^2}$ pour dx^2 dans l'expression generale $\frac{r}{r} \sqrt{dx^2 + dy^2}$, on aura $\frac{r}{r} \sqrt{\frac{a^2 dy^2}{r^2} + dy^2} = \frac{r}{r} \sqrt{a^2 dy^2 + r^2 dy^2} = \frac{r}{r} \times dy \sqrt{a^2 + r^2} =$ l'élément d'une partie de la surface conique, formée par la révolution du triangle APM , dont l'intégrale fera $\frac{r}{2r} \sqrt{a^2 + r^2} =$ à cette même partie de la superficie; & substituant y pour r , toute la superficie entiere du cone sera $= \frac{1}{2} p \sqrt{a^2 + r^2} = \frac{1}{2} p \times AC$; c'est-à-dire, égale au rectangle formé par la moitié de la circonference de la baze, & par le côté AC du cone.

E X E M P L E I I.

69. *Trouver la superficie d'une sphere, ou celle d'un de ses segmens quelconque.*

Si le diametre du cercle generateur $= 1$, alors l'élément de l'arc $Mm = \frac{dx}{2\sqrt{x-xx}}$, qui étant multiplié par la circonference décrite par le rayon PM , donnera $p dx$ pour l'élément d'une partie de la superficie de la sphere formée par le demi-segment AMP ; & l'intégrale $p x$ de cette différentielle sera la superficie du segment de la sphere ayant p , pour peripherie ou circonference de la baze circulaire, & x pour hauteur; & si vous substituez le diametre de la sphere 1 pour x , toute la superficie de cette sphere sera égale à p , ou (faisant $1=a$) $=ap$.

Fig. 45.

Il suit de-là que la superficie d'un segment quelconque de la sphere, est à la superficie de la sphere entiere comme $p x$ est à p , ou x à 1, c'est-à-dire, comme la hauteur du segment est au diametre de la sphere.



EXEMPLE III.

70. *Trouver la superficie d'un conoïde parabolique.*

L'équation qui exprime la nature de la parabole est $AP \times a = PM^2 (yy)$ ou $ax = yy$, qui étant différentié, donne $adx = 2ydy$; d'où il suit que $dx = \frac{2ydy}{a}$; par conséquent $\frac{p}{r} \sqrt{dx^2 + dy^2} = \frac{p}{ar} \times \sqrt{4y^2 dy^2 + a^2 dy^2} = \frac{p}{ar} \times dy \sqrt{4y^2 + a^2} =$ à l'élément de la superficie de la partie du conoïde, formée par la portion APM de la parabole qui revient au premier cas de la troisième forme de la petite *Table des simples courbes qui peuvent être quadrées*, art. 8. ou bien, à la troisième forme des Tables de M. Costes; car si dans la petite Table vous faites $D = \frac{p}{ar}$, $z = y$, $n = 2$, $e = aa$, $f = 4$, vous aurez la différentielle $Dz^{n-1} dz \sqrt{e + fz} = \frac{pdy}{ar} \sqrt{4y^2 + a^2}$, & pour son integrale $\frac{2D}{3f} R^3$, qui en faisant $R (= \sqrt{e + fz}) = \sqrt{4y^2 + a^2}$, deviendra $\frac{p}{12ar} \times 4y^3 + aa^{\frac{3}{2}} =$ à l'integrale de l'élément de la superficie du conoïde.

De la même manière, dans la troisième forme des Tables de M. Costes, on verra que l'integrale qui répond à $n=1$, est $\frac{2e + 2fz^2}{3f} DP$, faisant $P (= \sqrt{e + fz}) = \sqrt{4y^2 + a^2}$, & substituant, comme ci-devant, les valeurs de D , n , e , f , viendra $\frac{2aa + 8y^2}{24} \times \frac{p}{ar} \sqrt{4y^2 + a^2} = \frac{p}{12ar} \sqrt{4y^2 + a^2}^{\frac{3}{2}} =$ à ce qui a été trouvé suivant la petite Table des Quadratures.

Fig. 51.

On peut construire cette integrale de cette sorte : faites $r = y$, tirez $PC = 2y$, $PB = a$, & joignez BC ; alors $BC = \sqrt{4yy + aa}$ que vous nommerez u , & l'integrale à construire sera $\frac{p}{12y} u^3$. Que z soit le diamètre du cercle égal à cette integrale, son aire sera $\frac{\pi z^2}{8y}$. Par conséquent $\frac{p}{12ay} u^3 = \frac{\pi z^2}{8y}$ c'est-à-dire, $\frac{u^3}{12a} = \frac{z^2}{8}$; ainsi $\frac{8u^3}{12a} = z^2$, d'où il suit que $z =$

* art. 67. $\sqrt{\frac{2u^3}{3a}} =$ à l'integrale de $2y \sqrt{dx^2 + dy^2}$.

DES INFINIMENT PETITS 107

Faites maintenant $PH=BC$, & $PE=\frac{1}{2}BC$, joignez B , E . De H tirez HF , parallèle à BE : faites $GP=PF$, coupez GH en D , duquel comme centre décrivez le demi-cercle GKH , coupant PM prolongé en K , alors la ligne droite PK , sera le diamètre d'un cercle égal à la superficie du conoïde diminuée d'un fixième d'un cercle dont le rayon égale a .

EXEMPLE IV.

70. Trouver la superficie du sphéroïde formé par la révolution d'une partie quelconque AM d'une ellipse autour de la partie DC du demi-axe Bc .

Nommez le demi-axe AC , a , son conjugué BC , b , l'abscisse PA , x , & l'ordonnée correspondante MP , y ; maintenant $\frac{bb}{aa} \times 2ax - xx = yy$, & $2adx - 2xdx = \frac{2a'}{b'} \times ydy$, ou $adx - xdx = \frac{a'}{b'} ydy$ & $dx = \frac{a'ydy}{b'-y^2}$; donc $dx^2 = \frac{a'^2 y^2 dy^2}{b'^2 - y^2}$, Fig. 51. 51.

par conséquent l'élément de l'arc AM ($= \sqrt{dx^2 + dy^2}$) sera $= \frac{dy}{b} \sqrt{\frac{b^2 + a'^2 - b'y^2}{b'^2 - y^2}} = \frac{dy}{b} \sqrt{\frac{b^2 + ccy}{b'^2 - y^2}}$ (quand AC (a) est plus grand que BC (b) & en substituant cc , pour $a^2 - b^2$) ou $= \frac{dy}{b} \sqrt{\frac{b^2 - ccy}{b'^2 - y^2}}$, quand AC (a) est moindre que BC (b) & que cc , est substitué pour $b^2 - a^2$.

De plus, par la nature de la courbe $DM = \frac{a}{b} \sqrt{bb - yy}$, donc la circonférence du cercle décrite par DM est $\frac{2\pi}{rb} \sqrt{bb - yy}$, qui étant multiplié par l'élément de l'arc déjà trouvé, donnera $\frac{2\pi dy}{rb^2} \sqrt{\frac{b^2 + ccy \times bb - yy}{bb - yy}} = \frac{2\pi dy}{rb^2} \sqrt{b^2 + ccy}$, quand AC surpasse BC ; mais quand AC , est moindre que BC , elle est $= \frac{2\pi dy}{rb^2} \sqrt{b^2 - ccy}$; l'un & l'autre étant l'élément de la superficie d'un sphéroïde, formé par la révolution de la partie AM de l'ellipse autour de la partie CD de l'axe, & peut se rapporter à la quatrième forme des Tables de M. Cotes; car faisant $D = \frac{2\pi}{rb^2}$, $z = y$, $z^2 = y^2$, $\theta = 0$,

O ij

$e = b^4$, $f = +cc$, la différentielle $Dz^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - 1} dz \sqrt{e + fz^2}$, se changera en $\frac{pdy}{2rb\dot{b}} \sqrt{b^4 + ccyy}$, & l'intégrale $\frac{p}{2} DP + \frac{e}{y} DR \Big|_{\frac{R}{S}}$, en faisant $P (= \sqrt{\frac{e+fz^2}{z^2}}) = \frac{1}{y} \sqrt{b^4 + ccyy}$, $R (= \sqrt{f}) = c$, ou $\sqrt{-cc}$, $T (= \sqrt{\frac{e+fz^2}{z^2}}) = \frac{1}{y} \sqrt{b^4 + ccyy}$. $S (= \sqrt{\frac{e}{z^2}}) = \frac{b^2}{z}$, se changera en celle-ci $\frac{pdy}{2rb\dot{b}} \sqrt{b^4 + ccyy} + \frac{pab^2}{2rc} \Big|_{\frac{y + \sqrt{b^4 + ccyy}}{b^2}}$ qui est $\sqrt{b^4 + ccyy}$, la mesure d'un rapport quand $AC (a)$ surpasse $BC (b)$, & il est $\sqrt{b^4 - ccyy}$, la mesure d'un angle quand $AC (a)$ est moindre que $BC (b)$.

Fig. 52.

On peut construire l'intégrale dans le premier cas, de la façon suivante. Que F soit un des foyers, faites $CF (\sqrt{aa - bb} = \sqrt{cc} = c)$, (suivant la nature de l'ellipse) : $CB (b) : CB (b) : CE = \frac{bb}{c}$, & tirez la ligne droite DE . Faites de même $CE (\frac{bb}{c}) : DE (\frac{1}{c} \sqrt{b^4 - ccyy}) : : CD (y) : KL = \frac{y}{bb} \sqrt{b^4 + ccyy}$, à laquelle si vous ajoutez LM , après l'avoir égalé à la mesure du rapport qui se trouve entre $DE (\frac{1}{c} \sqrt{b^4 - ccyy}) + DC (y)$ & $CE (\frac{bb}{c})$ comparé au module $CE (\frac{bb}{c})$; c'est-à-dire, si vous prenez $LM = \frac{b^2}{c} \Big|_{cy + \frac{y\sqrt{b^4 + ccyy}}{b^2}}$; alors $AC (a)$ est à $KM = KL + LM (= \frac{y}{bb} \sqrt{b^4 + ccyy} + \frac{b^2}{c} \Big|_{\frac{y + \sqrt{b^4 + ccyy}}{b^2}})$, comme un cercle décrit par le rayon $AC (a)$ (lequel cercle égal $\frac{paa}{2r}$) est à la superficie du sphéroïde formé par la révolution de la partie AM de l'ellipse $= \frac{pdy}{2rb\dot{b}} \sqrt{b^4 + ccyy} + \frac{pab^2}{2rc} \Big|_{\frac{y + \sqrt{b^4 + ccyy}}{b^2}}$, qui est l'intégrale qu'il falloit construire.

Maintenant que le rayon d'un cercle égal à la superficie du sphéroïde, soit z , ce qui donne cette proportion $CA (a) : KM : :$ un cercle décrit par CA , c'est-à-dire, $\frac{paa}{2r}$: à la

superficie du sphéroïde, supposée égale à un cercle $\frac{pxc}{2r}$, dont le rayon est z , & multipliant les extrêmes & les moyens, on aura $\frac{pxc}{2r} = KM \times \frac{paa}{2r}$; ainsi $zz = KM \times a$; c'est-à-dire, un moyen proportionnel entre KM & $AC(a)$ fera le rayon d'un cercle qui égalera la superficie du sphéroïde formé par la révolution de la partie AM de l'ellipse.

Quand $DC(y)$ devient égal à $BC(b)$; alors DE devient BE ; ainsi si vous faites $CE(\frac{bb}{c}) : BE(\frac{b}{c} \sqrt{bb-cc}) :: BC(b) : KL = \sqrt{bb-cc} = AC = a$, & que LM soit égal à la mesure du rapport qui est entre $AC(a) + BC(b)$ & $CE(\frac{bb}{c})$ au module $CE(\frac{bb}{c})$ on aura CA , est à KM , comme un cercle ayant CA pour rayon, est à la $\frac{1}{2}$ de la superficie de tout le sphéroïde.

Dans le dernier cas on fait la construction de l'intégrale de cette manière: prenez dans l'ordonnée DM , le point E ; en sorte que la ligne CE étant tirée, soit égale à $\frac{bb}{c}$, ou à une troisième proportionnelle à $CF(c)$ & $CB(b)$; & faites $CE(\frac{bb}{c}) : DE(\frac{1}{c} \sqrt{b^4-ccyy}) :: DC(y) : KL = \frac{y}{bb} \sqrt{b^4-ccyy}$. Ensuite si à KL , vous ajoutez LM égale à la mesure de l'angle DEC au module $CE(\frac{bb}{c})$; $CA(a)$ est à KM , comme un cercle dont le diamètre est $CA(a)$ à la superficie du sphéroïde formé par la révolution de la partie AM de l'ellipse autour de la partie DC de l'axe; ainsi un moyen proportionnel entre KM & CA , est le rayon d'un cercle égal à ladite superficie.

Quand $CD(y)$ devient égal à $BC(b)$, tirez BG , perpendiculaire à BC , dans laquelle prenez le point e , de manière que Ce étant tirés, elle soit $= EC(\frac{bb}{c})$; ensuite si vous faites CE ou $Ce(\frac{bb}{c}) : Be(\frac{b}{c} \sqrt{bb-cc}) :: AC(a) : KL = \sqrt{bb-cc} = a$, & qu'à la même vous ajoutiez LM , égale à la mesure de l'angle eCB , ayant pour module $ec(\frac{bb}{c})$; on aura CA , est à KM , comme un cercle ayant CA pour

Fig. 53.

rayon , est à la $\frac{1}{2}$ de la superficie de tout le sphéroïde.

E X E M P L E V.

71. *Trouver la superficie d'un conoïde hyperbolique formé par la révolution d'une partie quelconque AM d'une hyperbole autour de son grand axe AP.*

Fig. 54.

Que C soit le centre Cc , une asymptote $AC=bb$, un des demi-axes, & l'autre demi-axe $Ac=a$. Que $CP=b$, $PM=x$. Maintenant par la nature de la courbe $\frac{aa}{bb} \times yy - bb = xx$, & $2aaydy = 2bbxdx$, donc $dx = \frac{aaydy}{bbx}$, par conséquent $dx^2 = \frac{a^2y^2dy^2}{b^2xx}$, & l'élément de l'arc AM ($= dx^2 + dy^2$) sera $\frac{dy}{b} \sqrt{\frac{y^2a^2 - b^2}{yy - bb}} = \frac{dy}{b} \sqrt{\frac{ccyy - b^4}{yy - bb}}$, en substituant cc , pour $a^2 + b^2$. De plus PM est $= \frac{a}{b} \sqrt{yy - aa}$ par la nature de la courbe ; ainsi la circonference décrite par PM sera $\frac{2\pi}{b} \sqrt{yy - aa}$, qui multiplié par l'élément de l'arc déjà trouvé, donnera $\frac{2\pi dy}{rbb} \sqrt{\frac{ccyy - b^4}{yy - bb}} \times \frac{yy - bb}{yy - bb} = \frac{2\pi dy}{rbb} \sqrt{ccyy - b^4}$, qui est l'élément de la superficie d'un conoïde hyperbolique formé par la révolution de la partie AM de l'hyperbole autour de l'axe AP , qui se raporte à la même forme dans les Tables de M. Cotes, que l'élément de la superficie du sphéroïde dans le dernier exemple. Car faisant $D = \frac{2\pi}{rbb}$, $z = y$, $\theta = 0$, $a = z$, $e = -b^4$, $f = cc$, $p = \frac{1}{y} \sqrt{ccyy - b^4}$, $R = e$, $T = \frac{1}{y} \sqrt{ccyy - b^4}$, $S = \frac{b^4}{y}$, on aura l'intégrale de cette différentielle ainsi exprimée $\frac{2\pi y}{2rbb} \sqrt{ccyy - b^4} - \frac{2\pi b^4}{2rc} \left[2y - \sqrt{ccyy - b^4} \right]$. Faites maintenant $b = y$, alors la première partie $\frac{1}{bb} \sqrt{ccyy - b^4}$, de l'intégrale sera $= \sqrt{cc - bb} = a$; par conséquent elle doit être retranchée de cette première partie. De

DES INFINIMENT PETITS. 111

plus en faisant $b=y$, la partie logarithmique $\frac{bb}{c} \left| \frac{cy+\sqrt{ccyy-b^4}}{bb} \right|$ deviendra $\frac{bb}{c} \left| \frac{ab+bc}{bb} \right|$, qu'il faut d'abord soustraire de $\frac{bb}{c} \left| \frac{cy+\sqrt{ccyy-b^4}}{bb} \right|$, pour avoir la véritable partie logarithmique. Maintenant à cause que le logarithme du rapport de bb à $ab+bc$, ayant un signe affirmatif, est le même que le logarithme du rapport de $ab+bc$ à bb , avec le signe négatif (par la définition première, section 2. scholie 2.) par conséquent la somme de $\frac{bb}{c} \left| \frac{cy+\sqrt{ccyy-b^4}}{bb} \right|$ & de $\frac{bb}{c} \left| \frac{bb}{ab+bc} \right|$, sera égal à la différence cherchée : mais le rapport de $cy+\sqrt{ccyy-b^4}$ à bb , & le rapport de bb à $ab+bc$, forment le rapport de $cy+\sqrt{ccyy-b^4}$ à $ab+bc$, d'où il suit que la somme susdite sera $\frac{bb}{c} \left| \frac{cy+\sqrt{ccyy-b^4}}{ab+bc} \right|$; par conséquent la véritable intégrale qu'il faut construire sera $\frac{pay}{2rbb} \sqrt{ccyy-b^4} - \frac{pa^2}{2r} - \frac{pab^2}{2rc} \left| \frac{cy+\sqrt{ccyy-b^4}}{ab+bc} \right|$, qu'on pourra faire de cette manière.

Que F soit le foyer de l'hyperbole, par la nature de cette courbe $CF (\sqrt{aa+bb}) = CA(b) : CE = \frac{bb}{c}$. Tirez EG perpendiculaire à CA , coupant l'asymptote en G . Dans l'angle CEG , inscrivez la droite $CH = CP (y)$ qu'il faut prolonger jusqu'à ce qu'elle rencontre la ligne PM au point I . Ensuite prenez KL égal à $PI - AC = \frac{2}{bb} \sqrt{ccyy-b^4} - a$: on aura par la similitude des triangles CEH, CPI ; $CE (\frac{bb}{c}) : EH (\frac{1}{c} \sqrt{ccyy-b^4}) :: CP (y) : PI = \frac{2}{bb} \sqrt{ccyy-b^4}$. De plus, prenez LM égal à la mesure du rapport qui est entre $CH (y) + EH (\frac{1}{c} \sqrt{ccyy-b^4})$ & $GC (b) + GE (\frac{ab}{c})$ au module $CE (\frac{bb}{c})$; & la superficie formée par la révolution de l'arc AM autour de l'axe AP , sera au cercle décrit par le rayon $AC (a) = \frac{pas}{2r}$ comme KM est à AC .

E X E M P L E V I.

72. Trouver la superficie d'un conoïde hyperbolique formé par la révolution d'une partie quelconque AM d'une hyperbole autour de son axe conjugué CPB .

Fig. 55.

Que C soit le centre, $CA=a$, le demi-axe transversale, & $CB=b$, le demi-axe conjugué; F le foyer, $PM=x$, une ordonnée quelconque à CA , & $CP=y$, l'abscisse correspondante.

Maintenant par la nature de la courbe $\frac{bb}{aa} \times \overline{xx-aa} = yy$; d'où $\frac{abb}{aa} \times xdx = ydy$; c'est-à-dire $\frac{bb}{aa} \times xdx = ydy$, & $bbxdx = aaydy$, & $dx = \frac{aaydy}{bbx}$, & $dx^2 = \frac{a^2y^2dy^2}{b^2x^2}$, & substituant $\frac{aay-aabb}{bb}$ pour xx , on aura $dx^2 = \frac{a^2b^2dy^2}{aab^2 \times bb-yy} = \frac{a^2y^2dy^2}{b^2 \times bb-yy}$. Donc $\sqrt{dx^2+dy^2} = \frac{dy}{b} \sqrt{\frac{a^2+b^2 \times yy+b^4}{bb-yy}}$; mais $x = \frac{a}{b} \sqrt{bb-yy}$, qui étant multiplié par $\frac{b}{r}$, donne pour produit $\frac{pa}{rb} \sqrt{bb-yy}$, qui est la circonférence décrite par le point M , & si l'on multiplie l'élément de l'arc par cette circonférence on aura $\frac{pa dy}{rb b} \sqrt{\frac{a^2+b^2 \times y^2+b^4}{bb-yy} \times \frac{b^2-yy^2}{bb-yy}} = \frac{pady}{rb b} \sqrt{a^2+b^2yy+b^4}$, & substituant cc , pour a^2+b^2 , elle sera $\frac{pady}{rb b} \sqrt{ccyy+b^4}$, élément de la superficie formée par la révolution de l'arc AM , autour de son demi-diamètre conjugué CP .

Cet élément différentiel étant le même que celui du premier cas de l'exemple 4. son integrale doit être la même que celle qu'on avoit trouvée dans cet exemple 4. par exemple, $\frac{pay}{2rb b} \sqrt{ccyy+b^4} + \frac{pab^2}{2rc} \left| \frac{cc-yy}{bb} \right|$, qu'on peut construire de cette façon.

Faites $CF (\sqrt{aa+bb}=c) : CB (b) :: CB (b) : CE = \frac{bb}{c}$.
Tirez

DES INFINIMENT PETITS. 113

Tirez la ligne droite PE ($\frac{1}{e} \sqrt{ccyy + b^4}$), ensuite faites CE ($\frac{bb}{e}$): PE ($\frac{1}{e} \sqrt{ccyy + b^4}$): $PC(y)$: $KL = \frac{2}{bb} \sqrt{ccyy + b^4}$, & prenez LM égal à la mesure du rapport qui est entre PE ($\frac{1}{e} \sqrt{ccyy + b^4}$) & $PC(y)$; c'est-à-dire, qui est entre $\frac{e + \sqrt{ccyy + b^4}}{e}$, & CE ($\frac{bb}{e}$) au module CE ($\frac{bb}{e}$) & la superficie formée par la révolution de l'arc AM de l'hyperbole autour du demi-axe conjugué CB , sera au cercle décrit par le demi-diamètre $CA(a)$ (qui est $\frac{paa}{2r}$) comme la somme des lignes KL & LM , ont au même rayon $CA(a)$.

E X E M P L E V I I.

73. *Trouver la superficie formée par le mouvement de l'arc CM d'une hyperbole équilatère autour de l'asymptote ABP.*

Que A soit le centre, & que AB soit $= BC$; tirez parallèlement à l'asymptote, AH ; tirez AP , & menez PM parallèle à CB : nommez maintenant AB , ou BC , a ; AP , x ; PM , y : ensuite par la propriété de la courbe, on aura $ax = xy$; d'où il suit, que $x = \frac{aa}{y}$ & $\frac{aa}{x} = y$, qui étant différentié, donnera $dy = \frac{-aadx}{xx}$; par conséquent $dy^2 = \frac{a^4 dx^2}{x^4}$. De plus $x = \frac{aa}{y}$ qui étant différentié donnera $\frac{aady}{y^2} = \frac{dx}{x}$, & $\frac{a^4 dy^2}{y^4} = dx^2$; donc $\sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{\frac{a^4 dx^2}{x^4} + dx^2} = \frac{a^2 dx}{x^2} + \frac{a^2 dy^2}{y^2} = \frac{dy}{y} \sqrt{a^4 + y^4} = Mm$, élément de l'arc CM , qui étant multiplié par $\frac{p}{r}$ donnera pour produit $\frac{pdy}{y} \sqrt{a^4 + y^4} = \frac{p}{r} y^{-1} dy \sqrt{a^4 + y^4}$, qui est l'élément de la superficie formée par la révolution de l'arc CM . Cette différentielle peut se comparer à celle de la troisième forme des Tables de M. Costes, & on aura l'intégrale en faisant $D = \frac{p}{r}$, $z = y$,
P

Fig. 56.

$\theta=0$, $a=4$, $e=a^2$, $f=y^2$, $P=\sqrt{a^2+y^2}$, $R=aa$, $T=\sqrt{a^2+y^2}$, & $S=yy$. Car alors elle deviendra $\frac{1}{2} \frac{P}{r} \sqrt{a^2+y^2}$

$-\frac{1}{2} \frac{P}{r} aa \left| \frac{aa+\sqrt{a^2+y^2}}{y} \right|$. Mais cette integrale doit être corrigée, parce que l'abscisse AP , x , augmente pendant que l'ordonnée PM , y , diminue; c'est pourquoi les signes doivent être changés; c'est-à-dire, elle est $-\frac{1}{2} \frac{P}{r} \sqrt{a^2+y^2}$ $+\frac{1}{2} \frac{P}{r} aa \left| \frac{aa+\sqrt{a^2+y^2}}{y} \right|$. De plus, puisque l'abscisse AP , x ,

commence au point A , & non pas au point B , la même integrale doit être corrigée par rapport à son amplitude, ce qu'on peut faire ainsi. Faites $y=a$, alors la première partie de l'integrale sera $\frac{1}{2} pra \sqrt{2}$, qu'il faut ajouter à $-\frac{1}{2} \frac{P}{r} \sqrt{a^2+y^2}$, & cette somme $\frac{1}{2} \frac{pra}{r} \sqrt{2} - \frac{1}{2} \frac{P}{r} \sqrt{a^2+y^2}$, sera la première partie de l'integrale corrigée. De plus la partie logarithmique $\frac{1}{2} \frac{P}{r} aa \left| \frac{aa+\sqrt{a^2+y^2}}{y} \right|$ doit être changée; ce qu'on peut faire en faisant $a=y$, car alors il viendra $\frac{1}{2} \frac{P}{r} aa \left| \frac{y^2+1}{1} \right|$, qui étant soustrait de $\frac{1}{2} \frac{P}{r} aa$

$\left| \frac{aa+\sqrt{a^2+y^2}}{y} \right|$, on aura $\frac{1}{2} \frac{P}{r} aa \left| \frac{\frac{aa}{y} + \sqrt{\frac{a^2+y^2}{y}}}{\sqrt{2+1}} \right|$, qui est la

vraie partie logarithmique; & par conséquent la vraie in-

tegrale sera $\frac{pra}{2r} \sqrt{2} - \frac{P}{2r} \sqrt{a^2+y^2} - \frac{1}{2} \frac{P}{r} aa \left| \frac{\frac{aa}{y} + \sqrt{\frac{a^2+y^2}{y}}}{\sqrt{2+1}} \right|$

qu'on peut construire de cette maniere.

Tirez AM & AC , & du point C , tirez CG , parallele à AM , coupant l'asymptote AP , prolongée jusqu'en G . Maintenant à cause des triangles semblables APM , ABF ; AP ($\frac{aa}{y}$) : PM (y) :: AB (a) : BF ($\frac{y}{a}$); d'où $\frac{1}{a} \sqrt{a^2+y^2} = AF$. De plus GC , étant parallele à AM , les triangles APM , GBC sont semblables, & par conséquent PM (y) : AP ($\frac{aa}{y}$) ::

DES INFINIMENT PETITS. 115

$CB(a) : BG = \frac{a^2}{n}$; d'où on tire $CG = \frac{a}{n} \sqrt{a^4 + y^4}$. Ensuite si vous faites $AH = AC(a\sqrt{2}) - AF(\frac{1}{a} \sqrt{a^4 + y^4}) +$ la mesure du rapport qui est entre $BG(\frac{a^2}{n}) + GC(\frac{a}{n} \sqrt{a^4 + y^4})$, & $AC(a\sqrt{2}) - AB(a)$ (lequel rapport est $= \frac{\frac{a^2}{n} + \sqrt{\frac{a^4 + y^4}{n}}}{\sqrt{2} - 1}$)

rapportée au module $AB(a)$; alors la superficie formée par la révolution de l'arc CM , autour de l'asymptote AP , sera au cercle dont le rayon est $AB(a)$; c'est-à-dire, $= \frac{paa}{sr}$, comme

$$AH(a\sqrt{2} - \frac{1}{a} \sqrt{a^4 + y^4} + a) \left| \frac{\frac{a^2}{n} + \frac{a\sqrt{a^4 + y^4}}{n}}{a\sqrt{2} - 1} \right| \text{ est à } BC(a),$$

& par conséquent la valeur de AH , multipliée par $\frac{pa}{sr}$, sera égale à ladite superficie.

E X E M P L E V I I I.

74. *Trouver la superficie formée par la révolution de l'arc infini PZ de la courbe logarithmique, autour de son asymptote AX .*

Que AP soit une ordonnée perpendiculaire à l'asymptote que vous nommerez y ; que TP soit une tangente au point P , & que la soutangente invariable AT soit $= a$; tirez pm , parallèle à AT , & infiniment proche du point P .

Présentement à cause de la similitude des triangles ATP , mpP , on a $AP(y) : TP(\sqrt{aa + yy}) :: mP(dy) : pP = \frac{dy}{y} \sqrt{aa + yy} =$ à l'élément de l'arc PZ , qui étant multiplié par $2y$, le produit $2dy\sqrt{aa + yy}$ sera l'élément d'un carré dont le côté est égal au diamètre d'un cercle égal à la superficie cherchée. Par la scholie, art. 67. supposons ce carré $= AO$.

Maintenant on peut rapporter cet élément à la quatrième forme des Tables de M. Cotes, en mettant $y, 2, 0, 2, aa, 1$.
P ij

Fig. 57.

pour z, u, θ, D, e, f . De plus en mettant pour P, R, T, S $\frac{1}{y} \sqrt{aa+yy}$, $1, \frac{1}{y} \sqrt{aa+yy}$, & $\frac{a}{y}$; l'on aura pour la différentielle $2dy \sqrt{aa+yy}$, & pour l'intégrale $y \sqrt{aa+yy} + aa \int \frac{y+ \sqrt{aa+yy}}{a}$.

Pour construire cette intégrale il faut observer que la ligne droite AO , est moyenne proportionnelle entre a & $\frac{1}{a} \sqrt{aa+yy} + a \int \frac{y+ \sqrt{aa+yy}}{a}$; & la quantité $\frac{1}{a} \sqrt{aa+yy}$, est égale à la ligne droite PE perpendiculaire à la courbe en P , & bornée par l'asymptote en E : car à cause de la similitude des triangles TPA, APE ; $TA(a):TP(\sqrt{aa+yy})::AP(y):PE=\frac{1}{a} \sqrt{aa+yy}$; & l'autre quantité $a \int \frac{y+ \sqrt{aa+yy}}{a}$ est la mesure du rapport qui est entre $AP+TP$, & AT au module AT , ou, par la similitude des triangles APF, APE , la mesure du rapport qui est entre $AE+EP$ & AP , au même module AT . Ainsi cette intégrale peut se construire de la manière suivante.

Tirez $PE (\frac{1}{a} \sqrt{aa+yy})$ perpendiculaire à la courbe au point P , terminée à l'asymptote en E ; continuez l'ordonnée AP en L , de telle sorte que AL soit $= AE+EP (\frac{1}{a} + \frac{1}{a} \sqrt{aa+yy})$, & tirez LK dans le même sens de la courbe, c'est-à-dire, vers Z , que vous ferez $= EP (\frac{1}{a} \sqrt{aa+yy})$, & que cette même ligne LK coupe la cour-

be en M ; enfin entre $KM (\frac{1}{a} \sqrt{aa+yy} + a \int \frac{y+ \sqrt{aa+yy}}{a})$, & AT , trouvez une moyenne proportionnelle AO (LM , par la nature de la courbe, étant la partie logarithmique) qui sera le rayon d'un cercle égal à la superficie formée par la révolution de l'arc infini PZ .



E X E M P L E I X.

75. Trouver la superficie formée par la révolution de l'arc infini MZ ou AZ de la cissoïde de Diocles, autour de son asymptote AG .

Tirez l'ordonnée PM perpendiculaire à l'asymptote, & *Fig. 42.*
 mp infiniment proche de cette perpendiculaire. Ensuite fai-
 sant $AB=a$, $AN=x$, MN étant perpendiculaire à AB ,
 l'élément Mm de l'arc MZ , sera $\frac{adx \sqrt{4a-3x}}{2 \times a-x \sqrt{a-x}}$; qui multi-

plié par $\frac{p}{r} \times a-x = \frac{p}{r} \times MP$, donnera pour l'élément de
 la superficie formée par la révolution déjà expliquée de l'arc
 $MZ \frac{pdx}{2r} \sqrt{\frac{4a-3x}{a-x}}$.


Maintenant on peut rapporter cet élément à la onzième
 forme des Tables de M. *Cotes*. Car faisant $z=x$, $b=1$,
 $n=1$, $D=\frac{p}{2r}$, $e=4a$, $f=-3$, $g=a$, & $h=-1$, la dif-
 ferentielle de cette onzième forme $Dz^{n-1} dz \sqrt{\frac{e+fz^n}{g+bz^n}}$, se
 changera en $\frac{pdx}{2r} \sqrt{\frac{4a-3x}{a-x}}$, & l'intégrale $\frac{1}{nb} DP Q +$
 $\frac{eb-fg}{f^2b} DR \Big| \frac{R+T}{S}$, & faisant $P(\sqrt{e+fz^n}) = \sqrt{4a-3x}$,
 $Q(\sqrt{g+bz^n}) = \sqrt{a-x}$, $R(\sqrt{\frac{f}{b}}) = \sqrt{3}$, $T(\sqrt{\frac{e+fz^n}{g+bz^n}})$
 $= \sqrt{\frac{4a-3x}{a-x}}$, $S(\sqrt{\frac{eb+fz^n}{bg+bz^n}}) = \sqrt{\frac{-a}{-a+x}}$ ou $\sqrt{\frac{a}{a-x}}$,
 se changera en $-\frac{p}{2r} \times \sqrt{4a-3x} \times \sqrt{a-x} - \frac{pa}{2r} \times \frac{a}{\sqrt{3}} \Big|$
 $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{3a-3x+\sqrt{4a-3x}}}$, qui est l'intégrale de la différentielle
 donnée $\frac{pdx}{2r} \sqrt{\frac{4a-3x}{a-x}}$, dans laquelle on peut changer les
 signes négatifs dans les deux parties.

On peut construire à présent cette intégrale de cette façon:
 coupant MN en F , & tirant AFE , coupant l'asymptote en
 E : faites DE moyen proportionnel entre AB & NB ; de
 même, que l'angle CAB soit $= \frac{1}{2}$ d'un angle droit, & con-

tinuez l'asymptote jusqu'en B , coupant AC au point C ; alors $BC = \frac{a}{\sqrt{3}}$; car $\sqrt{BC^2 + AB^2} = 2BC$; donc $BC = \frac{AB}{\sqrt{3}} = \frac{AB}{3}$; ainsi $\frac{AB}{3} = BC$; par conséquent $BC = \frac{AB}{\sqrt{3}} = \frac{a}{\sqrt{3}}$. De plus $AF = \frac{a}{2} \sqrt{\frac{4a-3x}{a-x}}$, & à cause de la similitude des triangles ANF , ABE ; $AN(x) : AF(\frac{a}{2} \sqrt{\frac{4a-3x}{a-x}}) :: NB(a-x) : FE = \frac{1}{2} \sqrt{4a-3x} \times \sqrt{a-x}$, & $DC = \sqrt{\frac{4aa-3ax}{3}}$.

Mais la superficie formée par la révolution de l'arc infini MZ , est à un cercle ($= \frac{\pi a^2}{2r}$) dont le rayon est $AB(a)$, comme $2EF(\sqrt{4a-3x} \times \sqrt{a-x})$ à la mesure du rapport qui est entre BD , ($\sqrt{aa-ax}$) à $DC(\frac{\sqrt{4aa-3ax}}{3})$ & $BC(\frac{a}{\sqrt{3}})$ est au module $BC(\frac{a}{\sqrt{3}})$.

Faisant présentement $x=0$ dans l'integrale déjà trouvée, on aura $\frac{\pi a}{2r} \times 2a + \frac{\pi a}{2r} \times \frac{a}{\sqrt{3}} \left| \frac{\sqrt{3a+2\sqrt{a}}}{\sqrt{a}} \right|$, qui est l'integrale qui exprime la quantité de l'arc infini AZ , étant à un cercle dont le rayon est $AB(a)$ comme $2AB$ à la mesure du rapport qui est entre $BA(a) + AC(\frac{2a}{\sqrt{3}})$ & $BC(\frac{a}{\sqrt{3}})$ au module BC , & la différence de ces integrales en retranchant $\frac{\pi a}{2r}$, par exemple, $2AB(2a) - EF(\sqrt{4a-3x} \times \sqrt{a-x})$ à la mesure du rapport $BA(a) + AC(\frac{2a}{\sqrt{3}})$ à $BD(\sqrt{aa-ax})$ à $DC(\frac{\sqrt{4aa-3ax}}{3})$, le module étant $BC(\frac{a}{\sqrt{3}})$: donnera la quantité de l'arc fini AM . Car elle sera à un cercle ayant BA pour rayon, comme cette différence est au même rayon BA . Quand la courbe fait sa révolution autour de la baze AB , M. Costes dans ses *harmonia mensurarum*, donne la quantité de la superficie formée; mais l'opération est longue & difficile, les différentielles ne pouvant se rapporter directement à aucune de ces Tables.



SECTION VI.

Usage du calcul différentiel & integral pour trouver le centre de gravité des figures.

PROBLEME.

76. *Trouver le centre de gravité d'une figure plane.*

Que AB soit l'axe, & MN une ordonnée à cet axe, & que mn soit une autre ordonnée infiniment proche de la première, & supposé que C soit le centre de gravité. Fig. 38.

Maintenant si on conçoit les parties infiniment petites $MmnN$, de la figure comme autant de petits poids suspendus à l'axe AB , par les différens points $P, P, P, \&c.$ & que le point de suspension soit en A , sommet de la figure, la distance du centre de gravité C à A , point de suspension, sera égale au quotient de la division de la somme des efforts de tous ces poids infiniment petits $MmnN$, divisée par la somme de toutes ces petites parties ou poids, c'est-à-dire, par l'aire de toute la figure. Ceci est évident suivant les principes de la mécanique ordinaire.

C'est pourquoi, nommant AP, x, MP, y, Pp, dx , la partie infiniment petite, ou le petit poids $MmnN$ sera $= ydx$, & leur somme totale sera $=$ à l'intégrale de ydx , & l'effort d'une de ces petites parties ou poids, sera ydx , multiplié par $AP(x) = yx dx$, dont l'intégrale divisée par l'intégrale de $ydx = AC$, distance du centre de gravité de A , sommet de la figure.

EXEMPLE PREMIER.

77. *Trouver le centre de gravité d'un triangle ADE.*

Tirez la ligne droite AB , coupant la base DE en B , après Fig. 59.

quoi le triangle ABD , étant égal à ABE , chacun de ces triangles peuvent être résolus en une infinité de petites parties ou poids $MmpP$, $PNnp$, chacune égale les unes aux autres de chaque côté de la ligne AB prise comme axe, & par conséquent le centre de gravité C doit être en quelque endroit de la ligne AB .

Maintenant nommez AB , a , DE , b , AP , x , MN , y ; & tirez AF perpendiculaire à DE que vous nommerez c . Ensuite par la similitude des triangles AMN , ADE ; AB (a): DE (b):: AP (x): MN (y) $= \frac{bx}{a}$, de même à cause des triangles semblables APQ , ABF ; on aura AB (a): AF (c):: AP (x): AQ ($\frac{cx}{a}$) & comme AP (x): AQ ($\frac{cx}{a}$):: Pp (dx): Qq ($\frac{cdx}{a}$); d'où il suit que l'effort $xydx = \frac{cbx^2}{a^2}$; dont l'intégrale $= \frac{cbx^3}{\frac{3}{2}a^2}$, laquelle étant divisée par $\frac{cbx^3}{\frac{3}{2}a^2}$, aire du triangle ADE , le quotient sera $\frac{2}{3}x =$ à la distance du centre de gravité de la partie AMN du triangle ADE , depuis son sommet; & substituant a pour x , la distance du centre de gravité de tout le triangle ADE , depuis le sommet A sera $= \frac{2}{3}AB$ (a).

EXEMPLE I I.

78. Déterminer le centre de gravité C dans la parabole ordinaire.

Fig. 58. Nommant AP , x , MN , y , AB , a , & le paramètre p ; alors $px = yy$; ainsi $y = \sqrt{px}$, donc $ydx = dx\sqrt{px}$; & par conséquent l'effort $xydx = xdx\sqrt{px} = xdxp^{\frac{1}{2}}x^{\frac{1}{2}}$, dont l'intégrale sera $\frac{2}{3}p^{\frac{1}{2}}x^{\frac{3}{2}}$; mais l'intégrale de $ydx = \frac{2}{3}p^{\frac{1}{2}}x^{\frac{3}{2}} =$ à l'aire de la portion AMN de la parabole; par conséquent divisant $\frac{2}{3}p^{\frac{1}{2}}x^{\frac{3}{2}}$ par $\frac{2}{3}p^{\frac{1}{2}}x^{\frac{3}{2}}$ le quotient $= \frac{1}{3}x = AC$; & substituant a pour x , la distance du centre de gravité C au sommet A , sera $= \frac{1}{3}AB$.



EXEMPLE III.

E X E M P L E I I I.

79. Déterminer le centre de gravité C , dans toutes les paraboles de quelques degrés qu'elles soient.

Dans ce cas $p^n x^m = y^r$, exprime la nature de toutes les paraboles de tous les degrés, d'où on tire $y = p^{\frac{n}{r}} x^{\frac{m}{r}}$, & par conséquent $y dx = p^{\frac{n}{r}} x^{\frac{m}{r}} dx$, & l'effort $xy dx = p^{\frac{n}{r}} x^{\frac{m+r}{r}} dx$, dont l'intégrale $= \frac{r}{m+r} p^{\frac{n}{r}} x^{\frac{m+r}{r}}$, qui étant divisée par l'intégrale de $y dx = \frac{r}{m+r} p^{\frac{n}{r}} x^{\frac{m+r}{r}}$, le quotient sera $= \frac{m+r}{m+r} x = x$ à la distance du centre de gravité de la portion MAN du sommet A ; & substituant a pour x , on aura $\frac{m+r}{m+r} a = AC$.

E X E M P L E I V.

80. Trouver le centre de gravité de l'espace ADE , compris entre deux paraboles égales AD , AE , se touchant l'une & l'autre au sommet A , & la ligne droite DE parallèle à l'axe commun des deux paraboles.

Faites $AP = x$, $PM = y$, & que le paramètre soit $= 1$, ce qui donnera $AP (x^1) = (PM \times 1) = y$, par conséquent l'effort $xy dx = x^1 dx$ dont l'intégrale est $\frac{1}{2} x^2$. Mais l'intégrale de $y dx$ est $\frac{1}{2} x^2$; donc $\frac{\frac{1}{2} x^2}{\frac{1}{2} x^2} = \frac{1}{2} x = AC$, distance du centre de gravité du sommet A .

Les paraboles AME , AMD de quelques degrés qu'elles soient, auront cette équation $x^m = y^n$, qui exprimera le rapport de AP à PM , par conséquent $y dx = x^{\frac{m}{n}} dx$, & l'effort $xy dx = x^{\frac{m+n}{n}} dx$, dont l'intégrale est $\frac{\frac{m+n}{n} x^{\frac{m+n}{n}}}{\frac{m+n}{n}}$: mais

Fig. 60.

Q

l'intégrale de $y dx$ est $\frac{n}{m+n} x^{\frac{m+n}{n}}$; d'où il suit que le quotient de la division de la première de ces expressions par la dernière qui est $\frac{m+n}{m+n} x$ sera $= AC$.

E X E M P L E V.

81. Déterminer le centre de gravité, d'un arc de cercle.

Fig. 61.

Que BE , corde de l'arc donné BDE , soit parallèle au diamètre FG , regardé comme un axe où sont suspendus les poids infiniment petits BM ; ainsi leurs efforts sont comme $BM \times PE$; & puisque le nombre & les efforts de ces petits poids de chaque côté du rayon AD , coupant également l'arc BDE , sont égaux, le centre de gravité sera en la ligne AD .

Maintenant que $AB=a$, $AP=HB=x$, & $Pp=Bm=dx$; alors $PB (\sqrt{aa-xx}) : AB (a) :: Bm (dx) : BM = \frac{dx}{\sqrt{aa-xx}}$, & $BM \times PE = \sqrt{aa-xx} \times \frac{adx}{\sqrt{aa-xx}} = adx = AB \times Bm$; & la somme des efforts, ou l'intégrale de cette expression différentielle, sera $ax = AB \times BH$, qui étant divisée par l'arc BD , le quotient $\frac{AB \times BH}{BD}$, sera = à la distance du centre de gravité C du centre A du cercle, & substituant le quart du cercle FD , pour BD , & le rayon FA ou AB pour BH ; alors $\frac{AB^2}{FD}$ sera la distance du centre de gravité C du demi-cercle FDG du centre A .

E X E M P L E V I.

82. Déterminer le centre de gravité d'un secteur de cercle ABE .

Fig. 62.

Le centre de gravité est dans le rayon AD , qui coupe l'arc BE ; décrivez l'arc MPM avec une distance quelconque AP , & un autre arc mpm , infiniment proche du premier, après quoi l'effort de l'arc MPM multiplié par Mm ,

DES INFINIMENT PETITS. 123

ou pp , sera l'effort du segment annulaire $mMPMm$, ou la différentielle de l'effort du secteur.

Maintenant que AB soit $=a$, $AF=b$, $BD=c$; alors l'effort de l'arc BDE ($2ab$), sera à l'effort de l'arc MPM , comme le triangle ABE , est au triangle AMM , ou comme AB est à AM , puisque les triangles ABE , AMM sont semblables; d'où il suit que l'effort de l'arc $MPM = \frac{2abx^2}{a^3} = \frac{2bx^2}{a}$, & l'effort du segment annulaire $mMPMm = \frac{2bx dx}{a}$, dont l'intégrale, ou somme $\frac{2bx^2}{3a}$, divisée par la somme des poids, ou par l'aire ac du secteur, le quotient $\frac{2bx^2}{3ac}$ sera la distance du centre de gravité du secteur du cercle MPM .

EXEMPLE VII.

83. Trouver le centre de gravité d'un segment quelconque MAm d'une hyperbole.

Faites AC, a , CB, b , AP, x , PM, y , par la nature de la courbe on aura $\frac{bb}{aa} \times \frac{2ax + xx}{yy} = yy$; donc l'élément des efforts, sera $\frac{2b}{a} x^{\frac{1}{2}} dx \sqrt{2a+x}$, & celle de la différence des poids sera $\frac{2b}{a} x^{\frac{1}{2}} dx \sqrt{2a+x}$, dont chacune peut être comparée à la quatrième forme des Tables de M. Cotes.

Car faisant $\theta=2$, $n=1$, $\phi=c$, on aura la somme des efforts $= \frac{-3aa+ax+2xx}{3} \times y + 2a^2b \left| \frac{yx + \sqrt{2a+x}}{\sqrt{2a}} \right|$. De plus supposant $\theta=1$, $\phi=c$, la somme des poids sera $= \frac{a+x}{\sqrt{2a}} \times y + 2ab \left| \frac{\sqrt{x + \sqrt{2a+x}}}{\sqrt{2a}} \right|$. Ainsi divisant la première intégrale par la

dernière, on aura $\frac{-3aa+ax+2xx}{a+x} \times y + 2a^2b \left| \frac{\sqrt{x + \sqrt{2a+x}}}{\sqrt{2a}} \right|$

$=$ à la distance du centre de gravité du sommet D .

Pour construire maintenant cette expression, faites CB
 Qij

Fig. 63.

(b) : CA (a) :: PM (y) : CF = $\frac{ay}{b}$. Faites aussi PM (y) : CB

(b) :: CA (a) : CG = $\frac{ab}{y}$; ensuite prenez CH égal à la mesure du rapport de CA (a) à FP (a+x- $\frac{ay}{b}$); lequel rapport est == à la raison doublée de $\sqrt{2a}$, à $\sqrt{x}$ - $\sqrt{2a+x}$; cela fait, si vous faites comme 3PH (3a+3x- $\frac{3ab}{y}$ | $\frac{a}{a+x-\frac{ay}{b}}$):

$$2CF(\frac{2ay}{b}) :: CF(\frac{ay}{b}) : CZ = \frac{4ax+2xx}{3a+3x-\frac{3ab}{y} | \frac{a}{a+x-\frac{ay}{b}}},$$

cette quatrième proportionnelle sera égale à la distance du centre de gravité Z du centre C; car si on retranche CA

$$(a), \text{ il viendra } \frac{4ax+2xx}{3a+3x-\frac{3ab}{y} | \frac{a}{a+x-\frac{ay}{b}}} - a =$$

$$\frac{-3ad+ax+2xx \times y-2a'b | \frac{yx+\sqrt{2a+x}}{\sqrt{2a}}}{a+x \times y-2ab | \frac{yx+\sqrt{2a+x}}{\sqrt{2a}}}, \text{ qui est la même}$$

expression qu'on avoit trouvée en premier lieu.

S C H O L I E.

84. La distance du centre de gravité d'un segment d'ellipse, ou de cercle à son sommet, s'exprime ainsi;

$$\frac{-3ad-ax+2xx \times y-2a'b | \frac{yx+\sqrt{2a-x}}{\sqrt{2a}}}{a-x \times y-2ab | \frac{yx+\sqrt{2a-x}}{\sqrt{2a}}}, \text{ étant la même}$$

me que celle du centre de gravité de l'hyperbole, ne différant seulement que par le changement de quelques signes, & la mesure du rapport dans l'hyperbole se changeant dans le cercle & dans l'ellipse en la mesure d'un angle, parce que R ($=\sqrt{-f}$) $=\sqrt{-1}$ est négatif.

E X E M P L E V I I I.

85. Trouver le centre de gravité de l'espace extérieur $AMmaA$ de l'hyperbole.

Que le demi-diamètre conjugué $BC=b$, & le demi-transverse $AC=a$, l'abscisse $CP=y$, & l'ordonnée correspondante $PM=x$. Par la propriété de la courbe on aura $\frac{b}{a} \sqrt{xx-aa}=yy$, ainsi $x=\frac{a}{b} \sqrt{bb+yy}$; donc $\frac{2a}{b} dy \sqrt{bb+yy}$

Fig. 64.

fera l'élément des petits poids, & $\frac{2a}{b} y dy \sqrt{bb+yy}$, celui des efforts; & par la comparaison de cette différentielle avec la troisième forme des Tables de M. Cotes, faisant $\theta=1$, $\eta=2$, &c. l'intégrale se trouvera $=\frac{2a}{3b} | \frac{bb+yy}{b} |^{\frac{3}{2}}$; & faisant $y=0$, la même deviendra $2ab^2$, qu'il faut soustraire de cette intégrale, le reste $\frac{2a}{3b} | \frac{bb+yy}{b} |^{\frac{3}{2}} - 2ab^2$, fera l'intégrale

de la différentielle $\frac{2a}{b} y dy \sqrt{bb+yy}$; & l'intégrale de $\frac{2a}{b} dy \sqrt{bb+yy}$, comparée à la quatrième forme, en faisant $\theta=0$, $\eta=2$, &c. sera $\frac{a}{b} \sqrt{bb+yy} + ab | \frac{1+\sqrt{bb+yy}}{b} |$, par laquelle divisant l'intégrale qu'on vient de trouver,

le quotient $\frac{\frac{2a}{3b} \times \frac{bb+yy}{b} |^{\frac{3}{2}} - 2ab^2}{\frac{a}{b} \sqrt{bb+yy} + ab | \frac{1+\sqrt{bb+yy}}{b} |} =$

$\frac{2 \times \frac{bb+yy}{b} |^{\frac{3}{2}} - 2b^3}{3y \sqrt{bb+yy} + 3bb | \frac{1+\sqrt{bb+yy}}{b} |}$, fera $=$ à la distance du centre de gravité Z du centre C .

Pour construire maintenant cette expression, faites $AC(a) : PM(\frac{a}{b} \sqrt{bb+yy}=x) :: BC(b) : CR=\sqrt{bb+yy}$.

De plus faites $PM(\frac{a}{b} \sqrt{bb+yy}) : AC(a) :: BC(b) : CS=$

$\frac{b^3}{\sqrt{bb+yy}}$, & faites encore $PM (\frac{a}{b} \sqrt{bb+yy}) : AC (a) ::$
 $CS (\frac{b^3}{\sqrt{bb+yy}}) : CT = \frac{b^3}{bb+yy}$.

Que CR, CT tendent vers le même endroit, par exemple, de C vers PM ; mais que CS se meuve dans un sens contraire; ensuite prenez CN égal à la mesure du rapport qui est entre $CB (b)$ & $ER (\sqrt{bb+yy}-y)$ comparé au module $CS (\frac{b^3}{\sqrt{bb+yy}})$ qui s'exprime ainsi $\frac{bb}{\sqrt{bb+yy}} \mid \frac{b}{\sqrt{bb+yy}-y}$; ce qui étant fait, faites $PN (3y + \frac{b^3}{\sqrt{bb+yy}} \mid \frac{b}{\sqrt{bb+yy}}) : 2TR (2\sqrt{bb+yy} - \frac{b^3}{bb+yy}) :: CR (\sqrt{bb+yy})$ est à une quatrième

proportionnelle $= \frac{2 \times \sqrt{bb+yy}^{\frac{1}{2}} - 2b^3}{3y\sqrt{bb+yy} + 3bb \mid \frac{1-y\sqrt{bb+yy}}{b}} = CZ,$

distance cherchée.

Remarquez que la construction de ces deux exemples est la même que celle qu'a donnée M. Cotes dans son *Harmonia mensuratum*, pag. 25, 26. part. première.

EXEMPLE I X.

86. *Trouver le centre de gravité d'un cône droit & d'une pyramide.*

Fig. 43.

Le centre de gravité est quelque part dans l'axe AB . Si on fait maintenant $AP=x$, $BC=a$, $AB=b$, on aura $PM = \frac{ax}{b}$, & le rapport du rayon à la circonférence étant celui de r à p , la différentielle du petit poids $= \frac{paxx}{2rb^3} dx$, & l'effort de ce même petit poids sera $\frac{paxx^2}{2rb^3} dx$, par conséquent la somme des efforts $\frac{paxx^3}{3rb^3}$ divisée par la somme des poids $\frac{paxx^2}{6rb^3}$, donnera $\frac{3}{4} x = AG$, distance du centre de gravité de la partie AMP du cône; donc $\frac{3}{4} AB$, sera la distance du centre

DES INFINIMENT PETITS. 117

de gravité de tout le cone depuis le sommet *A*.

Vous trouverez de la même manière que la distance du centre de gravité d'une pyramide depuis son sommet, est au $\frac{3}{4}$ de son axe depuis ce même sommet.

E X E M P L E X.

87. *Trouver le centre de gravité d'un segment quelconque de la sphere.*

Que $AC=r$, $AP=x$, alors la differentielle des poids sera $pxdx - \frac{px'dx}{2r}$, & celle des efforts sera $px'dx - \frac{px'dx}{2r}$, & la somme des efforts sera $\frac{px^2}{3} - \frac{px^2}{8r}$, qui étant divisée par $\frac{pxx}{2} - \frac{px^2}{6r}$, somme des poids, le quotient $\frac{8rx-3xx}{12r-4x}$ sera la distance du centre de gravité du point *A* du segment d'une sphere formée par la révolution d'un demi-segment *AMP*, du demi-cercle autour de *AP*. Fig. 44.

C O R O L L A I R E.

88. Il suit de-là que le centre de gravité de la demi-sphere est $\frac{5}{8}r$; car dans cet exemple x devient $=r$.

E X E M P L E X I.

89. *Trouver le centre de gravité d'un conoïde parabolique formé par la révolution d'une parabole autour de son axe.*

Dans cet exemple $\frac{pxdx}{2}$ est la differentielle des poids; & $\frac{px'dx}{2}$, celle des efforts, r étant le demi-parametre, la somme des poids est $\frac{px^2}{4}$, celle des efforts est $\frac{px^2}{6}$, qui étant divisée par $\frac{px^2}{4}$, le quotient sera $\frac{2}{3}x$ distance du centre de gravité de la parabole ordinaire depuis son sommet *A*.

E X E M P L E X I I.

90. *Trouver le centre de gravité d'un solide formé par la révolution de l'espace parabolique $AMBD$, autour d'une ligne BT parallèle à son axe.*

Fig. 65. Que BD ou $AT=r$, $AP=x$, $PM=y$, on aura $\frac{r^2}{2} - py + \frac{y^3}{3} =$ à un cercle décrit par M comme rayon, & par conséquent sera $px^{\frac{1}{2}} dx - \frac{px dx}{2r}$ pour la différentielle des poids, & $px^{\frac{1}{2}} dx - \frac{px^2 dx}{2r}$ pour celle des efforts. L'intégrale de la première expression ou la somme des poids est $\frac{2}{3} px^{\frac{3}{2}} - \frac{rx^2}{4r}$, & la somme des efforts est $\frac{2}{5} px^{\frac{5}{2}} - \frac{rx^3}{6r}$, qui étant divisée par la somme des poids, le quotient sera $\frac{\frac{2}{5} rx^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{6} rx^3}{\frac{2}{3} rx^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{4} rx^2} = \frac{24rx^{\frac{5}{2}} - 10rx^3}{40rx^{\frac{3}{2}} - 15x^2}$, distance du centre de gravité de la partie du solide formée par APM ; & quand x devient $=a$ & $y=r$, la distance sera $=\frac{14}{25} a$.

E X E M P L E X I I I.

91. *Trouver le centre de gravité d'un conoïde hyperbolique ABG , formé par la révolution de l'espace hyperbolique ABG autour de l'axe transversale $ACAP$.*

Fig. 41. Nommant maintenant AC , $2b$, AB , a , & l'ordonnée BG , r , l'élément des poids sera $\frac{prx dx + 2bpr dx}{2aa - 4ab}$, & celui des efforts, A étant le centre du mouvement, sera $\frac{prx^2 dx + 2bprx dx}{2aa - 4ab}$, dont l'intégrale sera $\frac{prx^3}{6aa - 12ab} + \frac{bprx^2}{3aa - 6ab} = \frac{3prx^3 - 8bprx^2}{24aa - 48ab}$, qui étant divisée par $\frac{prx^3 + 3bprx^2}{6aa - 12ab} = \frac{4prx^3 + 12bprx^2}{24aa - 48ab}$, somme des poids,

DES INFINIMENT PETITS. 129

poids, le quotient $\frac{3xx+8bx}{4x+12b}$, fera la distance du centre de gravité du point A dans l'axe AP du conoïde formé par la révolution de la partie AMP de l'hyperbole; & quand $x=a$, la distance du centre de gravité de tout le solide depuis le sommet A , fera $\frac{3aa+8ab}{4a+12b}$; d'où il suit que $3a+8b:4a+12b::a:\frac{3aa+8ab}{4a+12b}$.

E X E M P L E X I V.

92. *Trouver le centre de gravité d'un conoïde hyperbolique formé par la révolution de l'espace hyperbolique AMBCD autour de CD, moitié de l'axe conjugué.*

Faisant les mêmes suppositions que dans l'art. 61. l'élément ou la différence des poids sera $\frac{apx^2dx+aabpdx}{2bbr}$, & celui des efforts par rapport à AC est $\frac{apx^3dx+aabpdx}{2bbr}$, dont l'intégrale sera $\frac{apx^4}{8bbr} + \frac{aabpdx}{4bbr} = \frac{px^4y+2bbpx^2y}{8rx^2+8bbr}$, en substituant $\frac{bby}{xx+bb}$ pour aa : qui étant divisé par la somme des poids, le quotient $\frac{3x^2+6bbx}{4xx+12bb}$, fera la distance du centre de gravité du conoïde formé par l'espace $ACPM$ autour de la ligne ou axe AC . Et quand x devient $=b$, on aura $\frac{9}{12}b$, pour la distance de ce même centre de gravité.

Fig. 48.

C'est pourquoi le centre de gravité de tout le conoïde, est tellement situé dans l'axe AC , que la partie depuis le centre C , jusqu'au centre de gravité, est à AC comme 9 à 16.

E X E M P L E X V.

93. *Trouver le centre de gravité d'un demi-sphéroïde formé par la révolution du demi-espace elliptique AMca, autour de l'axe Aa.*


Faites $AC=a$, $Cc=r$, $AP=x$, $PM=y$; alors quand PC devient x , la différentielle des poids sera $\frac{pyydx}{2r}$; mais par

Fig. 49.

R

la nature de l'élipse, AP étant x , $yy : 2ax - xx :: yy : aa$;
 d'où on tire $yy = \frac{2axyx - y^2x^2}{aa}$; & substituant cette valeur
 dans $\frac{yydx}{2x}$, on aura $\frac{2aprx dx - prx^2 dx}{2aa}$; & multipliant par x , la
 différentielle des efforts sera $\frac{2aprx dx - prx^2 dx}{2aa}$, dont l'intégrale
 par exemple $\frac{prx^2}{2a} - \frac{prx^3}{6aa} = \frac{8aprx^2 - 3prx^3}{24aa}$, qui étant divisée
 par $\frac{12aprx - 4prx^2}{24aa}$ somme des poids, le quotient $\frac{8ax - 3xx}{22a - 4x}$,
 sera la distance du centre de gravité de la partie du solide
 formé par l'espace APM du point A ; & quand x devient
 $= a$, la même distance sera $\frac{2}{3}a$, c'est-à-dire, que le centre
 de gravité du demi-sphéroïde est distante de A de $\frac{2}{3}a$.





SECTION VII.

*Usage du calcul différentiel & integral dans la recherche
des centres de percussion des figures.*

D E F I N I T I O N.

94. **L**E centre de *percussion* ou d'*oscillation* d'une figure en mouvement, est le point dans lequel toutes les forces de cette figure sont regardées comme étant toutes réunies en un seul point, de manière que si cette figure rencontre un obstacle contraire à la direction de son mouvement, elle choquera cet obstacle dans ce point avec plus de force qu'elle ne feroit dans tout autre point de la figure.

Pour cet effet il est nécessaire que les parties de la figure changent constamment la disposition qu'elles ont à se mouvoir, & qu'elles séparent leur quantité de mouvement, non comme dans les centres de gravité, en raison des espaces parcourus; mais en raison composée de leurs vitesses, & des distances de ces centres réciproquement proportionnels à ces mêmes vitesses, ou, ce qui est la même chose, qu'elles séparent leur quantité de mouvement en parties égales à chaque côté de ce point d'oscillation. C'est pourquoi le centre de percussion est par rapport aux vitesses, ce que le centre de gravité est à l'égard des petits poids; & comme pour trouver le centre de gravité, on divise la somme des efforts par la somme des poids; ainsi pour trouver le centre de percussion, il faut multiplier la somme des efforts par des lignes droites égales ou proportionnelles aux espaces mus, & diviser le produit par la somme des efforts; d'où il suit :

Que la règle générale pour trouver le centre de percussion d'une figure qui se meut autour d'un point donné ou axe, est de multiplier toutes les parties qui composent la

R ij

figure (c'est-à-dire, toute son aire ou toute sa solidité) considérées comme autant de poids , par les quarrés de leurs distances du point de suspension , & diviser le produit par celui des mêmes poids multipliés par les distances de l'axe du mouvement , & le quotient sera la distance du centre de percussion du point ou axe de mouvement.

Fig. 59.

Il suit de-là que si $AP=x$, $MN=2y$, $Pp=dx$, l'effort de tout le petit poids MNm , sera $=2yx dx$. Par conséquent la distance du centre de percussion du point A , est égale à l'intégrale de $2yx^2 dx$, divisée par l'intégrale de $2yxdx$. Donc si par l'équation de la courbe vous trouvez la valeur de y , que vous substituez dans ces différentielles, & qu'ensuite vous en prenez les intégrales, vous trouverez la distance du centre de percussion depuis le point A , ce qui sera éclairci par les exemples suivants.

E X E M P L E P R E M I E R.

95. *Trouver le centre de percussion d'une ligne droite AB , qui se meut autour de son extrémité A .*

Fig. 65.

Si on conçoit maintenant cette ligne comme divisée en une infinité de petites parties égales $Pp(dx)$, AB étant a , & AP, x , il est évident qu'en tems égaux elles décriront des arcs égaux de cercles concentriques, qui seront les uns aux autres comme les distances du point A ; mais la vitesse avec laquelle les mêmes arcs sont décrits, sont proportionnelles aux mêmes arcs; ainsi les vitesses sont comme les distances.

Maintenant $x dx$ sera l'élément ou différentielle des efforts, qui multiplié par x , qui représente les vitesses, donnera $x^2 dx$ pour la différentielle des forces, dont l'intégrale $\frac{x^3}{3}$ étant divisée par la somme des efforts $\frac{x^2}{2}$, le quotient $\frac{2}{3}x$ sera la distance du centre de percussion de la partie AP de la ligne depuis le point A , & le centre de percussion de toute la ligne sera $\frac{2}{3}a$ faisant $x=a$.



E X E M P L E I I.

96. *Trouver le centre de percussion d'un rectangle RIST, se mouvant autour d'un de ses côtés RI.*

Si $RI = SH = a$, $AP = x$, alors $Pp = dx$, sera l'élément de l'aire, & un des petits poids sera $= adx$, & son effort sera $axdx$; d'où il suit que l'intégrale de ax^2dx , divisée par l'intégrale de $axdx$ (ou $\frac{\frac{1}{3}ax^3}{\frac{1}{2}ax^2}$) le quotient $\frac{2}{3}x$, sera la distance du centre de percussion de la partie $RCDI$ du parallélogramme depuis le côté RI ; & si au lieu de x on substitue la hauteur $RS = b$ de tout le triangle, la distance du centre de percussion depuis le côté RI sera $= \frac{2}{3}b$.

Fig. 66.

E X E M P L E I I I.

97. *Trouver le centre de percussion d'un triangle isocèle SAH, se mouvant autour de la ligne RI, passant par le sommet A, & parallèle à la base SH.*

Que la hauteur AE soit $= a$, $AP = x$, $EH = \frac{1}{2}b$, $PL = y$. Ensuite $AP(x) : PL(y) :: AE(a) : EH = \frac{1}{2}b$. D'où il suit que $ay = \frac{1}{2}bx$, & $y = \frac{bx}{2a}$; mais l'intégrale de $yx^2dx =$ l'intégrale de $\frac{bx^3dx}{2a}$ est $= \frac{bx^4}{4a}$, & l'intégrale de $yx^2dx =$ l'intégrale de $\frac{bx^3dx}{2a}$ est $= \frac{bx^4}{4a}$; par conséquent l'intégrale de yx^2dx , divisée par l'intégrale de yx^2dx , ou $\frac{6abx^4}{8abx^4} = \frac{6}{8}x = \frac{3}{4}x$.

Fig. 66.

Mais si vous substituez pour x , toute la hauteur $AE = a$, la distance du centre de percussion de tout le triangle ASH , depuis le sommet A , sera $\frac{3}{4}a = \frac{3}{4}AE$.

E X E M P L E I V.

98. *Trouver le centre de percussion d'un triangle isocèle SAH qui se meut autour de sa base SH.*

Que tout soit comme dans l'exemple précédent, ce qui

Fig. 66.

donne $PE = a - x$; d'où il suit que l'intégrale de $yx^2 dx =$ à l'intégrale de $\frac{bx dx}{1a} \times a - x$ ($=$ à l'intégrale de $\frac{1}{2} abx dx - bx^2 dx + \frac{bx^3}{3a}$) est $= \frac{1}{2} abx^2 - \frac{1}{3} bx^3 + \frac{bx^4}{8a}$; & l'intégrale de $yx dx =$ à l'intégrale de $\frac{bx dx}{1a} \times a - x$ ($=$ à l'intégrale de $\frac{1}{2} bxdx - \frac{bx^2}{2a}$) $= \frac{1}{2} bx^2 - \frac{bx^3}{6a}$. Par conséquent le quotient de l'intégrale de $yx^2 dx$, divisée par l'intégrale de $yx dx$

$$\left(\frac{\frac{1}{2} abx^2 - \frac{1}{3} bx^3 + \frac{bx^4}{8a}}{\frac{1}{2} bx^2 - \frac{bx^3}{6a}} \right)$$

$$= \frac{24a^2 bx^2 - 32abx^3 + 12bx^4}{96a}$$

$$= \frac{6abx^2 - 4bx^3}{24a}$$

$$= \frac{6a^2 bx^2 - 16abx^3 + 6bx^4}{12abx^2 - 8abx^3} = \frac{6a^2 - 8ax + 3x^3}{6a - 4x} = \text{à la distance du centre de percussion du segment } SZFH, \text{ depuis la baze } SH.$$

Si maintenant pour x , vous substituez a , vous aurez la distance du centre de percussion de tout le triangle $SAH =$

$$\left(\frac{6a^2 - 8a^2 + 3a^3}{6a - 4a} \right) = \frac{1}{2} a = \frac{1}{2} AE.$$

E X E M P L E V.

99. *Trouver le centre de percussion d'un espace parabolique qui se meut autour d'une ligne passant par le sommet de la parabole parallèle à sa baze.*

Nommant maintenant l'abscisse x , toute la hauteur a ; la différentielle des efforts sera $x^{\frac{1}{2}} dx$, & celles des forces sera $x^{\frac{5}{2}} dx$, dont l'intégrale est $\frac{2}{7} x^{\frac{7}{2}}$, qui étant divisée par $\frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}}$ somme des efforts, le quotient sera $\frac{5}{7} x =$ à la distance du centre de percussion de la partie de la parabole dont la hauteur est x , depuis le sommet ; & quand x devient égal à a ,

DES INFINIMENT PETITS. 135

la distance du centre de percussion de toute la parabole sera $\frac{7}{10} a$.

SCHOLIE.

100. Si on demande le centre de percussion d'une parabole d'un degré quelconque, on aura $\frac{1-m+1}{3m+1} a$ = à la distance du centre de percussion depuis le sommet ; dans cette expression generale, m est l'exposant de la puissance de l'ordonnée de la parabole : De maniere que si $m=2$, la distance sera $\frac{7}{10} a$, comme dans la parabole ordinaire, si $m=3$, comme dans la parabole cubique, la distance sera $= \frac{7}{10} a$, &c.

E X E M P L E V I.

101. *Trouver le centre de percussion d'un espace parabolique, qui se ment autour de la baze DD.*

Multipliez la differentielle des poids $x^{\frac{1}{2}} dx$, par $a-x$, Fig. 58
& on aura $ax^{\frac{1}{2}} dx - x^{\frac{1}{2}+1} dx$ = à la differentielle des efforts, qui étant encore multipliés par $a-x$, donnera pour la differentielle des forces $aa x^{\frac{1}{2}} dx - 2ax^{\frac{1}{2}+1} dx + x^{\frac{1}{2}+2} dx$, dont l'integrale $\frac{2}{3} aax^{\frac{1}{2}+1} - \frac{2}{5} ax^{\frac{1}{2}+2} + \frac{2}{7} x^{\frac{1}{2}+3} =$
 $70 aax^{\frac{1}{2}+1} - 84 ax^{\frac{1}{2}+2} + 30 x^{\frac{1}{2}+3}$ étant divisée par la

105.
somme des efforts $\frac{10ax^{\frac{1}{2}+1} - 6x^{\frac{1}{2}+2}}{15}$, le quotient sera

$\frac{35aa - 42ax + 15x^2}{35a - 12x}$, distance du centre de percussion de l'espace $DMND$, depuis la baze DD , & substituant x pour a , la distance du centre de percussion de toute la parabole depuis la baze DD , sera $\frac{7}{10} a = \frac{7}{10} AB$.



E X E M P L E V I I.

102. *Trouver le centre de percussion d'un cylindre AB , qui se meut autour de son extrémité A .*

Fig. 67.

Il est clair que les vitesses de toutes les petites parties égales de ce solide, seront les unes aux autres, à cause des tems égaux, dans les mêmes raisons que les espaces rm ; c'est-à-dire, comme les arcs décrits dans leur mouvement, ou comme les rayons, ou les distances du point de suspension : présentement que l'axe AB du cylindre soit $=x$, une partie quelconque $AP=x$, la circonférence de la baze $=p$, & son rayon $=r$; alors la différentielle des efforts sera $\frac{prx}{2}$, & celle des forces $\frac{prx^2}{2}$, dont l'intégrale est $\frac{prx^3}{6}$, qui étant divisée par la somme des efforts $=\frac{prx^4}{4}$, le quotient $\frac{3}{4}x$ sera la distance du centre de percussion de la partie du cylindre, dont la hauteur ou distance du point A , est AP , & $\frac{3}{4}x$, sera la distance du centre de percussion de tout le cylindre de ce même point A .

E X E M P L E V I I I.

103. *Trouver le centre de percussion d'un cylindre qui se meut autour du point R dans l'axe prolongé.*

Fig. 67.

Faites $RB=a$, $RA=b$, $AP=x$, alors $RP=b+x$, & $AB=a-b$, par conséquent $\frac{bpx - x^2px}{2}$ est l'élément des efforts; mais les vitesses des petits poids égaux du solide, sont les unes aux autres comme les arcs décrits du point R par ces mêmes poids; ainsi les forces sont les unes aux autres comme les lignes droites qui forment le trapeze décrit par le cylindre. D'où il suit que multipliant cette expression différentielle des efforts par $b+x$, on aura $\frac{b^2px - x^2bpx + x^3px}{2}$ = à la différentielle des forces dont l'intégrale est $=\frac{b^2px^2}{2} - \frac{b^2px^3}{3} + \frac{px^4}{4}$, qui étant divisée par la somme des efforts $=\frac{b^2px}{2} - \frac{b^2px^2}{4} + \frac{px^3}{4}$, donnera

DES INFINIMENT PETITS. 137

donnera pour quotient $\frac{6bb+6bx+3xx}{6b+3x}$, fera la distance du centre de percussion de la partie dont la hauteur est AP , depuis le point R , & $\frac{3aa+2ab+bb}{3a+b}$, fera la distance du centre de percussion de tout le cylindre depuis le point R ; car alors x devient $a-b$. De là il est aisé de trouver dans quelle partie d'un cylindre de bois, une personne doit frapper, afin de donner le plus grand coup qu'il est possible; supposant que AR représente le bras de la personne, & AB le bâton.

E X E M P L E I X.

104. *Trouver le centre de percussion d'un cône qui se ment autour de son sommet A.*

La différentielle des efforts est $\frac{px^2dx}{3aa}$, & celle des forces *Fig. 43.* est $\frac{px^2dx}{3aa}$, dont l'intégrale $\frac{px^3}{10aa}$, étant divisée par la somme des efforts $= \frac{px^3}{8aa}$, le quotient $\frac{8}{10} x$ fera la distance du centre de percussion de la partie du cône, dont la hauteur est AP depuis le sommet A , & $\frac{8}{10} a$, fera la distance du centre de percussion de tout le cône depuis le sommet A .

Remarquez que ce centre de percussion est le même que celui de gravité du complément de la parabole cubique; les forces étant comme les lignes qui forment ce complément.

E X E M P L E X.

105. *Trouver le centre de percussion d'une sphère qui se ment autour d'un point A à l'origine du diamètre AD.*

Supposez le rayon $= r$, la circonférence $= p$, & $AP = x$; *Fig. 44.* vous aurez pour la différentielle des efforts $px^2dx - \frac{px^2dx}{2r}$, & pour celle des forces $px^2dx - \frac{px^2dx}{2r}$, dont l'intégrale sera $= \frac{px^3}{4} - \frac{px^3}{10r}$; qui étant divisée par la somme des efforts $= \frac{px^3}{3} - \frac{px^3}{8r}$; le quotient $\frac{30rx-12xx}{40r-15x}$, fera la distance du centre

S

de percussion du segment de la sphere, dont la hauteur est x , depuis le point A ; & $\frac{4}{3}r$, sera la distance du centre de percussion de toute la sphere depuis ce même point.

E X E M P L E X I.

106. *Trouver le centre de percussion d'un conoïde parabolique qui se meut autour de son sommet.*


La différentielle des efforts sera $\frac{yx^2dx}{2r}$, & celle des forces $\frac{px'dx}{2r}$ dont l'intégrale sera $= \frac{px^4}{8r}$ qui étant divisée par $\frac{px^4}{6r}$, le quotient $\frac{3}{4}x$, sera la distance du centre de percussion, de la partie du conoïde dont la hauteur est x , depuis le sommet, & $\frac{3}{4}a$, sera la distance du centre de percussion de tout le conoïde depuis le sommet.

E X E M P L E X I I.

107. *Trouver le centre de percussion d'un sphéroïde qui se meut autour d'un bout de son axe transversale.*

Les mêmes choses étant supposées que dans l'art. 93. La différentielle des efforts sera $\frac{2aprx'dx - prx'dx}{2aa}$, & celle des forces sera $\frac{2aprx'dx - prx'dx}{2aa}$, dont l'intégrale $\frac{prx^4}{4a} - \frac{prx^4}{20aa}$, divisée par la somme des efforts $= \frac{prx^2}{5a} - \frac{prx^4}{8aa}$, le quotient $\frac{30ax - 12xx}{40a + 15x}$, sera la distance du centre de percussion de la partie du sphéroïde, dont la hauteur est x depuis le point du mouvement, & $\frac{3}{4}a$ sera la distance cherchée de toute la sphéroïde.





SECTION VIII.

Résolution de divers Problemes par le calcul differentiel
& integral.

PROBLEME PREMIER.

108. Trouver une ligne, dans laquelle la sous-tangente soit
égale à la demie-ordonnée.

DAns tous les cas il est évident que l'expression de la
sous-tangente est $\frac{ydx}{dy}$; ainsi par la condition du pro-
bleme $\frac{ydx}{dy} = y$, & $ydx = ydy$, c'est-à-dire, $dx = dy$, & l'inté-
grale de chaque membre sera $x = y$. D'où il suit que la ligne
cherchée est l'hypothénuse d'un triangle rectangle, en re-
gardant comme son axe la ligne coupant en deux cet angle
droit : mais si x est l'arc d'un cercle, alors la ligne cherchée
sera une cycloïde.

PROBLEME II.

109. Trouver une courbe, dont la sous-tangente égale deux
fois le carré d'une demie-ordonnée divisée par
une quantité constante supposée a .

L'A sous-tangente est $\frac{ydx}{dy}$. D'où il suit que $\frac{ydx}{dy}$ doit être
 $= \frac{2y^2}{a}$. Par conséquent $aydx = 2y^2dy$, c'est-à-dire,
 $adx = 2ydy$, & trouvant l'intégrale de chaque membre, on
aura $ax = yy$; ainsi la courbe cherchée sera la parabole
d'Apollonius.



DES INFINIMENT PETITS. 141

nombre plus grand que 1, sera l'integrale de $\frac{dy}{1+y} = dy - ydy + y^2dy - y^3dy + y^4dy - y^5dy$, &c. laquelle integrale est $= y - \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{4}y^4 + \frac{1}{5}y^5 - \frac{1}{6}y^6$, &c. = le logarithme de ce nombre qui est plus grand que 1.

De plus, si la difference de AB à Q est y , ce qui donne $QN = 1 - y$. Ainsi AQ , ou ce qui est la même chose, le logarithme du nombre moindre que 1, sera égal à l'integrale de $\frac{-dy}{1-y} = dy - ydy - y^2dy - y^3dy - y^4dy - y^5dy$, &c. dont l'integrale sera $= -y - \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{4}y^4 - \frac{1}{5}y^5 - \frac{1}{6}y^6$, &c. étant le logarithme d'un nombre moindre que 1.

SCHOLIE.

113. Si le côté AB , ou BC , de la puissance d'une hyperbole $= 1$, & $BP = y$; alors on aura $AP = 1 - y$, & l'espace asymptotique hyperbolique sera $= y - \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{4}y^4 + \frac{1}{5}y^5 - \frac{1}{6}y^6 + \frac{1}{7}y^7$, &c. & si $BQ = y$: on a dans ce cas $AQ = 1 - y$, & la differentielle $\frac{-dy}{1-y}$, sera celle de l'espace asymptotique hyperbolique. D'où il suit que cet espace sera $= -y - \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{4}y^4 - \frac{1}{5}y^5 - \frac{1}{6}y^6$, &c.

Fig. 69.

Par conséquent les logarithmes peuvent être représentés par l'hyperbole; car si le côté AB de la puissance de l'hyperbole $= 1$, l'abscisse AP sera égale à un nombre plus grand que 1, & l'espace asymptotique $BCMP$ sera égal au logarithme d'un nombre plus grand que 1; de même l'abscisse AQ sera égale à un nombre moindre que 1, & l'espace asymptotique $QNCB$ sera égal au logarithme d'un nombre moindre que 1. De plus si $y = 1$, alors on aura $1 - y = 0$; ainsi le logarithme hyperbolique de 2 sera $\frac{1}{2} - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} - \frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^5} - \frac{1}{2^6}$, &c. mais ces series convergent lentement, chose à quoi on peut remédier en substituant $\frac{x}{1+x}$ pour y .

Remarquez que ces logarithmes hyperboliques sont les mêmes que ceux de *Neper*, & different par conséquent de ceux de *Briggs*, dont nous nous servons communement; cependant on peut les réduire à ceux de *Briggs* étant aux siens comme le logarithme hyperbolique de 10; par exemple, 2. 302585092994, &c. au logarithme de *Briggs* de 10 qui est 1. 000000000000, &c.

SCHOLIE II.

114. Si z est un nombre impair dont on cherche le logarithme, les nombres $z-1$, & $z+1$, seront égaux; ainsi leurs logarithmes & la différence de leurs logarithmes seront donnés, que nous supposons y . De même le logarithme d'un nombre moyen proportionnel géométrique entre les nombres $z-1$, & $z+1$, sera la moitié de la somme des logarithmes. La serie $y \times \frac{1}{4z} + \frac{1}{24z^3} + \frac{7}{360z^5} + \frac{181}{15120z^7} + \frac{13}{25200z^9}$ sera le logarithme du rapport du moyen proportionnel géométrique entre les nombres $z-1$, & $z+1$, à un moyen proportionnel arithmétique, *par exemple*, au nombre z .

PROBLEME VI.

115. Si un corps descend librement du point A , par le seul effet de la pesanteur, le long de deux plans inclinés AB , AC , aux points B & C . On demande la proportion des tems qu'il faut pour décrire ces espaces.

Fig. 70. Que ADE soit une ligne verticale, & BD , CE des lignes horizontales; nommez AD , a ; AE , b ; DB , x ; & EC , z .

Il est évident, que le tems qu'un corps employé à parcourir une partie infiniment petite d'une ligne quelconque, comme AB ou AC , peut être pris pour la différentielle ou la fluxion du tems qu'il employeroit à parcourir les lignes entières AB & AC , ce qui étant accordé, $AB = \sqrt{aa+xx}$, & $AC = \sqrt{bb+zz}$, la différentielle de la première sera $\frac{x dx}{\sqrt{aa+xx}}$, & celle de la seconde $\frac{z dz}{\sqrt{bb+zz}}$.

De plus la vitesse du corps décrivant la partie infiniment petite de AB , exprimée par $\frac{x dx}{\sqrt{aa+xx}} = Bb$, & celle de AC , exprimée par $\frac{z dz}{\sqrt{bb+zz}} = Cc$, sera égale à la vitesse respective que le corps tombant perpendiculairement du point A , auroit dans les points D & E ; les vitesses décrivant les petites parties Bb , Cc , étant regardées comme égales, qui sont

DES INFINIMENT PETITS. 143

proportionnelles aux $\sqrt{AD}$ ($\sqrt{a}$) & à $\sqrt{AE}$ ($\sqrt{b}$) ; par conséquent les tems employés à décrire Bb , & Cc , sont comme $\frac{xdx}{\sqrt{a^2+ax}}$ & $\frac{x dx}{\sqrt{b^2+bx}}$, (les tems employés à décrire des espaces quelconques, étant en raison directe des espaces, & en raison inverse des vitesses) ; par conséquent le tems employé à décrire AB , sera au tems qu'il faut pour parcourir AC comme l'intégrale de la première différentielle est à celle de la seconde ; ces intégrales se trouvant aisément par la cinquième forme des Tables de M. Cotes, en faisant $\theta=1$, $\theta=2$, &c. celle de la première étant $\sqrt{\frac{aa+xx}{a}}$, & celles de la seconde $\sqrt{\frac{bb+xx}{b}}$, de façon que le tems employé à parcourir AB , est au tems qu'il faudra pour parcourir AC , comme $\frac{AB}{\sqrt{AD}}$ ($\sqrt{\frac{aa+xx}{a}}$) est à $\frac{AC}{\sqrt{CE}}$ ($\sqrt{\frac{bb+xx}{b}}$).

PROBLEME VII.

116. *Trouver la nature de la courbe BC, telle qu'un corps tombant librement par l'effet de sa pesanteur depuis le point A jusqu'au point B, & continuant de se mouvoir le long de cette même courbe, parcourra en descendant en tems égaux des espaces égaux.*

Que BD soit l'axe, & que AB soit $=a$, l'abscisse BP $=x$, & l'ordonnée PM $=y$; maintenant la différence de l'ordonnée $dx=0$ dans le point B origine de la courbe, qui étant convexe proche l'axe, il devient tangente au point B ; par conséquent Mm ($\sqrt{dx^2+dy^2}$) $=dx$ dans le point B ; c'est pourquoi le tems que le corps emploie à décrire l'arc Bb , est comme $\frac{dx}{\sqrt{a}}$, puisque les tems sont en raisons directes des espaces & en raison inverses des vitesses, & les vitesses acquises en B & en M , étant celles qui s'acquièrent par la chute du point A , aux points B & en M , (qui sont en raisons soudoublées de AB à AP), le tems employé à parcourir le petit arc Mm , est comme $\sqrt{\frac{dx^2+dy^2}{a-x}}$. Mais par la

Fig. 74.



condition du problème, durant la description de la courbe, le corps parcourt en tombant des espaces égaux en tems égaux; ainsi $\frac{dx}{\sqrt{a}}$ doit être $= \sqrt{\frac{dx^2 + dy^2}{a - x}}$, & quarrant chaque membre $\frac{dx^2 + dy^2}{a - x} = \frac{dx^2}{a}$; donc $adx^2 + ady^2 = adx^2 + xdx^2$, c'est-à-dire, $ady^2 = xdx^2$, & tirant la racine quarrée de chaque membre, on aura $\sqrt{a} \times dy = \sqrt{x} \times dx$; enfin prenant les integrales de ces deux membres, on aura $ay^2 = \frac{2}{3}x^3$ ou $\frac{3}{2}ay^2 = x^3$, qui est l'équation de la courbe, & par conséquent une demie-parabole cubique.

Autrement.

Que AP soit $= x$, $PM = y$, la vitesse acquise par la chute depuis le point A jusqu'au point $M = v$, & $z = a$ tems de cette chute jusqu'en M ; maintenant par les principes de mécaniques $\frac{Mm}{v}$, est comme dz , tems qu'il faut pour décrire le petit arc Mm , c'est-à-dire, que $\sqrt{\frac{dx^2 + dy^2}{v}}$, est comme dz . D'où il suit que si a , est une quantité constante, on aura $a\sqrt{dx^2 + dy^2} = vdz$. Mais v est comme $\sqrt{x}$, ou comme $\sqrt{ax}$; ainsi on peut prendre $v = \sqrt{ax}$. De même z est comme $x - a$, puisque par la condition du problème, le tems est comme les hauteurs d'où descend le corps: ainsi on peut mettre $x - a = z$, & par la même raison dx pour dz , & en substituant dx pour dz , & $\sqrt{ax}$ pour v , dans l'équation $a\sqrt{dx^2 + dy^2} = vdz$, on aura cette autre équation $a\sqrt{dx^2 + dy^2} = dx\sqrt{ax}$, d'où il suit que $a^2dx^2 + a^2dy^2 = axdx^2$ & $a^2dy^2 = dx\sqrt{x - a}$; ensuite cherchant l'intégrale de chaque membre, qu'on peut aisément trouver par les petites Tables des courbes quarrables, pag. 29, ou par la troisième forme des Tables de M. Costes, on aura $a^2y = \frac{2ax - 2a^2}{3}\sqrt{ax - a^2}$, ou $ay = \frac{2x - 2a}{3}\sqrt{ax - aa}$, faisant maintenant $n = x - a$, on a $\frac{2n}{3}\sqrt{an}$, ou $a^2y^2 = \frac{4n^3}{9}$, ou $\frac{3}{2}ay^2 = n^3$. C'est pourquoi la courbe cherchée est la seconde parabole cubique AB étant $= a$, & $BP = n$.

PROBL. VIII.

PROBLEME VIII.

117. Trouver la loi de réfraction, admettant ce principe, que la nature suit dans ses opérations les voyes les plus simples & les plus courtes.

Comme la lumière ne peut se mouvoir en différens lieux avec la même vitesse, soit le raport de la vitesse de la lumière durant son mouvement de A vers B , où il commence à être rompu, à la vitesse de B vers C durant sa réfraction; soit, dis-je, ce raport exprimé par $\frac{m}{n}$; alors les tems employés à décrire les lignes AB , BC , seront comme $n \times AB$, est à $n \times BC$, abaissez les perpendiculaires AQ , CP , & faites $AQ=a$, $CP=b$, $PQ=c$, $PB=x$, & vous aurez $BQ=c-x$, & par conséquent $BC=\sqrt{bb+xx}$, & $AB=\sqrt{aa+cc-2cx+xx}$; d'où il suit que le tems dans lequel $AB+BC$, est parcouru, sera $m\sqrt{bb+xx}+n\sqrt{aa+cc-2cx+xx}$, qui doit être un *minimum*. Ainsi sa différentielle sera $\frac{mxdx}{\sqrt{bb+xx}} + \frac{nxdx}{\sqrt{aa+cc-2cx+xx}} = 0$; donc $\frac{mx}{\sqrt{bb+xx}} = \frac{n \times c - x}{\sqrt{aa+cc-2cx+xx}}$, c'est-à-dire, $\frac{m \times PB}{BC} = \frac{n \times BQ}{AB}$. Faites $BC=AB$, alors vous aurez $m \times PB=n \times BQ$, & par conséquent $m : n :: BQ : PB$.

D'où il suit que si AB ou BC est pris pour le rayon, BQ fera le sinus de l'angle A , & PB , le sinus de l'angle C ; c'est-à-dire, parce que AQ & PC , sont parallèles à DE ; PB est le sinus de l'angle CBE & BQ le sinus de l'angle ABD ; par exemple, PB est le sinus de l'angle de réfraction, & BQ le sinus de l'angle d'incidence. Il suit de-là que le sinus de l'angle d'incidence, est au sinus de l'angle de réfraction dans un raport constant; par exemple, dans celui de la vitesse, de la lumière avant la réfraction, à la vitesse durant cette réfraction.



ANALISE

PROBLEME IX.

118. *Trouver l'angle BCD, dans lequel un corps placé en A, frappant obliquement un plan en C, doit se réfléchir à un point donné B; de manière que depuis le point donné A, jusqu'au point donné B, il parcourt le chemin le plus court.*

Fig. 73.

Des points A, B , abaissez les perpendiculaires AE, BD . Que $AE=a, BD=b, ED=c$, & $EC=x$; alors $CD=c-x$ & $AC=\sqrt{aa+xx}$, ainsi $CB=\sqrt{bb+cc-2cx+xx}$; c'est pourquoi $AC+CB$, doit être un *minimum*; c'est-à-dire, $\sqrt{aa+xx} + \sqrt{bb+cc-2cx+xx}$. D'où il suit que sa différentielle $= 0$; donc $\frac{dx}{\sqrt{aa+xx}} + \frac{x dx - cd x}{\sqrt{bb+cc-2cx+xx}} = 0$; & ainsi $x\sqrt{bb+cc-2cx+xx} + x - c \times \sqrt{a'+x^2} = 0$; donc $x\sqrt{bb+cc-2cx+xx} = c - x \times \sqrt{a'+x^2}$, c'est-à-dire, $EC \times CB = CD \times AC$, ainsi $EC : AC :: CD : CB$, par conséquent, *par la proposition septième*, liv. 6. d'*Euclide*, les triangles AEC, BDC , sont équiangles; donc l'angle $ACE =$ l'angle BCD .

PROBLEME X.

119. *Si un fluide est composé de parties également mobiles disposées librement & à égales distances les unes des autres, on demande la partie du cone, qui de toutes les autres de même baze Aa , & de même hauteur BC , trouvera la moindre résistance en se mouvant dans ce fluide selon la direction de l'axe, s'avancant par sa petite baze Dd .*

Fig. 74.

C'est la même chose de considérer la partie du cone, comme en repos, & les particules du fluide, comme se mouvant contre cette partie du cone avec la même vitesse.

Tirez DE , parallèle à BC , que la hauteur donnée $BC = b$, le rayon de la baze donné $= a$, & $AE = x$. Or il est démontré que l'effet d'une particule quelconque du fluide frappant obliquement la surface AD , de la partie du cone dans la direction DE , pour le mouvoir suivant cette même

DES INFINIMENT PETITS. 147

direction, est à l'effet de la même particule frappant directement contre l'anneau formé par la ligne AE (pendant la révolution de AB ,) pour le mouvoir dans la direction DE ; comme le carré du sinus de l'angle d'incidence FEV , ou ADE , est au carré du rayon; & parce que dans ce cas l'angle d'incidence est invariable, l'effet de toutes les particules frappant la superficie de la partie du cône formée par AD , sera à l'effet de toutes les particules qui peuvent frapper ce dit anneau dans cette proportion: c'est-à-dire, la résistance de la superficie de la partie du cône formée par AD , est à la résistance de l'anneau formé par AE , comme le carré du sinus de l'angle d'incidence est au carré du rayon.

D'où il suit que si $BC(b)$ est supposé le rayon, le sinus de l'angle d'incidence sera $\frac{bx}{\sqrt{b^2+x^2}}$; car AD , ($\sqrt{b^2+x^2}$): AE

$(x)::BC(b):\frac{bx}{\sqrt{b^2+x^2}}$. Si présentement on suppose que ledit anneau est comme sa résistance, alors le cercle décrit par BE , sera aussi comme la résistance; mais parce que les cercles sont entr'eux comme les carrés de leurs rayons; donc la résistance de l'anneau est à la résistance du cercle, comme $\overline{AB}^2$ à $\overline{BE}^2$ ($2ax-x^2$) est au carré $\overline{BE}$ ($a^2-2ax+x^2$) lesquelles quantités représenteront les résistances respectives de l'anneau & du cercle.

Alors $\overline{BC}^2(b^2):\frac{b^2x^2}{b^2+x^2}$ carré du sinus, :: $\overline{AB}^2$ à $\overline{BE}^2$ ($2ax-x^2$): $\frac{2ax^2-x^4}{b^2+x^2}$ = à la résistance de la superficie de la partie du cône formée par AD , auquel ajoutant la résistance de la petite baze Dd ($a^2-2ax+xx$) la résistance de toute la partie du cône sera $\frac{2ax^2-x^4}{b^2+x^2}+a^2-2ax+xx=\frac{a^2b^2-1ab^2x+b^2x^2+a^2x^2}{b^2+x^2}$, dont la différence doit être un *minimum*; c'est pourquoi $\frac{2ab^2x^2x+1ab^2x^2dx-1ab^4dx}{b^2+x^2}^2=0$;

donc $x^2+\frac{b^2}{a}x=b^2$, ainsi $x=\frac{b}{2a}\sqrt{b^2+x^2}-\frac{b^2}{2a}$; mais à cause des triangles semblables AED , ABV , on aura $AE(x)=\frac{b}{2a}\sqrt{b^2+x^2}-\frac{b^2}{2a}$: $BC(b)::AB(a):BV=$

T ij

$\frac{1}{2}\sqrt{4a^2+b^2}-\frac{1}{2}b = \frac{1}{2}\sqrt{4a^2+b^2} - \frac{1}{2}b^2$, puisque $\frac{1}{2}\sqrt{4a^2+b^2} - \frac{1}{2}b \times \frac{1}{2}\sqrt{4a^2+b^2} + \frac{1}{2}b = a^2$, comme il paroît évidemment par la simple inspection : la somme de deux quantités quelconques multipliées par leur différence étant égale à la différence de leurs quarrés.

On tire de-là la construction suivante. Coupez BC (b) en G , & tirez AG dans la ligne BC prolongée ; faites $GV = AG$ ($\frac{1}{2}\sqrt{4a^2+b^2}$) & V , sera le sommet du cone.

PROBLEME XI.

120. *Trouver la durée d'un pendule, faisant ses vibrations dans une cycloïde.*

Fig. 75.

Que le diamètre du cercle generateur, ou la hauteur de toute la cycloïde soit $= a$; que HB , hauteur du point Q , d'où le pendule commence à descendre & à décrire l'arc QR , soit $= b$. De même que $HP = z$; ainsi $PB = 2b - z$; maintenant que le tems que le pendule employe à décrire QB , soit $= x$, & sur HB , décrivez le demi-cercle HNB , tirez PM , pm , infiniment proche l'un de l'autre & perpendiculaires à HR ; alors $PN = \sqrt{2bz - zz}$, $Pp = Nq = Rm = dz$, & la vitesse dans les points P , N , $Q = \sqrt{z}$.

Par conséquent puisque la partie Mm , de la courbe est décrite par un mouvement uniforme, le tems de sa description qui est $dx = \frac{Mm}{\sqrt{z}}$. Mais par la propriété de la cycloïde $Mm : mR :: BS : BP$, & $AB : BS :: BS : BP$, par la nature du cercle ; d'où il suit que $BS : BP :: \sqrt{AB} : \sqrt{BP}$, & de même $Mm : mR :: \sqrt{AB} : \sqrt{BP}$; donc $Mm = \frac{mR \times \sqrt{AB}}{\sqrt{BP}}$, & $dx = \frac{dz \sqrt{a}}{\sqrt{2bz - zz}} = \frac{2bdz \sqrt{a}}{2b\sqrt{2bz - zz}}$. Mais $\frac{bdz}{2b\sqrt{2bz - zz}} = Nn$; par conséquent $dx = \frac{2\sqrt{a} \times Nn}{2b}$. Maintenant quand l'intégrale de dx , sçavoir x , exprime le tems de la descente RD , de tout l'arc de la cycloïde, l'intégrale de Nn sera $=$ à la cir-

DES INFINIMENT PETITS. 149

conference de HN^B ; donc comme $2b$, diamètre du cercle est à la $\frac{1}{2}$ circonference; ainsi $2\sqrt{a}$, est au tems que le pendule employe à décrire l'arc BQ . Par conséquent puisque $2\sqrt{a} = \frac{2a}{\sqrt{a}}$, représente le tems de la descente perpendiculaire par AB , on aura le théoreme suivant; sçavoir, le tems d'une oscillation entiere par un arc quelconque de la cycloïde, est au tems de la descente perpendiculaire par le diamètre AB du cercle générateur, comme la circonference du cercle, est au diamètre.

COROLLAIRE.

Il suit de-là que les tems employés à décrire tous les arcs d'une cycloïde sont égaux.

PROBLEME XII.

121. *La ligne loxodromique & la difference de latitude de deux endroits étant données, trouver la difference de longitude.*

Que P , soit le pôle; A^rF , le cercle de l'équateur; PCB , PDA des méridiens; ACG , le rhumb passant par les deux lieux donnés A & C , tirez Pdc , infiniment proche de PCB , & de la distance PC décrivez l'arc CD : faites maintenant le rayon $PA=a$, la difference de latitude de deux lieux, sçavoir AD , ou $BC=y$; la difference de longitude qu'on cherche $AB=x$; la tangente de la ligne loxodromique donnée (ou l'angle constant que fait le rhumb avec un méridien quelconque), sçavoir, de l'angle $Ced=m$. De même faites le sinus de latitude du lieu $C=r$, & le sinus du complement $=z$. Toutes ces grandeurs sont variables, excepté $AP(a)$ & la tangente de la ligne loxodromique donné $=m$.

Maintenant puisque les arcs Bb , Cd sont semblables, on aura $PB(a)$: au sinus du complement de latitude de $C(z)$: $Bb(dx)$: $Cd = \frac{zdx}{a}$. De plus par la nature du cercle PB moins le carré du sinus de latitude de C , sçavoir $a^2 - r^2 = z^2$, & de $(dy) = \sqrt{dr^2 + dz^2}$, comme il est évident. Ainsi en

Fig. 76.

prenant la différentielle de l'équation $a^2 - r^2 = z^2$, on aura $dz^2 = \frac{r' dr'}{a^2 - r^2}$; ainsi mettant $\frac{r' dr'}{a^2 - r^2}$ pour dz^2 , dans l'équation $dy = \sqrt{a^2 - r^2 + dz^2}$, elle se changera en celle-ci, $dy = \frac{adr}{z}$, & si cd (dy) est supposé rayon, alors Cd est la tangente de l'angle Ccd de la ligne loxodromique $= m$. Donc $PB(a) : m : cd(dy) : cd = \frac{z ds}{a}$, & multipliant les extremes & les moyens on aura $mdy = z dx$; ainsi $dx = \frac{m dy}{z}$; d'où il suit que substituant $\frac{adr}{z}$ pour dy , il viendra $dx = \frac{madr}{z^2} = \frac{madr}{a^2 - r^2}$; & prenant les integrales on aura $BA(x) = m \times \frac{r}{a} + \frac{r^2}{2a^2} + \frac{r^3}{3a^3} + \frac{r^4}{4a^4} + \dots$ = à la différence des longitudes des lieux A & C .

L'intégrale de $\frac{amdr}{a^2 - r^2}$ peut être exprimée selon la méthode de M. *Cotes* dans la mesure d'un rapport. Car cette différentielle peut se rapporter à la seconde forme de ses Tables; car faisant $\theta = 0$, $e = 2$, $D = am$, $e = a^2$, $f = -1$, $R(\sqrt{\frac{e - f}{f}}) = a$, $T(x^{\frac{1}{2}}) = r$, & $S(\sqrt{\frac{e - f}{f}}) = \sqrt{aa - rr}$, la différentielle de cette forme $\frac{Dz^{\theta + \frac{1}{2} - 1}}{e - f z^2} dz$, se changera en $\frac{amdr}{a^2 - r^2}$, & l'intégrale $\frac{2}{e} DR \left| \frac{R - T}{S} \right.$ sera $m \left| \frac{a - r}{\sqrt{a^2 - r^2}} \right. = m \left| \frac{a - r}{z} \right.$, qui est l'expression différentielle de la longitude BA .

C'est-à-dire, que la différence de longitude est égale à la mesure du rapport du rayon ajouté au sinus de latitude du lieu C , & au sinus du complement du même lieu, la tangente de la ligne loxodromique en étant le module; & si E est un autre lieu dans le rhumb dont le sinus de latitude soit donné; alors on peut trouver par la même règle la différence de longitude AH , & par conséquent aussi la différence de longitude BH des lieux C & E .

COROLLAIRE.

Si le rhumb $AC = u$, & $cd (dy)$ égale le rayon, alors Cc sera la sécante de la ligne loxodromique; d'où on tire $PS(a) : Cc :: cd(dy) : Cc(du)$; donc $adu = Cc \times dy$, & prenant les intégrales $au = Cc \times y$; donc $u = \frac{Cc \times y}{a}$; c'est-à-dire, la différence de latitude AD est à la longueur $AC (y)$ comme le rayon est à la sécante de la ligne loxodromique.

PROBLEME XIII.

122. *Cuber le solide formé par la révolution des espaces conchoïdales $CPGB$, & $BGQc$, autour de la ligne ABC , tirée du pôle A perpendiculaire à l'asymptote BG .*

Faites Ap infiniment près de AP , du point A décrivez des petits arcs Qs, Gr, Pn , à la distance bC , ou Bc ; du point A , décrivez l'arc EF , & des points F, Q, P , tirez FH, QK, PI , perpendiculaires à AE . Nommez $cB (= AE = AF = AC = QG = GB) = a, AB, b, EH, x, AH, z,$ & HF, y ; maintenant à cause de la similitude des triangles $AFG, AHF, AH(z) : AF(a) :: AB(b) : AG = \frac{ab}{z}$; d'où on tire $AQ = \frac{ab}{z} - a$. & par la même raison $AP = \frac{ab}{z} + a$.

Fig. 77.

De plus, $AF(a) : FH(y) :: AQ(\frac{ab}{z} - a) : QK = \frac{by}{z} - y$; ainsi $PI = \frac{by}{z} + y$; alors la différence de l'arc EF , savoir Ff , sera $\frac{adz}{y}$; ainsi les secteurs AFf, AQs , sont semblables; donc $AF(a) : Ff(\frac{adz}{y}) :: AQ(\frac{ab}{z} - a) : Qs = \frac{abdz}{zy} - adz$ de la même manière $Pn = \frac{abdz}{zy} + adz$.

De plus la différence du solide formé par la révolution ci-dessus mentionnée de l'espace AcQ sera $= \frac{1}{2} AQ \times Qs$, multiplié par la circonférence décrite par le point Q , de même la différence du solide formé par l'espace $ACT = \frac{1}{2} AP \times Pn$, multiplié par la circonférence décrite par le point P , & la différence du cone formé par le triangle rectangle ABG , pendant la révolution ci-dessus mentionnée, sera $\frac{1}{2} AG \times Gr$.

multiplié par la circonférence décrite par le point G ; par conséquent la différentielle du solide produite par AcQ sera

$$\frac{ab}{3z} - \frac{a}{3} \times \frac{p}{r} \times \frac{by}{z} - y \times \frac{abdz}{xz} - adz \left(\frac{p}{r}, \text{étant le rayon du rayon à la circonférence} \right) = \frac{p}{r} \times \frac{a'b'dz}{3z^2} - \frac{a'b'dz}{z^2} + \frac{a'b'dz}{z} - \frac{a'dz}{3}$$

& la différentielle du solide produit par ACP , sera $\frac{ab}{3z} - \frac{a}{3} \times \frac{p}{r} \times \frac{by}{z} - y \times \frac{abdz}{xz} - \frac{p}{r} \times \frac{a'b'dz}{3z^2} + \frac{a'b'dz}{z^2} + \frac{a'b'dz}{z} + \frac{a'dz}{3}$, & l'élément de ces deux différentielles sera $= \frac{p}{r} \times \frac{2a'b'dz}{z^2} - \frac{2}{3} a^2 dz =$ à la différence de la somme des deux solides produits par les espaces $cQGB$, $BGPC$; & ainfi $\frac{p}{r} \times \frac{a'b'dz}{z^2} + \frac{1}{3} a^2 dz$ est la différentielle, de

$$\text{la } \frac{1}{3} \text{ de la somme, dont l'intégrale sera } \frac{p}{r} \times \frac{a'b^2}{z} - \frac{1}{3} a^2 z =$$

$$(\text{substituant } a-x \text{ pour } z) \frac{p}{r} \times \frac{a'b^2}{a-x} - \frac{a^3 - a^2 x}{3} = \frac{p}{r} \times$$

$$\frac{a^2 b^2 - \frac{a^2}{3} + \frac{2a^2 x}{3} - \frac{a^2 x^2}{3}}{a-x}, \text{ \& faisant } x=0, \text{ l'intégrale sera}$$

$$\frac{p}{r} \times \frac{ab^2 - a^3}{a}, \text{ qu'il faut soustraire; en sorte que la véritable}$$

$$\text{intégrale est } \frac{p}{r} \times \frac{a^2 b^2 - \frac{a^2}{3} + \frac{2a^2 x}{3} - \frac{a^2 x^2}{3}}{a-x} - ab^2 + a^3 =$$

$$\frac{p}{r} \times \frac{ab^2 x + \frac{a^2 x}{3} - \frac{a^2 x^2}{3}}{a-x}.$$

On trouvera à peu près de la même manière la différentielle de la moitié de la différence des solides, comme nous avons trouvé la différentielle de la moitié de leur somme. Car on aura par les triangles semblables AHF , ABG ; ces proportions $AH(z) : AF(a) :: AB(b) : AG = \frac{ab}{z}$, & $AH(z) : HF(y) :: AB(b) : BG = \frac{by}{z}$, & puisque les sécateurs AFf , APr ,

DES INFINIMENT PETITS. 153

APr, sont aussi semblables, on aura $AF(a) : Ff(\frac{adx}{r}) ::$

$AG(\frac{ab}{z}) : Gr = \frac{abdx}{z^2}$, & par conséquent la différentielle

du cone décrit par le triangle rectangle *ABG* sera $= \frac{p}{r} \times$

$\frac{ab}{z} \times \frac{b}{z} \times \frac{abdx}{z^2} = \frac{p}{r} \times \frac{a'b'dx}{z^3}$, de laquelle ôtant la diffé-

rentielle ci-dessus trouvée, du solide décrit par l'espace

AcQ, le restant $\frac{p}{r} \times \frac{a'b'dx}{z^3} - \frac{a'b'dx}{z} + \frac{a'dx}{z}$, est la diffé-

rentielle du solide formé par l'espace *CQGB*, & si on ôte

$\frac{p}{r} \times \frac{a'b'dx}{z^3}$, de la différentielle du solide formé par l'espace

ACP, le restant $\frac{p}{r} \times \frac{a'b'dx}{z^3} + \frac{a'b'dx}{z} + \frac{a'dx}{z}$, est la différen-

tielle de l'autre solide *BGPC*, de laquelle ôtant la différen-

tielle du solide *CQGB*, le restant $\frac{p}{r} \times \frac{2a'b'dx}{z}$, est la diffé-

rence des deux solides ci-dessus mentionnés, de sorte

que $\frac{p}{r} \times \frac{a'b'dx}{z}$, est la différentielle de la moitié de la différence

des solides, qui peut être comparée à la première forme des

Tables de *M. Cotes*, en substituant premièrement $a-x$,

au lieu de z , & $-dx$ pour dz ; ce qui changera la différen-

tielle en $\frac{p}{r} \times \frac{2a'b'dx}{a-x}$, & faisant $z=x$, $\theta=1$, $u=1$, $D=a'b$,

$e=a$, $f=-1$, la différentielle $\frac{Dz}{e-fz}$ $dz = \frac{p}{r} \times \frac{a'b'dx}{a-x}$, &

l'intégrale $\frac{D}{nf} \left| \frac{e-fz^n}{e} \right|$ deviendra $= \frac{p}{r} aab \left| \frac{a-x}{a} \right| = \frac{p}{r}$

$aab \left| \frac{a}{a-x} \right|$; puisque le logarithme du rapport de a , à $a-x$,

avec le signe plus est égal au logarithme du rapport de $a-x$,

à a avec le signe moins.

Les intégrales ou quantités de la moitié de la somme &

de la moitié de la différence des solides étant trouvées, nous

passerons maintenant à leur construction, en commençant

par celle de la moitié de la somme. Il est aisé, suivant ce

qu'on vient de dire, de trouver la différentielle d'un secteur

de sphere décrit par le secteur circulaire *AEF*, & par consé-

quent de trouver aussi l'intégrale ou quantité de ce secteur;

V

la différentielle étant $= \frac{p}{r} \times \frac{a}{3} \times r \times \frac{adx}{r} = \frac{p}{r} \times \frac{a^2 dx}{3}$, &c
 en substituant $a-x$, au lieu de z , l'intégrale sera $= \frac{p}{r} \times \frac{a^2 x}{3} = \frac{p}{r} \times \frac{a^2 - a'^2}{3}$, &c supposant $x=0$, cette même intégrale deviendra $\frac{p}{r} \times \frac{a^2}{3}$ qu'il faudra soustraire de l'autre; d'où il suit que la véritable intégrale sera $\frac{p}{r} \times \frac{a^2 - a'^2}{3}$ ou $\frac{p}{r} \times \frac{a^2 x}{3} =$ à la solidité du secteur de la sphère décrite, comme on a dit ci-dessus; tout ceci étant supposé: Faites $AE^3 (aa): 3AB \times AG + AE^3 (3b \times \frac{ab}{a-x} + aa) ::$ le secteur de la sphère $(\frac{p}{r} \times \frac{a^2 x}{3})$ est à la solidité de la moitié de la somme des solides $= \frac{p}{r} \times ab^2 x + \frac{a^2 x}{3} - \frac{a'^2 x}{3}$, qui est la même expression qu'on a trouvée ci-devant.

Enfin pour construire l'expression $\frac{p}{r} aab \mid \frac{a}{a-x}$, nous savons que $\frac{p}{2r} aa$, est l'aire d'un cercle qui a pour rayon $BC (a)$ qui multiplié par $b \mid \frac{a}{a-x}$ est la solidité de la moitié de la différence. Mais à cause des triangles semblables AHF , AGB , le rapport de $a=AF$ à $a-x=AH$, est égal au rapport de AG à AB ; par conséquent la valeur de la moitié de la différence des solides qu'on doit cuber, est égale à un cylindre qui a $AC (2a)$ pour diamètre de sa baze, &c qui a pour la hauteur la mesure du rapport doublé de AG à AB , le module étant $AB (b)$. Car $\frac{p}{2r} aab \mid \frac{a}{a-x} = \frac{p}{r} aab \mid \frac{a}{a-x}$; puisque le logarithme d'une raison double est la même que celui d'une raison doublée.



PROBLEME XIV.

123. Trouver la nature d'une courbe AMC , telle que si on conçoit un vase formé par sa révolution autour de l'axe AB perpendiculaire à l'horizon, & que ce vase soit rempli d'eau qu'on supposera couler par un petit trou rond percé dans le fond de ce même vase; la trouver, dis-je, telle que la surface de l'eau en descendant laisse des espaces égaux en tems égaux; supposant que la vitesse de l'eau qui sort par le trou, soit comme la racine quarrée de la hauteur de l'eau au-dessus du trou.

Soit $AB=a$, & $AP=x$, hauteur d'eau indéterminée, Fig. 78.
 & soit $PM=y$, soit encore la surface du trou $=b$,
 la vitesse $=v$, & le tems de l'affaïssement de la surface $=t$,
 qui par la condition du probleme est comme $a-x$; or $\frac{dx}{dt}$,
 est comme v ; c'est-à-dire, comme $\sqrt{x}$, ou comme $\sqrt{ax}$,
 par la condition aussi du probleme; donc $\frac{dx}{dt} : \sqrt{ax}$, comme
 la surface du trou b , est à la surface de l'eau y^2 . Or,
 puisque t peut être pris pour $a-x$; par conséquent $dt=dx$;
 ainsi $1 : \sqrt{ax} :: b^2 : y^2$. D'où on tire $b^2 \sqrt{ax}=y^2$ & $ab^2x=y^4$,
 & par conséquent la courbe ACM est une parabole quarrée

PROBLEME XV.

124. Si AC est une ligne horizontale, sur le point C de laquelle ligne est élevé un parallélepiped CD , dont une des surfaces soit perpendiculaire à la ligne AC ; il s'agit de trouver l'angle CAB sur le point A , duquel angle supposant posée l'extrémité A , d'un long solide AB ; de manière qu'avec son autre extrémité B , il vienne presser le parallélepiped CD , ce solide comprimera perpendiculairement CD avec plus de force au point A , qu'en tout autre point.

Soit F le centre de gravité du corps AB ; du point F , tirez la ligne FE perpendiculaire à AC , & du point E , tirez EI perpendiculaire à AB ; tirez aussi du point B , la ligne BH ,
 V 1j

Fig. 79.

perpendiculaire à $AB=AE$, & du point H tirez HG perpendiculaire à BD , soit $AB=a$, soit $AF=b$, & $CB=x$.

Maintenant la pression que fera le solide AB , dans le point B , & dans la direction HB , contre CD , sera comme AE ; ainsi on peut le représenter par AE ; donc puisque $BH=AE$, la pression directe contre CD dans le point B , sera $=HG$. Cela est démontré dans les principes de la mécanique. D'où il suit que $CB \times HG$, est l'effet de la pression perpendiculaire du solide AB contre CD dans le point B qui doit être un *maximum*. De plus $AB(a) : AC(\sqrt{a^2-x^2}) :: AF(b) : AE = \frac{b}{a} \sqrt{a^2-x^2}$, & puisque les triangles AEI , ACB sont semblables, ou aura $AB(a) : BC(x) :: AE(\frac{b}{a} \sqrt{a^2-x^2}) : EI = HG = \frac{bx}{a} \sqrt{a^2-x^2}$; d'où il suit que

$$CB \times HG = \frac{bx^2}{a} \sqrt{a^2-x^2}, \text{ dont la différentielle } \frac{4a^2b^2x'dx - 6b^2x^3dx}{2a^4 \times \frac{bx^2}{a} \sqrt{a^2-x^2}}, \text{ doit être } = 0; \text{ donc } 2a^2 = 3x^2,$$

ainsi $x = \sqrt{\frac{2a^2}{3}}$, par conséquent comme $AB : \sqrt{\frac{2}{3}} AB$, de même le rayon est au sinus de l'angle $CAB = 54^\circ. 44'$.

PROBLEME XVI.

125. *Trouver la nature d'une courbe ACDB, au long de laquelle si un corps tombe librement par son propre poids du point donné A, au point donné B, le tems de sa descente soit moindre que celui qu'emploieroit dans sa descente du point A au point B, un corps qui passeroit le long de toute autre courbe.*

Fig. 80.

Soit C & D deux points donnés dans la courbe, infiniment proche l'un de l'autre : soit le point intermédiaire E de la courbe, tel que tirant DI & EH perpendiculaires, & AK , CL , EM , parallèles à l'horizon ; la petite ligne EL , soit $= DM$.

Maintenant puisqu'on suppose que la ligne $ACEDB$, est la courbe le long de laquelle le corps tombe du point A au

DES INFINIMENT PETITS. 157

point B , dans le moindre tems qu'il est possible; il est clair qu'il tombera du point C au point D , par la partie quelconque de cette même courbe dans le moindre tems possible. Car si cela n'étoit pas, supposons qu'il tombe plus vite le long de CGD , qu'au long de CED , alors la courbe $ACGDB$, seroit décrite en moindre tems que la courbe $ACEDB$, ce qui est absurde.

Puisque les points C & D , sont donnés de position, les lignes HE , ID , $EL=DM$, sont par conséquent invariables & données, & CL , CE , EM , ED , sont variables: soit $EL=DM=m$, $HE=b$, $ID=p$, soit $CL=u$, $EM=z$; alors le tems qui sera employé à la description de la ligne CE (étant en raison directe de CE , & en raison inverse de la vitesse) est comme $\frac{CE}{\sqrt{HE}} (\sqrt{\frac{m^2+u^2}{b}})$ regardant comme égales les vitesses avec lesquelles sont décrites chacune de ces lignes infiniment petites; de même le tems que le corps employé à décrire la petite ligne ED , est comme $\frac{ED}{\sqrt{ID}} (\sqrt{\frac{m^2+z^2}{p}})$ par conséquent la somme de ces tems doit être

un *minimum*; savoir $\sqrt{\frac{m^2+u^2}{b}} + \sqrt{\frac{m^2+z^2}{p}}$; en sorte que la différentielle $\frac{odu}{b^{\frac{1}{2}} \sqrt{m^2+u^2}} + \frac{zdz}{p^{\frac{1}{2}} \sqrt{m^2+z^2}}$, doit être $=0$. Or $CN=v+z$ est invariable, & $dv+dz=0$, & $dv=-dz$; donc $\frac{v}{b^{\frac{1}{2}} \sqrt{m^2+u^2}} = \frac{z}{p^{\frac{1}{2}} \sqrt{m^2+z^2}}$.

Maintenant si $AH=x$, $HE=y$, alors $EM=dx$, & $MD=dy$, de même $ED=\sqrt{dx^2+dy^2}$; par conséquent la différence de la courbe est toujours comme $\frac{dx}{y^{\frac{1}{2}}}$; c'est-à-dire, en raison directe de la différence de l'abscisse $AH(x)$, & en raison réciproque & soudoublée de l'ordonnée $HE(y)$.

On trouvera que la courbe qui a cette propriété est la cycloïde passant par les points donnés A & B , ayant son sommet renversé, comme on le démontrera facilement; qu'on suppose A & B , posés de façon que ACD soit une demi-cycloïde, &c.

Décrivez le demi-cercle generateur KPB ; prolongez la

ligne EM , jusqu'à P & Q ; tirez la tangente CET au point E de la courbe, & du point B , tirez la corde PB ; soit $BK = a$, alors $KQ = y$, & $BQ = a - y$, c'est une propriété connue de la cycloïde d'avoir sa tangente ET , parallèle à la corde PB de l'arc correspondant du cercle generateur; ainsi les triangles BPQ , ECL , sont semblables, & PQ

$$(\sqrt{ay - y^2}) : BP (\sqrt{a^2 - y^2}) :: CL (dx) : CE = \frac{dx \sqrt{a^2 - y^2}}{\sqrt{ay - y^2}}$$

$$= \frac{dx \times y \times \sqrt{a^2 - y^2}}{\sqrt{y} \times \sqrt{ay - y^2}} = \frac{dx \times \sqrt{a}}{\sqrt{y}}, \text{ laquelle expression est comme}$$

$\frac{dx}{y^{\frac{1}{2}}}$; $\sqrt{a}$ étant constante ou donnée; donc la cycloïde AC & DB est la courbe par laquelle un corps descend le plus vite.

PROBLEME XVII.

- Fig. 32. 126. *Trouver la nature de la courbe DM , qui soit telle que le solide décrit par sa révolution autour de son axe AP , mouvant dans un fluide (tel que nous avons dit, art. 119.) dans la direction de son axe, trouvera moins de résistance, que toute autre superficie décrite par toute autre courbe qui se termine dans les points donnés D & M , & qui se meut de la même manière autour du même axe AP .*

Fig. 31. **S**upposez les lignes droites MN , NO , des parties infiniment petites de la courbe cherchée; or les surfaces décrites par ces lignes trouveront moins de résistance que deux autres superficies queleonques décrites par deux parties queleonques tirées des points O & M , à tout autre point qu'au point N . Cela est clair: car supposant que cela ne fût point, il s'ensuivroit que le point N seroit hors de la courbe cherchée.

Cela posé, des points M , N , O , tirez MP , NQ , OH , perpendiculaires à l'axe, & du point M , tirez MF , parallèle au même axe; tirez aussi par le point N un autre parallèle indéfini GNT qui coupe la ligne OH dans le point G , maintenant la résistance de la petite superficie par la ligne MN , est à la résistance du petit anneau décrit par FN , comme le carré du sinus de l'angle d'incidence est au carré du rayon; c'est-à-dire, (à cause que l'angle FMN est égal

DES INFINIMENT PETITS. 159

à l'angle d'incidence TNM) faisant MN le rayon comme $\overline{FN}$ à $\overline{MN}$, & si la résistance de l'*anneau* décrit par $\overline{FN}$, est représenté par lui-même ou plutôt par $\overline{QF} + 2 \overline{QF} \times \overline{FN} \rightarrow \overline{FN}$ moins $\overline{QF}$ (qui est la différence de $\overline{QN}$, & $\overline{QF}$) $= 2 \overline{QF} \times \overline{FN} \rightarrow \overline{FN}$, cette différence étant toujours comme celle de l'*anneau*. Mais à cause que $\overline{FN}$ est infiniment moindre que $\overline{QF}$; $\overline{FN}$, est infiniment moindre que $2 \overline{QF} \times \overline{FN}$; & ainsi on peut le rejeter; & la résistance de l'*anneau* sera $2 \overline{QF} \times \overline{FN}$, ou $\overline{QF} \times \overline{FN}$, ou $\overline{PM} \times \overline{FN}$; d'où en faisant $\overline{MN} : \overline{NF} :: \overline{PM} \times \overline{FN} : \frac{\overline{NF} \times \overline{PM}}{\overline{MN}}$, ce qui exprimera la résistance de la superficie

décrite par $\overline{MN}$; de même $\frac{\overline{GO} \times \overline{QN}}{\overline{ON}}$ sera celle de la superficie décrite par $\overline{ON}$.

De plus soit donnée de position les points O, M , & la ligne droite GT ; alors il faut chercher la position de $\overline{MN}, \overline{NO}$, qui soit telle, que la résistance de la superficie décrite par ces lignes, soit moindre que la résistance des autres superficies décrites par d'autres lignes quelconques On, nM . Pour la trouver soit $\overline{FN} = a, \overline{GN} = b, \overline{GO} = c, \overline{NQ} = t$; ces lignes sont toutes données & invariables, & qu'on suppose les quantités variables $\overline{MN} = x$, & $\overline{NO} = z$.

Alors la résistance de la superficie décrite par $\overline{MN}$, sera $= \frac{ab^3}{x^3}$ comme il est démontré ci-dessus; de même $\frac{ac^3}{z^3}$ sera la résistance de la superficie décrite par $\overline{ON}$; d'où il suit que $\frac{ab^3}{x^3} + \frac{ac^3}{z^3}$, doit être un *minimum*; c'est-à-dire, $\frac{ab^3 dx}{x^4} + \frac{ac^3 dz}{z^4} = 0$, ou $\frac{ab^3 dx}{x^4} + \frac{ac^3 dz}{z^4} = 0$, d'où il suit $-\frac{ab^3 dx}{x^4} = \frac{ac^3 dz}{z^4}$.

Maintenant pour trouver une valeur affirmative de $-dx$, affectée de dz , prenez le point n infiniment près de N , & tirez les lignes droites On, Mn , auxquelles tirez les perpendiculaires NS, NR ; or puisque Nn , & par conséquent NS est infiniment moindre que NM , donc $\overline{MN} = \overline{MR}$; ainsi l'angle $MNR =$ l'angle MNR est égal à un angle droit. D'où il suit que l'angle $RNN =$ l'angle FNM ; car chacun d'eux

étant ajouté à l'angle MMN , forme un angle droit. De même, puisque les triangles NSn , nGO , sont équiangles, ayant chacun un angle droit ONn , NSn & l'angle ONG , commun; donc l'angle $SNn =$ l'angle $SOG = NOG$, l'angle NOS , étant infiniment petit. Ainsi faisant Nn , le rayon on aura $Rn (-dx) : Sn (dx) ::$ le sinus de l'angle FNm : au sinus de l'angle GON , suposant MN , le rayon (c'est-à-dire, faisant $MF = m$, & $NG = n$, & prenant $NL = MN$, tirant LK , parallèle à OG) comme $MF (m) : NG (n)$. Donc $-dx = \frac{mz dx}{nx}$, cette valeur étant mise dans l'équation ci-dessus, on aura $\frac{ab'mz dx}{nx^2} = \frac{c'n dx}{x^2}$, d'où on tire $\frac{ab'm}{x^2} = \frac{c'n}{x^2}$.

Maintenant tirez $AB (a)$ perpendiculaire à l'axe AP , & les lignes droites BC , BE , parallèles aux deux soutendantes infiniment petites MN , NO ; alors $4AB \times AC (4a^2 \times \frac{am}{b}) : BC (\frac{a'x^2}{b'}) :: BC (\frac{ax}{b}) : MP (a)$, & multipliant les extrêmes & les moyens, on aura $\frac{b'm}{x^2} = \frac{1}{4}$ ou $\frac{ab'm}{x^2} = \frac{a}{4}$; de même $4AB \times AE : BE :: BE : NQ = \frac{c'n}{x^2}$.

Par conséquent la nature de la courbe DM est telle que prenant AB dans la ligne AK perpendiculaire à l'axe $= a$, & tirant BC parallèle aux tangentes de la courbe dans un point quelconque M , nous aurons toujours $4AB \times AC : BC :: BC : MP$, qui est l'ordonnée.

Maintenant cette courbure peut être décrite par une courbe logarithmique de cette manière. Prenez $AB = a$, dans la ligne AK ; & dans la ligne AP prolongée vers le point A , prenez $AE = \sqrt{\frac{1}{2}aa}$, & par le point E , décrivez la courbe logarithmique FEN à l'asymptote AK , dont la soutangente $= \frac{1}{2}a$; alors prenant AC (qu'on suppose $= s$) à volonté, & tirant CN , parallèle à AK , faites $AK = \frac{aa}{4s} + \frac{1}{2}s + \frac{s^2}{4aa}$, & $AP = \frac{11}{4a} + \frac{1}{16a^2} - \frac{s}{4a}$ CN, sçavoir moins lorsque AC est plus grand que AE , & plus, lorsqu'il est moindre: tirez les lignes droites KM , PM , parallèles à AP , AK ; alors leur point d'intersection M , est dans la courbe DM cherchée.

Car

DES INFINIMENT PETITS. 161

Car faisant $AP=x$, $PM=y$, $AC=S$, la propriété de la courbe donnera AK ou PM (y) $= \frac{a^2 + 2a's - 4s^2}{4a's}$, & par conséquent $dy = \frac{1}{2} ds + \frac{3sds}{4a^2} - \frac{a'ds}{4s^2}$. Or puisque BC est parallèle aux tangentes au point M , par conséquent $dx = \frac{sdy}{a} = \frac{sds}{2a} + \frac{3s^2ds}{4a^2} - \frac{ads}{4s^2}$: l'intégrale duquel est $AP(x) = \frac{st}{4a} + \frac{3s^2}{16a^2}$, moins l'intégrale de $\frac{ads}{4s^2}$, plus ou moins quelques quantités invariables. Supposant que cette quantité soit $\frac{1}{28}a$, que nous avons soustrait, de sorte que CN , qui par la nature de la courbe logarithmique FEN , est l'intégrale de $\pm \frac{ads}{4s^2}$ venant $= 0$, $AP(x)$ soit aussi $= 0$, d'où &c.

Lorsque $AC = AE$, l'ordonnée PM , qui est alors un *minimum* devient $AD = \frac{1}{4}AE$, & la tangente en D , sera parallèle à BE ; mais si AC est supposé moindre que AE , la partie DO de la courbe sera convexe vers DM , & divergeant de plus en plus vers AB , AK . Par conséquent le solide qui trouvera la moindre résistance, peut être ou convexe ou concave, ou en partie convexe, & en partie concave, & le point D est un point de *rebroussement*.

Remarquez que la courbe logarithmique peut être facilement décrite de cette manière; il suffit de prendre $CN = \frac{1}{2}AB(a)$, la mesure du rapport AE à AC , le module étant $\frac{1}{2}AB(a)$.

PROBLEME XVIIII.

127. Trouver l'angle ABC que forme le plan d'une aile de moulin à vent qui a la figure d'un parallélogramme rectangle, & dont la largeur donnée est CB avec l'axe AB , tel qu'un vent soufflant dans la direction de son axe le fasse tourner avec plus de force que s'il étoit dans toute autre inclination par rapport à cet axe.

Tirez CD , perpendiculaire à l'axe, soit $CB = a$, $DB = x$. Fig. 24.

Si BC représente le nombre des particules d'air qui frappe contre l'aile lorsqu'il est perpendiculaire à l'axe AB ; alors DC , sera le nombre des particules qui frappent contre l'aile lorsqu'il est incliné vers l'axe dans l'angle DBC .

X

Maintenant il s'agit des principes de la mécanique, que la force de l'aile dans la direction DC , sera comme $BD \times DC \times DC = BD \times DC^2$, c'est-à-dire, le vent donné fera tourner l'aile avec une force qui sera toujours comme $BD \times DC^2$, qui doit par conséquent être un *maximum*; mais $BD \times DC^2 = x \times aa - xx = a^2x - x^3$; d'où on tire $a^2dx - 3x^2dx = 0$, & $a^2 = 3x^2$; ainsi $\frac{1}{3}a^2 = x^2$, & $\sqrt{\frac{1}{3}a^2} = x$, & par conséquent comme $CB : \sqrt{\frac{1}{3}a^2}$, ainsi le rayon est au sinus de l'angle C , dont le complément est l'angle ABC cherché; par conséquent l'angle C est de $35^\circ. 16'$, & l'angle ABC , $54^\circ. 44'$.

S C H O L I E.

Ce problème pour sa facilité auroit dû être mis devant plusieurs autres, surtout avant les deux derniers; mais tous les autres étoient imprimés avant que j'eusse pensé à celui-ci, ainsi plutôt que de le supprimer, je le mets ici.

M. Mariotte dans ses Hydrotastiques a tâché de le résoudre, mais sa conclusion est fautive. M. Parent l'a fait comme on le trouve dans l'*Histoire de l'Académie Royale des Sciences de Paris*; mais nous ne connoissons pas son procédé qui ne se trouve ni dans l'*Histoire*, ni dans les *Mémoires*.

F I N.

De l'Imprimerie de CLAUDE SIMON.

616102



FAUTES A CORRIGER.

Page 1, ligne 11, integrales exprimées : lisez integrales des différentielles exprimées.

P. 5, l. 11, les chiffres & en ôtant : lisez des zeros & en formant.

P. 11, l. 20, puissance x : lisez puissance de x . Ibid. ligne pénult. Ces produits après : lisez Ces produits (qui ont b ,) après.

P. 12, l. 24, à la seconde puissance, lisez à toutes les puissances. ligne 25, si vous mettez : lisez si vous avez.

P. 18, l. 2, les integrales : lisez l'integrale.

P. 29, l. 5, $\times \sqrt{e+fx}$, lisez $\times \sqrt{e+fx}$.

P. 30, l. 12 & suiv. de Briggs; de même que pour trouver la mesure des raisons & des rapports, on se sert d'une grande Table : lisez de Briggs qui servent à trouver la mesure des rapports ou à l'aide de grande Table.

P. 37, l. 6, continuë : lisez continuée.

P. 40, l. 15, pour l'aire : lisez comme l'aire.

P. 66, l. 28, égale à l'élément : lisez est égale à l'élément.

P. 69, l. 1, BMS 2 : lisez PMS 2.

P. 76 en marge, Fig. 31 : lisez Fig. 7.

P. 81, l. 14, AP : lisez aP.

P. 105 en marge, Fig. 45 : lisez Fig. 44.

P. 116, l. 13, APF : lisez APT.

P. 117, l. 17, & faisant : lisez en faisant.

P. 119, l. 14, au quotient de la division de la somme : lisez au quotient de la somme.


P. 137, l. 1, fera la distance : lisez qui sera la distance. ligne 23, AD lisez As.


P. 140, l. 4, & de l'ordonnée : lisez & à l'ordonnée.

P. 145, l. 7, ou il : lisez ou elle.

P. 147, l. 4, FEV : lisez FDF.

P. 153, l. 1, Apr : lisez AGr.








Planche III.




Planche IV.

